

***Suvestinė redakcija nuo 2015-05-09 iki 2015-06-15***

*Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-28, i. k. 2014-11337*

***Nauja redakcija nuo 2015-05-09:***

*Nr. [V-584](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027*



**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS  
PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-910  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu ir Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu:

1. T v i r t i n u Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos užtikrinti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis būtų įsigyti Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašė nurodyti vaistiniai preparatai ir medicinos pagalbos priemonės;

2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Sveikatos apsaugos ministrė

Rimantė Šalaševičiūtė

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-910  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-584 redakcija)

### CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr.                        | Vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės grupės pavadinimas                  | Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas | Ligos, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas ar medicinos pagalbos priemonė, kodas pagal TLK-10-AM | Vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės skyrimo sąlygos                                              | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPI), kuriai bus tiekiamas vaistinis preparatas ar medicinos pagalbos priemonė arba skiriamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos jam įsigyti, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų lygis | Planuojamas pacientų skaičius arba planuojamas medicinos pagalbos priemonės kiekis |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Vaistiniai preparatai</b> |                                                                                         |                                           |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 1.1                             | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sąnarių, žarnyno ir odos uždegimams gydyti |                                           |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 1.1.1                           | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti             | Infliximab<br>Etanercept<br>Adalimumab    | M05, M06                                                                                                | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas                                                                                                                                                        | 406–450                                                                            |
| 1.1.2                           | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai psoriaziniam artritui ir                   | Infliximab<br>Etanercept                  | M07, M45                                                                                                | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos                                                                                                                                                                  | 397–440                                                                            |

|       |                                                                                      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | ankilozuojančiam spondilitui gydyti                                                  | Adalimumab |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | paslaugas                                                                                                      |         |
| 1.1.3 | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai juveniliniam artritui gydyti            | Etanercept | M08      | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik vaikų ligų gydytojas ar gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties                                                                                                                                                                                                                                               | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų reumatologijos paslaugas                          | 102–115 |
|       |                                                                                      | Adalimumab |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
| 1.1.4 | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai Crohn'o ligai ir opiniam kolitui gydyti | Infliximab | K50, K51 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas gastroenterologas ir (ar) gydytojas vaikų gastroenterologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties                                                                                                                                                                                                                        | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų gastroenterologijos paslaugas | 127–140 |
|       |                                                                                      | Adalimumab |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
| 1.1.5 | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti                | Infliximab | L40      | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas dermatovenerologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šie vaistiniai preparatai skiriami užsitęsusiai ilgiau nei 6 mėn. sunkios formos psoriazei (PASI rodiklis > 15) gydyti, kai fototerapija ar standartinis sisteminis gydymas (metotreksatu ar acitretinu) yra neveiksmingi arba yra jų taikymo kontraindikacijų | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines dermatovenerologijos paslaugas                          | 41–45   |
|       |                                                                                      | Etanercept |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
|       |                                                                                      | Adalimumab |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |

|     |                                                                                                        |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.2 | Antineovaskuliarizuojantys vaistiniai preparatai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai (AGDD) gydyti | Ranibizumab | H35.3               | <p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas oftalmologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Neovaskulinės AGDD gydymas pradedamas, jei gali būti taikomas bent vienas iš šių kriterijų:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gyslainės neovaskulinės membranos (toliau – GNVM) atsiradimas, jei anksčiau ji nebuvo įtarta ar nustatyta;</li> <li>2. naujų kraujosruvų ir (ar) subretininio skysčio nustatymas;</li> <li>3. nesenas regos pablogėjimas (jis turi būti dokumentuotas), kai yra GNVM (regėjimo aštrumas po korekcijos – ne mažesnis kaip 0,1);</li> <li>4. GNVM padidėjimas, palyginti su jos dydžiu, nustatytu per ankstesnįjį apsilankymą pas gydytoją specialistą;</li> <li>5. nėra struktūrinio fibrozinio pažeidimo geltonosios dėmės centre (duobutėje);</li> <li>6. GNVM pažeidimo plotas ne didesnis kaip 12 regos nervo disko diametrų;</li> <li>7. GNVM sudaro ne mažiau kaip pusę dėl degeneracijos pakenkto tinklainės ploto.</li> </ol> <p>Pirmaisiais metais vienam ligos atvejui tenka 5–6 injekcijos, bet ne daugiau kaip 10 injekcijų per dvejus gydymo metus</p> | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas                                                   | 450–495 |
|     |                                                                                                        | Aflibercept |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |         |
| 1.3 | Specifiniai imunoglobulinai, skirti respiracinio sincitijaus viruso sukeltos infekcijos profilaktikai  | Palivizumab | J12.1, J20.5, J21.0 | <p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas neonatologas, gydytojas vaikų kardiologas ir (ar) gydytojas vaikų pulmonologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ≤ 28 sav. gestacinio amžiaus</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines neonatologijos, vaikų kardiologijos ir (ar) vaikų pulmonologijos paslaugas | 140–200 |

|     |                                                                                                                                                |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                |            |                 | <p>neišnešiotiems naujagimiams, kurie respiracinio sincitijaus viruso sukeltos infekcijos sezono pradžioje yra <math>\leq 12</math> mėn.;</p> <p>2. 29–30 sav. gestacinio amžiaus neišnešiotiems naujagimiams, kurie respiracinio sincitijaus viruso sukeltos infekcijos sezono pradžioje yra <math>\leq 6</math> mėn.;</p> <p>3. konsiliumo sprendimu – ir vyresnio gestacinio amžiaus (<math>&gt; 30</math> sav.) neišnešiotiems naujagimiams, jei yra papildomų sunkios respiracinio sincitijaus viruso sukeltos infekcijos rizikos veiksnių</p> |                                                                                             |         |
| 1.4 | Antinavikiniai vaistiniai preparatai (proteosomos inhibitoriai) daugybinei mielomai gydyti                                                     | Bortezomib | C90             | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas hematologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas antraeiliam daugybinės mielomos gydymui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines hematologijos paslaugas              | 120–130 |
| 1.5 | Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambiųjų ląstelių ne Hodžkino limfomai bei lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti | Rituximab  | C82, C83, C91.1 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas hematologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines hematologijos paslaugas              | 331–365 |
| 1.6 | Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms gydyti                                                                                          | Rituximab  | M05, M06        | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas | 55–60   |

|      |                                                                                              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.7  | Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti       | Bevacizumab | C18–C20      | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui, kartu taikant chemoterapiją. Vėliau taikoma monoterapija                                             | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 120–130 |
| 1.8  | Monokloniniai antikūnai plokščialąsteliniam galvos ir kaklo vėžiui gydyti                    | Cetuximab   | C00–C14, C32 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas:<br>1. kartu su radioterapija lokaliai išplitusiam plokščialąsteliniam galvos ir kaklo vėžiui gydyti;<br>2. metastazavusiam plokščialąsteliniam galvos ir kaklo vėžiui gydyti | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 10–20   |
| 1.9  | Monokloniniai antikūnai agresyviai skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab | C16          | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio skrandžio ar gastroezofaginės jungties vėžio gydymui                                                                                               | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 8–12    |
| 1.10 | Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti   | Trastuzumab | C50          | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas ankstyvajam vėžiui gydyti (gydymo trukmė – iki 52 sav.)                                                                                                                       | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 160–170 |

|      |                                                                                        |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.11 | Prostaglandinai galūnių išemijai gydyti ir gangrenos prevencijai                       | Alprostadil                | I70.2, I73.0, I73.1, I79.2 | Gydymą pradėti gali tik gydytojas kraujagyslių chirurgas, pritarus konsiliumui. Gydymą tęsti gali gydytojas kraujagyslių chirurgas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties                                                                                                                      | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų kraujagyslių chirurgijos paslaugas                                                                        | 115–125 |
| 1.12 | Pegiliuotas doksorubicinas kiaušidžių vėžiui gydyti                                    | Pegiliuotas doksorubicinas | C56                        | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Skiriami ne daugiau kaip 6 gydymo šiuo vaistiniu preparatu kursai                                                                                                                 | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas                                                                                   | 27      |
| 1.13 | Antitromboziniai vaistiniai preparatai (fermentai) kraujotakos sutrikimams gydyti      | Tenecteplase               | I21                        | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas kardiologas ar gydytojas anesteziologas reanimatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šio vaistinio preparato injekcijos turi būti skiriamos praėjus ne daugiau kaip 6 valandoms nuo ūminio miokardo infarkto simptomų atsiradimo pradžios | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio suaugusiųjų kardiologijos ir (ar) reanimacijos, ir intensyviosios terapijos paslaugas                                               | 609–730 |
|      |                                                                                        | Alteplase                  | I21, I26, I64              | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas kardiologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas neurologas ar gydytojas anesteziologas reanimatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties                                                                                                         | ASPI, turinti licenciją teikti II ir (ar) III lygio suaugusiųjų reanimacijos, intensyviosios terapijos, kardiologijos ir (ar) pulmonologijos, ir (ar) neurologijos paslaugas | 488–537 |
| 1.14 | Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti | Cetuximab                  | C18-C20                    | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šie vaistiniai preparatai                                                                                                                                                    | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas                                                                                   | 30–50   |

|      |                                                                                            |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                                            | Panitumumab |     | skiriami pirmaeiliam metastazavusiam storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui kartu taikant irinotekano ar oksaliplatinos chemoterapiją, kai naviko audiniuose yra nustatytas laukinio tipo RAS genas, pacientams, kuriems prieš tai nebuvo taikyta chemoterapija metastazavusiam vėžiui gydyti                                                                                               |                                                                                            |       |
| 1.15 | Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab | C50 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio vėžio gydymui                                                                                                                                                                                                 | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 55–60 |
| 1.16 | Interleukino inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti                                         | Ustekinumab | L40 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas dermatovenerologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Vaistinis preparatas skiriamas ilgiau nei 6 mėn. užsitęsusiai sunkios formos (PASI rodiklis > 15) psoriazei gydyti, kai fototerapija ar standartinis sisteminis gydymas metotreksatu ar acitretinu yra neveiksmingas arba yra šių vaistinių preparatų skyrimo kontraindikacijų | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines dermatovenerologijos paslaugas      | 25–30 |



|      |                                                                                                         |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.17 | Žmogaus normalusis imunoglobulinas imunodeficitu sindromams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms gydyti | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | D83, C91.1, C90, D69.3, G61.0, M30.3 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas vaikų neurologas, gydytojas neurologas, gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas vaikų hematologas, gydytojas hematologas, gydytojas reumatologas, gydytojas alergologas ar klinikinis imunologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas:<br>1. pakaitiniam gydymui (D83, C91.1, C90);<br>2. imunomoduliacijai (D69.3, G61.0, M30.3)                                                                                                                                                                                               | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų neurologijos, pulmonologijos, hematologijos, reumatologijos ir (ar) alergologijos paslaugas | 75–85   |
| 1.18 | Natūralūs fosfolipidai neišnešiotiems naujagimiams gydyti                                               | Natūralus surfaktantas               | P22.0                                | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas neonatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas:<br>1. beveik visiems neišnešiotiems naujagimiams, gimusiems iki 26 nėštumo savaitės (skiriamas per 15 min. po gimimo);<br>2. visiems kvėpavimo sutrikimo sindromu sergantiems neišnešiotiems naujagimiams, kurių būklei stabilizuoti būtina intubacija;<br>3. naujagimių ūminio kvėpavimo sutrikimo atveju (pneumonija, mekonijaus aspiracija ir kt.), atsiradus antrinei surfaktanto stokai plaučiuose, kai kitomis priemonėmis neįmanoma užtikrinti perfuzijos plaučiuose ir audinių oksigenacijos | ASPI, turinti licenciją teikti II ar III lygio stacionarines neonatologijos paslaugas                                                                                        | 120–135 |

|      |                                                                                      |                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.19 | Raumenis<br>atpalaiduojantys vaistiniai<br>preparatai neurologinėms<br>ligoms gydyti | Botulino<br>toksinas | G23, G24, G25,<br>G26, G80, G81,<br>G82, G83 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas<br>vaikų neurologas, gydytojas neurologas<br>ar fizinės medicinos ir reabilitacijos<br>gydytojas, turintis gydymo šiuo vaistiniu<br>preparatu patirties. Šis vaistinis<br>preparatas skiriamas suaugusiesiems<br>rankos raumenų spazmams po insulto<br>gydyti, dėl spazmiškumo atsiradusiai<br>dinaminei „arklio“ pėdos deformacijai<br>gydyti, sergantiems cerebriniu<br>paralyžiumi dvejų metų ir vyresniems<br>vaikams gydyti, suaugusiųjų<br>spazminiam tortikoliui, suaugusiųjų<br>blefarospazmui ir suaugusiųjų vienos<br>pusės veido spazmui gydyti | ASPI, turinti licenciją teikti<br>III lygio vaikų ir (ar)<br>suaugusiųjų neurologijos, ir<br>(ar) II ar III lygio<br>medicininės reabilitacijos<br>paslaugas | 325* |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.20 | Antivirusiniai vaistiniai preparatai AIDS ligai gydyti                                                                        | Tenofovir 245 mg +<br>Emtricitabin 200 mg<br>Zidovudin 300 mg +<br>Lamivudin 150 mg +<br>Abacavir 300 mg<br>Fosamprenavir<br>Ritonavir<br>Atazanavir<br>Tenofovir<br>Darunavir | B20, B21, B22, B23, B24 | Gydomą pradėti gali tik infekcinių ligų gydytojas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Gydomą tęsti gali infekcinių ligų gydytojas arba vidaus ligų gydytojas. Šie vaistiniai preparatai skiriami vadovaujantis Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio infekcinių ligų gydymo paslaugas                    | 95*   |
| 1.21 | Interleukino inhibitoriai sisteminiam jaunatviniam (juveniliniam) artritui ir jaunatviniam (juveniliniam) poliartritui gydyti | Tocilizumab                                                                                                                                                                    | M08.20-M08.29, M08.3    | Gydomą pradėti ir tęsti gali tik vaikų ligų gydytojas arba gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas, jei gydymas nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriais yra neveiksmingas arba kontraindikuotinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų reumatologijos paslaugas       | 8–12  |
| 1.22 | Interleukino inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti                                                                      | Tocilizumab                                                                                                                                                                    | M05, M06                | Gydomą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas, jei gydymas nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriais yra neveiksmingas arba kontraindikuotinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas | 40–80 |

|                                        |                                                                                                  |             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.23                                   | Antineovaskuliarizuojantys vaistiniai preparatai diabetinės geltonosios dėmės paburkimams gydyti | Ranibizumab | E10.34, E11.34                                        | <p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas oftalmologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties.</p> <p>Šis vaistinis preparatas skiriamas diabetinio geltonosios dėmės paburkimo sukeltam regos pablogėjimui gydyti pacientams, kuriems yra nustatytas bent vienas iš toliau išvardytų požymių:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tinklainės sustorėjimas geltonosios dėmės centre ar per 500 µm nuo geltonosios dėmės centro;</li> <li>2. kietasis eksudatas geltonosios dėmės centre ar per 500 µm nuo geltonosios dėmės centro, jei šalia esanti tinklainė yra sustorėjusi;</li> <li>3. 1 disko dydžio tinklainės sustorėjimo zona ar zonos, kurios bent dalis turi būti arčiau nei 1 disko skersmuo nuo geltonosios dėmės centro.</li> </ol> <p>Pirmaisiais metais vienam ligos atvejui tenka vidutiniškai 7 injekcijos, bet ne daugiau kaip 11 injekcijų per dvejus gydymo metus.</p> | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas                                | 350–500   |
| <b>2. Medicinos pagalbos priemonės</b> |                                                                                                  |             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |           |
| 2.1                                    | Oksigenatoriai                                                                                   |             | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 1500–1650 |

|     |                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |         |
|-----|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.2 | Trachėjos ir stemplės stentai                |  | J37, J38.7, J43, J44, J68, J84, J93, J94.9, J95, J96, J98, J99.1, J99.8, B90, C01, C14, C15, C32, C33, C34, C37, C38.1–C38.4, C77.1, C78, C79, C81, D14, D14.2–D14.4, D15.0–15.9, D16.7, D19.0, D19.9, D37.7, D38.0–D38.6, D86, E32.0, K21, K22, K44, Q31–Q33, Q39, R04, R13, S11.0, S11.01, S11.02, S11.2, S11.22, S17, T17.2–T17.9, T18.1, T27, T28.6, T75, T81, T85.5, T85.7, T91.4 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas vaikų gastroenterologas arba gydytojas gastroenterologas, arba gydytojas vaikų pulmonologas, arba gydytojas pulmonologas, arba gydytojas krūtinės chirurgas | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų gastroenterologijos, pulmonologijos ir (ar) krūtinės chirurgijos paslaugas | 100–110 |
| 2.3 | Ventrikulioperitoniniai šuntai ir jų priedai |  | G91, G93.0, G93.2, G94.0, G94.1, G95.0, C71, D33.0, D33.1, D35, Q03.0, Q04.36, Q04.60–Q04.62, Q28.2, Q28.3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas neurochirurgas                                                                                                                                              | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines neurochirurgijos paslaugas                                                                           | 68–75   |

|       |                                                                                                                                                                                              |  |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.4   | Dirbtinės kraujagyslės                                                                                                                                                                       |  | Z95                               | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas kraujagyslių chirurgas arba gydytojas širdies chirurgas | ASPI, turinti licenciją teikti III arba II lygio stacionarines suaugusiųjų kraujagyslių chirurgijos paslaugas ir (ar) vaikų širdies chirurgijos paslaugas, ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 470–515 |
| 2.5   | Tracheo-ezofaginiai kalbami protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai                                                                                                             |  | C01, C12, C13, C32, C73           | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas                          | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines otorinolaringologijos chirurgijos paslaugas                                                                                                           | 33–36   |
| 2.6   | Dirbtiniai širdies vožtuvai                                                                                                                                                                  |  |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |         |
| 2.6.1 | Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos bei biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos                             |  | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas                                       | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas                                                                                               | 20–22   |
| 2.6.2 | Dirbtiniai mechaniniai, biologiniai širdies vožtuvų protezai, žiedai, skirti vožtuvo rekonstrukcijai, aortos šaknies protezai, aortos ir plaučių arterijos protezai su dirbtiniais vožtuvais |  | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas                                       | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas                                                                                               | 650–715 |
| 2.7   | Radioizotopai ir kobalto šaltiniai                                                                                                                                                           |  |                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |         |
| 2.7.1 | Jodo šaltiniai (I-125) prostatos vėžiui gydyti                                                                                                                                               |  | C61                               | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas onkologas radioterapeutas                               | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines onkologijos radioterapijos paslaugas                                                                                                                  | 160–175 |

|       |                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.7.2 | Iridžio šaltiniai                                                                                                                                                      |  | C00–C14, C15, C16, C20, C21, C22–C24, C30–C33, C34, C39, C40, C41, C43, C44, C47–C49, C50, C51–C55, C60, C61, C67, C69, C70, C71, C72, C76, C77, C78, C79, C80 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas onkologas radioterapeutas arba radiologas             | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines ir (ar) ambulatorines onkologijos radioterapijos paslaugas                                                 | 420–460    |
| 2.7.3 | Rutenio šaltiniai                                                                                                                                                      |  | C69.3, C69.4                                                                                                                                                   | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas onkologas radioterapeutas arba radiologas             | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines onkologijos radioterapijos paslaugas                                                                       | 7–8        |
| 2.7.4 | Kobalto šaltiniai                                                                                                                                                      |  | C00, C15, C18–21, C33, C34, C43–45, C53, C54, C55, C61                                                                                                         | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas onkologas radioterapeutas arba radiologas             | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines onkologijos radioterapijos paslaugas                                                                       | 150–165    |
| 2.7.5 | Technecio generatoriai, natrio jodidas (I-131), stroncio chloridas, jodo (I-123) jofluponas, jodo (I-123) MIBG, HM–PAO tektrotid anti-granuliocitas, kobalto šaltiniai |  | C00–C97                                                                                                                                                        | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas onkologas radioterapeutas arba radiologas             | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines onkologijos radioterapijos ir (ar) radiologijos paslaugas                                                  | 9310–10240 |
| 2.8   | Stuburo fiksatoriai                                                                                                                                                    |  | C41.2, G80–G83, M40, M41, M42, M43, M46, M48, M51, S12, S13, S14, S15, S22, S23, S24, S32, S33, S34, Q05, Q67, Q76, Q78, Q77                                   | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas neurochirurgas arba gydytojas ortopedas traumatologas | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarinės vaikų neurochirurgijos ir (ar) suaugusiųjų neurochirurgijos, ir (ar) ortopedijos traumatologijos paslaugas | 180–200    |

|      |                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.9  | Peritoninės dializės tirpalai                                                                                               |  | N18.5                                                                                                                                                          | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas vaikų nefrologas arba gydytojas nefrologas                                                                                                                                                                                                 | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų nefrologijos paslaugas | 61–82     |
| 2.10 | Sąnarių endoprotezai                                                                                                        |  | M05, M06, M07, M12, M15, M16, M17, M19, Q65, D16.0, D16.1, D16.2, D16.8, C40, C79.5, M84.1, S82.3, T84, M84.4, S42.2, S42.4, S52.0, S72.0, S72.1, S72.4, S82.1 | Skiriama vadovaujantis Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ | ASPI, turinti licenciją teikti II ir (ar) III lygio stacionarines ortopedijos traumatologijos paslaugas | 6000–7200 |
| 2.11 | Inkstų arterijos denervacijos kateteris-elektrodas, taikomas medikamentiniam rezistentiškos arterinės hipertenzijos gydymui |  | I10, I11                                                                                                                                                       | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas kardiologas                                                                                                                                                                                                                                | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines kardiologijos paslaugas                          | 37–40     |
| 2.12 | Neurostimulatoriai Parkinsono ligai gydyti                                                                                  |  | G20                                                                                                                                                            | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas neurochirurgas                                                                                                                                                                                                                             | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugas           | 15–17     |
| 2.13 | Klausos aparatai                                                                                                            |  | H90.0, H90.8                                                                                                                                                   | Skiriama vadovaujantis Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 2/10 „Dėl aprūpinimo klausos aparatais ir jų išdavimo tvarkos patvirtinimo“                                                                                                                                                                   | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio otorinolaringologijos paslaugas                                | 4540–5448 |



|      |                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2.14 | Akių protezai                                                                                                                                                  |  | H44.5, H44.8, Q11.1, Q11.2                                                                            | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas oftalmologas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    | 300–330  |
| 2.15 | Deguoies terapijos priemonės                                                                                                                                   |  | J96.1, J96.9                                                                                          | Skiriama vadovaujantis Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | 900–1000 |
| 2.16 | Kochleariniai implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai implantai, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginiai šių medicinos pagalbos priemonių procesoriai |  | H66.2, H66.3, H71, H74.0, H74.1, H74.4, H80.2, H90.2, H90.3, H90.5, H90.6, H90.7, H91.3, Q16.1, Q16.3 | Skiriama vadovaujantis Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“ | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines otorinolaringologijos chirurgijos paslaugas | 80–100   |

\* Paliekama galimybė siūlyti vaistinius preparatus perkelti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1295](#), 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19605

Nr. [V-1466](#), 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00091

Nr. [V-352](#), 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03943

Nr. [V-584](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027

#### **Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1295](#), 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19605

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1466](#), 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00091

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-352](#), 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03943

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-584](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo