

***Suvestinė redakcija nuo 2016-07-23 iki 2016-11-22***

*Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-08-28, i. k. 2014-11337*

***Nauja redakcija nuo 2015-05-09:***

*Nr. [V-584](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027*



**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS  
PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-910  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 12 straipsniu ir Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-136 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu:

1. T v i r t i n u Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad tais atvejais, kai Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašė nėra nurodytos vaistinių preparatų skyrimo sąlygos ar nėra patvirtintų gydymo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais tvarkos aprašų, skiriant šiame sąrašė nurodytus vaistinius preparatus turi būti vadovaujamas jų charakteristikų santraukomis.

*Punkto pakeitimai:*

*Nr. [V-917](#), 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19763*

**3. P a v e d u:**

3.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos užtikrinti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis būtų įsigyti Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašė nurodyti vaistiniai preparatai ir medicinos pagalbos priemonės;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

*Papildyta punktu:*

*Nr. [V-917](#), 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19763*

Sveikatos apsaugos ministrė

Rimantė Šalaševičiūtė



PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-910  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2015 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-584 redakcija)

### CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr.                        | Vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės grupės pavadinimas                  | Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas | Ligos, kuriai gydyti skirtas vaistinis preparatas ar medicinos pagalbos priemonė, kodas pagal TLK-10-AM | Vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės skyrimo sąlygos                                              | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPI), kuriai bus tiekiamas vaistinis preparatas ar medicinos pagalbos priemonė arba skiriamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos jam įsigyti, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų lygis | Planuojamas pacientų skaičius arba planuojamas medicinos pagalbos priemonės kiekis |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Vaistiniai preparatai</b> |                                                                                         |                                           |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 1.1.                            | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sąnarių, žarnyno ir odos uždegimams gydyti |                                           |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 1.1.1.                          | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti             | Infliximab                                | M05, M06                                                                                                | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas                                                                                                                                                        | 455–500                                                                            |
|                                 |                                                                                         | Etanercept                                |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|                                 |                                                                                         | Adalimumab                                |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 1.1.2.                          | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai psoriaziniam artritui ir                   | Infliximab                                | M07, M45                                                                                                | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos                                                                                                                                                                  | 455–500                                                                            |
|                                 |                                                                                         | Etanercept                                |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |

|        |                                                                                      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | ankilozuojan-čiam spondilitui gydyti                                                 | Adalimumab |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | paslaugas                                                                                                      |         |
| 1.1.3. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai juveniliniam artritui gydyti            | Etanercept | M08      | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik vaikų ligų gydytojas ar gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties                                                                                                                                                                                                                                               | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų reumatologijos paslaugas                          | 124–136 |
|        |                                                                                      | Adalimumab |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
| 1.1.4. | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai Crohn'o ligai ir opiniam kolitui gydyti | Infliximab | K50, K51 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas gastroenterologas ir (ar) gydytojas vaikų gastroenterologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties                                                                                                                                                                                                                        | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų gastroenterologijos paslaugas | 164–180 |
|        |                                                                                      | Adalimumab |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
| 1.1.5  | Tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti                | Infliximab | L40      | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas dermatovenerologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šie vaistiniai preparatai skiriami užsitęsusiai ilgiau nei 6 mėn. sunkios formos psoriazei (PASI rodiklis > 15) gydyti, kai fototerapija ar standartinis sisteminis gydymas (metotreksatu ar acitretinu) yra neveiksmingi arba yra jų taikymo kontraindikacijų | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines dermatovenerologijos paslaugas                          | 100–110 |
|        |                                                                                      | Etanercept |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |
|        |                                                                                      | Adalimumab |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |         |

|     |                                                                                                        |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.2 | Antineovaskuliarizuojantys vaistiniai preparatai amžinės geltonosios dėmės degeneracijai (AGDD) gydyti | Ranibizumab | H35.3               | <p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas oftalmologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Neovaskulinės AGDD gydymas pradedamas, jei gali būti taikomas bent vienas iš šių kriterijų:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gyslainės neovaskulinės membranos (toliau – GNVM) atsiradimas, jei anksčiau ji nebuvo įtarta ar nustatyta;</li> <li>2. naujų kraujosruvų ir (ar) subretininio skysčio nustatymas;</li> <li>3. nesenas regos pablogėjimas (jis turi būti dokumentuotas), kai yra GNVM (regėjimo aštrumas po korekcijos – ne mažesnis kaip 0,1);</li> <li>4. GNVM padidėjimas, palyginti su jos dydžiu, nustatytu per ankstesnįjį apsilankymą pas gydytoją specialistą;</li> <li>5. nėra struktūrinio fibrozinio pažeidimo geltonosios dėmės centre (duobutėje);</li> <li>6. GNVM pažeidimo plotas ne didesnis kaip 12 regos nervo disko diametrų;</li> <li>7. GNVM sudaro ne mažiau kaip pusę dėl degeneracijos pakenkto tinklainės ploto.</li> </ol> <p>Pirmaisiais metais vienam ligos atvejui tenka 5–6 injekcijos, bet ne daugiau kaip 10 injekcijų per dvejus gydymo metus</p> | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas                                                   | 450–495 |
|     |                                                                                                        | Aflibercept |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |         |
| 1.3 | Specifiniai imunoglobulinai, skirti respiracinio sincitijaus viruso sukeltos infekcijos profilaktikai  | Palivizumab | J12.1, J20.5, J21.0 | <p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas neonatologas, gydytojas vaikų kardiologas ir (ar) gydytojas vaikų pulmonologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ≤ 28 sav. gestacinio amžiaus</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines neonatologijos, vaikų kardiologijos ir (ar) vaikų pulmonologijos paslaugas | 140–200 |

|     |                                                                                                                                               |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                               |            |                 | <p>neišnešiotiems naujagimiams, kurie respiracinio sincitijaus viruso sukeltos infekcijos sezono pradžioje yra <math>\leq 12</math> mėn.;</p> <p>2. 29–30 sav. gestacinio amžiaus neišnešiotiems naujagimiams, kurie respiracinio sincitijaus viruso sukeltos infekcijos sezono pradžioje yra <math>\leq 6</math> mėn.;</p> <p>3. konsiliumo sprendimu – ir vyresnio gestacinio amžiaus (<math>&gt; 30</math> sav.) neišnešiotiems naujagimiams, jei yra papildomų sunkios respiracinio sincitijaus viruso sukeltos infekcijos rizikos veiksnių</p> |                                                                                             |         |
| 1.4 | Antinavikiniai vaistiniai preparatai (proteosomos inhibitoriai) daugybinei mielomai gydyti                                                    | Bortezomib | C90             | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas hematologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas antraeiliam daugybinės mielomos gydymui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines hematologijos paslaugas              | 120–130 |
| 1.5 | Monokloniniai antikūnai folikulinei ne Hodžkino limfomai ir stambųjų ląstelių ne Hodžkino limfomai bei lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti | Rituximab  | C82, C83, C91.1 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas hematologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines hematologijos paslaugas              | 331–365 |
| 1.6 | Monokloniniai antikūnai reumatologinėms ligoms gydyti                                                                                         | Rituximab  | M05, M06        | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas | 55–60   |

|       |                                                                                              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.7   | Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti       | Bevacizumab | C18–C20      | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui, kartu taikant chemoterapiją. Vėliau taikoma monoterapija                                             | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 120–130 |
| 1.8   | Monokloniniai antikūnai plokščiakūsteliniam galvos ir kaklo vėžiui gydyti                    | Cetuximab   | C00–C14, C32 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas:<br>1. kartu su radioterapija lokaliai išplitusiam plokščiakūsteliniam galvos ir kaklo vėžiui gydyti;<br>2. metastazavusiam plokščiakūsteliniam galvos ir kaklo vėžiui gydyti | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 10–20   |
| 1.9.  | Monokloniniai antikūnai agresyviai skrandžio vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab | C16          | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio skrandžio ar gastroezofaginės jungties vėžio gydymui.                                                                                              | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 12–15   |
| 1.10. | Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti   | Trastuzumab | C50          | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas ankstyvajam vėžiui gydyti (gydymo trukmė – iki 52 sav.).                                                                                                                      | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 195–250 |

|       |                                                                                   |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.11  | Prostaglandinai galūnių išemijai gydyti ir gangrenos prevencijai                  | Alprostadil                | I70.2, I73.0, I73.1, I79.2 | Gydymą pradėti gali tik gydytojas kraujagyslių chirurgas, pritarus konsiliumui. Gydymą tęsti gali gydytojas kraujagyslių chirurgas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų kraujagyslių chirurgijos paslaugas                                                                       | 115–125  |
| 1.12. | Pegiliuotas doksorubicinas kiaušidžių vėžiui gydyti                               | Pegiliuotas doksorubicinas | C56                        | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Skiriami ne daugiau kaip 6 gydymo šiuo vaistiniu preparatu kursai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas                                                                                  | 27–40    |
| 1.13. | Antitromboziniai vaistiniai preparatai (fermentai) kraujotakos sutrikimams gydyti | Tenecteplase               | I21                        | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas kardiologas ar gydytojas anesteziologas reanimatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šio vaistinio preparato injekcijos turi būti skiriamos praėjus ne daugiau kaip 6 valandoms nuo ūminio miokardo infarkto simptomų atsiradimo pradžios.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio suaugusiųjų kardiologijos ir (ar) reanimacijos, ir intensyviosios terapijos paslaugas                                              | 235–730  |
|       |                                                                                   | Alteplase                  | I21, I26, I63              | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas kardiologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas neurologas ar gydytojas anesteziologas reanimatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Neurologas, skirdamas vaistinį preparatą <i>Alteplase</i> smegenų infarktui I63 gydyti turi vadovautis nurodytais tinkamumo (netinkamumo) intraveninei trombolizei atlikti kriterijais.<br>1. Tinkamumo intraveninei trombolizei kriterijai:<br>1.1. <i>Alteplase</i> infuzija turi būti pradėta praėjus ne daugiau kaip 4,5 valandoms nuo ūminio išeminio insulto simptomų | ASPI, turinti licenciją teikti II ir (ar) III lygio suaugusiųjų reanimacijos, intensyviosios terapijos, kardiologijos ir (ar) pulmonologijos ir (ar) neurologijos paslaugas | 535– 750 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>atsiradimo pradžios;</p> <p>1.2. pacientas iki insulto pradžios buvo savarankiškas kasdienėje veikloje;</p> <p>1.3. paciento amžius 18 metų ar daugiau.</p> <p>2. netinkamumo intraveninei trombolizei kriterijai:</p> <p>2.1. pacientas vartoja netiesioginio veikimo antikoagulantus ir / arba protrombino laikas 15 sek. (tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) <math>\geq 1,7</math>) ar didesnis. Jei pacientas vartoja (arba pastaruoju metu vartojo) netiesioginio veikimo geriamuosius antikoagulantus, tačiau TNS <math>&lt; 1,7</math>, tai nelaikoma netinkamumo kriterijumi intraveninei trombolizei;</p> <p>2.2. nuo geriamųjų ne vitamino K antagonistų (tiesioginių trombino ar faktoriaus Xa inhibitorių) paskutinės vartotos dozės suvartojimo praėjo mažiau kaip 24 val.;</p> <p>2.3. kraujavimas iš virškinamojo trakto ar šlapimo takų per pastarąsias 3 sav.;</p> <p>2.4. per pastarąsias 10 dienų punktuota kraujagyslė, kurios neįmanoma užspausti;</p> <p>2.5. didžioji operacija per pastaruosius 3 mėn.;</p> <p>2.6. hemoraginė diatezė arba hemoraginė retinopatija;</p> <p>2.7. intrasmegeninė kraujosruva (toliau – ISK) anamnezėje;</p> <p>2.8. sunki centrinės nervų sistemos liga ar sveikatos sutrikimas anamnezėje arba kitokia lydinti lėtinė liga ar sveikatos</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>sutrikimas, kurie reikšmingai apsunkina gyvenimo prognozę;</p> <p>2.9. nekontroliuojama arterinė hipertenzija: sistolinis AKS &gt;185 mmHg arba diastolinis AKS &gt;110 mmHg iki gydymo pradžios;</p> <p>2.10. infekcinis perikarditas ūminis ir poūmis endokarditas, (I30.1, I33);</p> <p>2.11. ūminis pankreatitas (K85);</p> <p>2.12. arterioveninė smegenų kraujagyslių formavimosi yda arba nustatyta neplyšusi intrakranijinė aneurizma (I67.1,Q28.2);</p> <p>2.13. navikas, dėl kurio padidėjusi kraujavimo rizika;</p> <p>2.14. sunki kepenų liga;</p> <p>2.15. atliekant galvos smegenų KT nustatomi ISK arba spontaninės subarachnoidinės kraujosruvos požymiai, arba ankstyvi pakitimai, būdingi dideliam išeminiam insultui;</p> <p>2.16. labai sunki neurologinė būklė: <math>\geq 24</math> balai pagal NIH insulto skalę;</p> <p>2.17. per pastarąsias 48 val. pacientui buvo skirtas heparinas ir yra prailgėjęs aktyvuoto dalinio tromboplastino laikas (ADTL) (<math>\geq 2</math> kartus viršija viršutinę normos ribą), arba nuo paskutinės mažos molekulinės masės heparinų dozės paskyrimo praėjo mažiau kaip 12 val.;</p> <p>2.18. trombocitopenija <math>&lt; 100 \times 10^9/l</math> (<math>&lt; 100\,000/mm^3</math>);</p> <p>2.19. per pastaruosius 3 mėnesius buvęs insultas, intrakranijinė operacija arba</p> |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|      |                                                                                            |                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                                            |                          |         | <p>sunki galvos trauma;</p> <p>2.20. gliukozės koncentracija kraujyje &lt;2,8 mmol/l arba &gt;22,3 mmol/l;</p> <p>2.21. traukuliai insulto pradžioje;</p> <p>2.22. nėštumas arba gimdymas per pastarąsias 10 parų.</p> <p>3. Sprendimą atlikti trombolizę priima neurologas. Jei yra neesminių nuokrypių nuo tinkamumo intraveninei trombolizei atlikti kriterijų, trombolizės atlikimo klausimas sprendžiamas individualiai, pagal ASPI nustatytas vidaus tvarkos taisykles.</p> |                                                                                            |       |
| 1.14 | Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti     | Cetuximab<br>Panitumumab | C18-C20 | <p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šie vaistiniai preparatai skiriami pirmaeiliam metastazavusiam storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui kartu taikant irinotekano ar oksaliplatinos chemoterapiją, kai naviko audiniuose yra nustatytas laukinio tipo RAS genas, pacientams, kuriems prieš tai nebuvo taikyta chemoterapija metastazavusiam vėžiui gydyti</p>               | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 30–50 |
| 1.15 | Monokloniniai antikūnai agresyviai krūties vėžiui, kurio HER2 rodmuo yra teigiamas, gydyti | Trastuzumab              | C50     | <p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Vaistinis preparatas skiriamas pirmaeiliam metastazavusio vėžio gydymui</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 55–60 |

|       |                                                                                                         |                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.16  | Interleukino inhibitoriai sunkiai psoriazei gydyti                                                      | Ustekinumab                          | L40                                         | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas dermatovenerologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Vaistinis preparatas skiriamas ilgiau nei 6 mėn. užsitęsusiai sunkios formos (PASI rodiklis > 15) psoriazei gydyti, kai fototerapija ar standartinis sisteminis gydymas metotreksatu ar acitretinu yra neveiksmingas arba yra šių vaistinių preparatų skyrimo kontraindikacijų                                                                                                             | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines dermatovenerologijos paslaugas                                                                                                                                                                             | 25–30  |
| 1.17. | Žmogaus normalusis imunoglobulinas imunodeficitu sindromams, onkohematologinėms ir kitoms ligoms gydyti | Intraveninis žmogaus imunoglobulinas | D83, C91.1, C90, D69.3, G61.0, M30.3, G61.8 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas vaikų neurologas, gydytojas neurologas, gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas pulmonologas, gydytojas vaikų hematologas, gydytojas hematologas, gydytojas reumatologas, gydytojas alergologas ar klinikinis imunologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas:<br>1. pakaitiniam gydymui (D83, C91.1, C90);<br>2. imunomoduliacijai (D69.3, G61.0, M30.3)<br>3. daugiažidininei motorinei neuropatijai (G61.8). | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų (ar) suaugusiųjų neurologijos, pulmonologijos, hematologijos, reumatologijos ir (ar) alergologijos paslaugas, ar ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines vaikų hematologijos paslaugas | 80– 90 |

|       |                                                                                      |                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.18  | Natūralūs fosfolipidai<br>neišnešiotiems<br>naujagimiams gydyti                      | Natūralus<br>surfaktantas | P22.0                                                  | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas<br>neonatologas, turintis gydymo šiuo<br>vaistiniu preparatu patirties.<br>Šis vaistinis preparatas skiriamas:<br>1. beveik visiems neišnešiotiems<br>naujagimiams, gimusiems iki 26<br>nėštumo savaitės (skiriamas per 15 min.<br>po gimimo);<br>2. visiems kvėpavimo sutrikimo<br>sindromu sergantiems neišnešiotiems<br>naujagimiams, kurių būklei stabilizuoti<br>būtina intubacija;<br>3. naujagimių ūminio kvėpavimo<br>sutrikimo atveju (pneumonija,<br>mekonijaus aspiracija ir kt.), atsiradus<br>antrinei surfaktanto stokai plaučiuose,<br>kai kitomis priemonėmis neįmanoma<br>užtikrinti perfuzijos plaučiuose ir<br>audinių oksigenacijos | ASPI, turinti licenciją teikti<br>II ar III lygio stacionarines<br>neonatologijos paslaugas                                                               | 120–135  |
| 1.19  | Raumenis<br>atpalaiduojantys vaistiniai<br>preparatai neurologinėms<br>ligoms gydyti | Botulino<br>toksinas      | G23, G24, G25,<br>G26, G80, G81,<br>G82, G83,<br>G51.3 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas<br>vaikų neurologas, gydytojas neurologas<br>ar fizinės medicinos ir reabilitacijos<br>gydytojas, turintis gydymo šiuo vaistiniu<br>preparatu patirties. Šis vaistinis<br>preparatas skiriamas suaugusiems<br>rankos raumenų spazmams po insulto<br>gydyti, dėl spazmiškumo atsiradusiai<br>dinaminei „arklio“ pėdos deformacijai<br>gydyti, sergantiems cerebriniu<br>paralyžiumi dvejų metų ir vyresniems<br>vaikams gydyti, suaugusiųjų spazminiam<br>tortikoliui, suaugusiųjų blefarospazmui ir<br>suaugusiųjų vienos pusės veido spazmui<br>gydyti                                                                                                 | ASPI, turinti licenciją teikti<br>III lygio vaikų ir (ar)<br>suaugusiųjų neurologijos, ir<br>(ar) II ar III lygio medicininės<br>reabilitacijos paslaugas | 479– 500 |
| 1.20. | Antivirusiniai vaistiniai                                                            | Tenofovir 245             | B20, B21, B22,                                         | Gydymą pradėti gali tik infekcinių ligų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASPI, turinti licenciją teikti                                                                                                                            | 95*      |

|      |                                                                                                                               |                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | preparatai AIDS ligai gydyti                                                                                                  | Emtricitabin 200 mg | +B23, B24            | gydytojas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Gydymą tęsti gali infekcinių ligų gydytojas arba vidaus ligų gydytojas. Vaistiniai preparatai skiriami vadovaujantis Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo. | II lygio infekcinių ligų gydymo paslaugas                                                   |       |
|      |                                                                                                                               | Fosamprenavir       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |       |
|      |                                                                                                                               | Atazanavir          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |       |
|      |                                                                                                                               | Tenofovir           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |       |
| 1.21 | Interleukino inhibitoriai sisteminiam jaunatviniam (juveniliniam) artritui ir jaunatviniam (juveniliniam) poliartritui gydyti | Tocilizumab         | M08.20-M08.29, M08.3 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik vaikų ligų gydytojas arba gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas, jei gydymas nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriais yra neveiksmingas arba kontraindikuotinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų reumatologijos paslaugas       | 8–12  |
| 1.22 | Interleukino inhibitoriai reumatoidiniam artritui gydyti                                                                      | Tocilizumab         | M05, M06             | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas, jei gydymas nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriais yra neveiksmingas arba kontraindikuotinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas | 40–80 |

|      |                                                                                                                   |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.23 | Antineovaskuliari-<br>zuojantys<br>vaistiniai preparatai<br>diabetinės geltonosios<br>dėmės paburkimams<br>gydyti | Ranibizumab | E10.34,<br>E11.34 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas<br>oftalmologas, turintis gydymo šiuo<br>vaistiniu preparatu patirties.<br>Šis vaistinis preparatas skiriamas<br>diabetinio geltonosios dėmės paburkimo<br>sukeltam regos pablogėjimui gydyti<br>pacientams, kuriems yra nustatytas bent<br>vienas iš toliau išvardytų požymių: 1.<br>tinklainės sustorėjimas geltonosios<br>dėmės centre ar per 500 µm nuo<br>geltonosios dėmės centro; 2. kietasis<br>eksudatas geltonosios dėmės centre ar<br>per 500 µm nuo geltonosios dėmės<br>centro, jei šalia esanti tinklainė yra<br>sustorėjusi; 3. 1 disko dydžio tinklainės<br>sustorėjimo zona ar zonos, kurios bent<br>dalis turi būti arčiau nei 1 disko<br>skersmuo nuo geltonosios dėmės centro.<br>Pirmaisiais metais vienam ligos atvejui<br>tenka vidutiniškai 7 injekcijos, bet ne<br>daugiau kaip 11 injekcijų per dvejus<br>gydymo metus. | ASPI, turinti licenciją teikti III<br>lygio stacionarines<br>oftalmologijos paslaugas | 350-<br>500 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|  |  |             |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Aflibercept |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|      |                                                                                                     |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1.24 | Virškinimo traktą ir metabolismą veikiantys vaistai – fermentai VI tipo mukopolisacharidozei gydyti | Galsulfase | E76.2 | <p>Gydymas gali būti paskirtas ir pradėtas Universiteto ligoninės Vaikų retų ligų koordinavimo centro konsiliumo sprendimu. Vaistinis preparatas skiriamas, kai patvirtinama VI tipo mukopolisacharidozės diagnozė ir pacientas yra jaunesnis nei 5 metų amžiaus arba kai patvirtinama diagnozė pacientui, vyresniam nei 5 metų amžiaus, ir jam pasireiškia bent vienas klinikinis ligos simptomas (kvėpavimo sistemos ligų simptomai, kaulų ir sąnarių deformacijos ir judrumo sutrikimai arba miego apnėja), nėra kontraindikacijų gydyti vaistiniu preparatu (terminalinė paciento būklė) dėl gretutinių ligų, buvusi sunki alerginė reakcija į vieną iš preparato sudedamųjų dalių, nėštumas ir žindymas) pacientas ir (ar) jo įstatyminiai atstovai yra motyvuoti dalyvauti gydymo procese. Pradėjus gydymą ne rečiau kaip kas 6 mėnesius atliekamas išsamus paciento būklės bei gydymo efekto vertinimas, siekiant nustatyti, ar yra bent viena iš šių indikacijų nutraukti gydymą: sunki kartotinė alerginė reakcija į vaistą nepaisant adekvačių premedikacijos priemonių; per 12 vaisto skyrimo mėnesių nepastebėta būklės pagerėjimo ar stabilizacijos ženklų, atsižvelgiant į natūralų ligos progresą ir vertinant klinikinius parametrus, kuriais remiantis vyresniam negu 5 metų amžiaus pacientui pradėtas gydymas, arba</p> | Universiteto ligoninių Vaikų retų ligų koordinavimo centrai | 1-2 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>stebimas akivaizdus paciento, kurio gydymas pradėtas iki 5 metų amžiaus, būklės blogėjimas; pacientas ir (ar) jo įstatyminiai atstovai nemotyvuoti dalyvauti gydymo procese, nesilaiko vaisto vartojimo režimo (praleido 10 proc. ir daugiau vaisto dozių per 6 mėnesius dėl nemedicininį priežasčių, 2 kartus iš eilės neatvyko įvertinti sveikatos būklės ir gydymo efekto), nėštumas ir žindymas. Sprendimą tęsti arba nutraukti gydymą priima gydytojų konsiliumas.</p> |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|       |                               |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                |                                                                                                         |       |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.25. | Peritoninės dializės tirpalai | Neutralaus pH tirpalas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei, gliukopiranozės polimero tirpalas, aminorūgščių tirpalas. | N18.5 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas vaikų nefrologas arba gydytojas nefrologas, turintis gydymo šiais vaistiniais preparatais patirties | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų nefrologijos paslaugas | 61–82 |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|       |                                                                           |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.26. | Monokloniniai antikūnai<br>nesmulkialąs-teliniam<br>plaučių vėžiui gydyti | Bevacizumab | C34 | Gydymą pradėti ir tęsti gali gydytojas<br>pulmonologas ar gydytojas onkologas,<br>turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu<br>patirties.<br>Šis vaistinis preparatas skiriamas<br>pirmaeiliam nesmulkialąstelinio plaučių<br>vėžio gydymui<br>tik esant vietiškai išplitusiai ar<br>metastazavusiai ligos formai, kai<br>histologiškai patvirtinta adenokarcinoma | ASPI, turinti licenciją teikti II<br>lygio stacionarines onkologijos<br>hematologijos paslaugas | 25– 30 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|       |                                                                                                                         |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.27. | Monokloniniai antikūnai<br>Vegenerio ( <i>Wegener</i> )<br>granulimotozei<br>ir mikroskopiniam<br>poliangitui<br>gydyti | Rituximab | M31.3, M31.7 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas reumatologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties.<br>Šis vaistinis preparatas skiriamas:<br>1. suaugusiems pacientams, sergantiems relapsuojančia granulimotoze su poliangitu ( <i>Wegener</i> ) ir mikroskopiniu poliangitu, kurie prieš tai gydyti ciklofosfamidų;<br>2. suaugusiems pacientams, sergantiems sunkia, aktyvios eigos granulimotoze su poliangitu ( <i>Wegener</i> ) ir mikroskopiniu poliangitu, kuriems kontraindikuotinas gydymas ciklofosfamidų. | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų reumatologijos paslaugas | 15– 20 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|       |                                                                |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |        |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.28. | Selektyvūs imunosupresantai, skirti išsėtinei sklerozei gydyti | Alemtuzumab | G35 | <p>Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas neurologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties.</p> <p>Šis vaistinis preparatas skiriamas suaugusiems pacientams, sergantiems aktyvia recidyvuojančia remituojančia išsėtine skleroze, kuriems nepadeda gydymas, bent vienu ligos eigą modifikuojančiu preparatu.</p> <p>Sprendimą skirti ar tęsti gydymą vaistiniu preparatu priima III lygio stacionarines neurologijos paslaugas teikiančių ASPI gydytojų neurologų konsiliumas. Skiriamas, atliekant infuziją į veną 2 gydymo kursais:</p> <p>Pirmas kursas – 12 mg per parą 5 dienas iš eilės, antras kursas skiriamas praėjus 12 mėnesių po pirmo kurso – 12 mg per parą 3 dienas iš eilės.</p> | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines neurologijos paslaugas | 20– 40 |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|

|       |                                                                                                                                                 |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.29. | Antineovaskuliarizuojantys vaistiniai preparatai geltonosios dėmės paburkimams, atsiradusiems dėl centrinių tinklainės venos okliuzijos, gydyti | Ranibizumab | H34.1– H34.9 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas oftalmologas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas regos sutrikimui dėl geltonosios dėmės paburkimo, kurį sukėlė centrinių tinklainės venos nepraeinamumas, kai regėjimo aštrumas $\leq 0,5$ . Vienam ligos atvejui per metus vidutiniškai tenka 6 injekcijos. Gydymas trunka iki dviejų metų. | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas | 150–200 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|

|  |  |             |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  |  | Aflibercept |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|

|       |                                                             |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |    |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.30. | Monokloniniai antikūnai<br>gimdos kaklelio vėžiui<br>gydyti | Bevacizumab | C53 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas<br>onkologas chemoterapeutas, turintis<br>gydymo šiuo vaistiniu preparatu<br>patirties. Šis vaistinis preparatas<br>skiriamas kartu su paklitakseliu ir<br>cisplatina arba paklitakseliu ir<br>topotekanu suaugusioms pacientėms,<br>kurioms nustatyta persistuojanti,<br>recidyvavusi ar metastazavusi gimdos<br>kaklelio karcinoma. | ASPI, turinti licenciją teikti II<br>lygio stacionarines onkologijos<br>chemoterapijos paslaugas | 70 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|       |                                                                                                   |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.31. | Antinavikiniai vaistiniai preparatai metastazavusiam gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiui gydyti | Aflibercept | C18– C20 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas antraeiliam gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžio gydymui su FOLFIRI po gydymo oksaliplatinos režimu, jei pagal ECOG funkcinės būklės įvertinimą būtų nuo 0 iki 1. | ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas | 40–60 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|       |                                                                      |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.32. | Monokloniniai antikūnai<br>lėtinei limfocitinei<br>leukemijai gydyti | Obinutuzumab | C91.1 | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas<br>hematologas, turintis gydymo šiuo<br>vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis<br>preparatas skiriamas negydytiems<br>pacientams, kurie dėl<br>gretutinių ligų negali būti gydomi<br>fludarabinu. | ASPI, turinti licenciją teikti III<br>lygio stacionarines<br>hematologijos paslaugas | 43–63 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                        |                                                                                   |                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.33.                                  | Gydomieji radiofarmaciniai preparatai priešinės liaukos (prostatos) vėžiui gydyti | Radžio Ra 223 dichloridas | C61                                                   | Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas radioterapeutas, turintis gydymo šiuo vaistiniu preparatu patirties. Šis vaistinis preparatas skiriamas kastracijai atspariam priešinės liaukos vėžiui gydyti pacientams, kuriems yra simptominių kaulų metastazių, nėra žinomų vidaus organų metastazių ir yra kontraindikacijų chemoterapijai. | ASPI, teikianti branduolinės medicinos paslaugas ir turinti Radiacinės saugos centro leidimą atlikti branduolinės medicinos terapines procedūras vaistu, kuris turi alfa spindulio Ra 223, vadovaudama-si Lietuvos higienos normos HN 77:2002 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ reikalavimais. | 62–89 |
| <b>2. Medicinos pagalbos priemonės</b> |                                                                                   |                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 2.1.                                   | Dirbtinės kraujotakos palaikymo sistemos                                          |                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 2.1.1.                                 | Uždaro kraujo apytakos tipo dirbtinės kraujotakos sistema                         |                           | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas                                                                                                                                                                                                                                    | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas                                                                                                                                                                                          | 32–35 |
| 2.1.2.                                 | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) suaugusiesiems         |                           | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas                                                                                                                                                                                                                                    | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas                                                                                                                                                                                          | 35–39 |

|        |                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1.3. | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos suaugusiesiems (ECMO) trumpesniajam naudojimui                                                               |  | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 10–11   |
| 2.1.4. | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema suaugusiesiems                                                                                                           |  | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 10–11   |
| 2.1.5. | Ekstrakorporinės membraninės oksigenacinės sistemos (ECMO) vaikams ir naujagimiams                                                                               |  | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 5–6     |
| 2.1.6. | Mechaninė kraujotakos palaikymo sistema vaikams                                                                                                                  |  | I37, I06, I36, I08, I34, I09, I39, I05, I35, I38, I07 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 3–4     |
| 2.2.   | Dirbtiniai širdies vožtuvai                                                                                                                                      |  |                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                |         |
| 2.2.1. | Kateterizavimo būdu implantuojami biologiniai aortos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos bei biologiniai plaučių arterijos vožtuvai ir jų implantavimo sistemos |  | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07                     | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 20–22   |
| 2.2.2. | Biologiniai širdies vožtuvo protezai                                                                                                                             |  | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07                     | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 450–500 |
| 2.2.3. | Aortos šaknies protezas                                                                                                                                          |  | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07                     | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas                   | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies                       | 5–6     |

|        |                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       | širdies chirurgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chirurgijos paslaugas                                                                                          |        |
| 2.2.4. | Aortos konduitas (aortos vožtuvas su dirbtine kraujagysle)                                                                                                     |  | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07                                                                     | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 25–28  |
| 2.2.5. | Dirbtinis biologinis konduitas, skirtas protezuoti plaučių arteriją ir jos vožtuvą                                                                             |  | I06, I08, I09, I43, I05, I20, I07                                                                     | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas širdies chirurgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų ir (ar) suaugusiųjų širdies chirurgijos paslaugas | 15–17  |
| 2.3.   | Inkstų arterijos denervacijos kateteris-elektrodas, taikomas medikamentiniam rezistentiškios arterinės hipertenzijos gydymui                                   |  | I10, I11                                                                                              | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas kardiologas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines kardiologijos paslaugas                                 | 37–40  |
| 2.4.   | Neurostimuliatoriai Parkinsono ligai gydyti                                                                                                                    |  | G20                                                                                                   | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas neurochirurgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugas                  | 15–17  |
| 2.5.   | Kochleariniai implantai, BAHA įsriegiamieji kauliniai implantai, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginiai šių medicinos pagalbos priemonių procesoriai |  | H66.2, H66.3, H71, H74.0, H74.1, H74.4, H80.2, H90.2, H90.3, H90.5, H90.6, H90.7, H91.3, Q16.1, Q16.3 | Skiriama vadovaujantis Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines otorinolaringologijos chirurgijos paslaugas             | 80–100 |

|                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                | procesoriaus įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |           |
| <b>3. Medicinos pagalbos priemonės, kurioms nustatytas pereinamasis laikotarpis</b> |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |           |
| 3.1.                                                                                | Tracheoezofaginiai kalbantieji protezai, jų priedai ir elektroniniai balso aparatai |  | C01, C12, C13, C32, C73                                                                                                                                        | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas. Centralizuotai apmokama iki 2016-12-31.                                                                                                                                                                                                             | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines otorinolaringologijos chirurgijos paslaugas      | 36–50     |
| 3.2.                                                                                | Jodo šaltiniai (I-125) prostatos vėžiui gydyti                                      |  | C61                                                                                                                                                            | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas onkologas radioterapeutas. Centralizuotai apmokama iki 2016-12-31.                                                                                                                                                                                                                  | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines onkologijos radioterapijos paslaugas             | 160–175   |
| 3.3.                                                                                | Sąnarių endoprotezai                                                                |  | M05, M06, M07, M12, M15, M16, M17, M19, Q65, D16.0, D16.1, D16.2, D16.8, C40, C79.5, M84.1, S82.3, T84, M84.4, S42.2, S42.4, S52.0, S72.0, S72.1, S72.4, S82.1 | Skiriama vadovaujantis Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Centralizuotai apmokama iki 2016-12-31. | ASPI, turinti licenciją teikti II ir (ar) III lygio stacionarines ortopedijos traumatologijos paslaugas | 6000–7200 |
| 3.4.                                                                                | Klausos aparatai                                                                    |  | H90.0- H90.8                                                                                                                                                   | Skiriama vadovaujantis Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2001 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 2/10 „Dėl aprūpinimo klausos aparatais ir jų                                                                                                                                                                                                                                           | ASPI, turinti licenciją teikti III lygio otorinolaringologijos paslaugas                                | 4540–6535 |

|      |                              |  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|------|------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |                              |  |                            | išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Centralizuotai apmokama iki 2016-12-31.                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 3.5. | Akių protezai                |  | H44.5, H44.8, Q11.1, Q11.2 | Atlikti procedūrą gali tik šių medicinos pagalbos priemonių taikymo patirties turintis gydytojas oftalmologas. Centralizuotai apmokama iki 2016-12-31.                                                                                                                                                                      | 300–330 |
| 3.6. | Degunies terapijos priemonės |  | J96.1, J96.9               | Skiriama vadovaujantis Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Ambulatorinio gydymo deguonimi išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Centralizuotai apmokama iki 2016-12-31. | 700–800 |

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-1295](#), 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19605  
 Nr. [V-1466](#), 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00091  
 Nr. [V-352](#), 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03943  
 Nr. [V-584](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027  
 Nr. [V-762](#), 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09329  
 Nr. [V-835](#), 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-08, i. k. 2015-11154  
 Nr. [V-1185](#), 2015-10-23, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16955  
 Nr. [V-1386](#), 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19230  
 Nr. [V-1493](#), 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21004  
 Nr. [V-84](#), 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-25, i. k. 2016-01554  
 Nr. [V-158](#), 2016-02-05, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02464  
 Nr. [V-301](#), 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04270  
 Nr. [V-980](#), 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20951

**Pakeitimai:**

1.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-1295](#), 2014-12-11, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19605  
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1466](#), 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00091

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-352](#), 2015-03-13, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03943

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-584](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07027

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-762](#), 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-15, i. k. 2015-09329

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-835](#), 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-08, i. k. 2015-11154

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1185](#), 2015-10-23, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16955

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1386](#), 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19230

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1493](#), 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21004

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-84](#), 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-25, i. k. 2016-01554

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-158](#), 2016-02-05, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02464

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-301](#), 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-04, i. k. 2016-04270

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-917](#), 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-11, i. k. 2016-19763

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-980](#), 2016-07-21, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20951

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo