

Įsakymas netenka galios 2004-01-01:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-264](#), 2003-06-30, Žin., 2003, Nr. 81(1)-3712 (2003-08-22), i. k. 1032330ISAK003D-264

Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2003-03-27 iki 2003-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. [102-3244](#), i. k. 1002330ISAK00000315

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S

**DĖL KARANTININIŲ ORGANIZMŲ, AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR KITŲ
OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO IR 1998 12 28 ĮSAKIMO NR. 321 PRIPAŽINIMO
NETEKUSIU GALIOS**

2000 m. lapkričio 20 d. Nr. 315

Vilnius

Vadovaudamasis Fitosanitarijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. [113-3285](#)) 4 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 punktais ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 409 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė *acquis* priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir *acquis* įgyvendinimo priemonių 2000 m. planų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. [31-869](#)) patvirtintu Teisės derinimo priemonių 2000 m. planu (priemonių kodai 3.4.2.7-T-A2, 3.4.2.7-T-A4),

1. T v i r t i n u karantininių organizmų sąrašus pagal priedus:

1.1. augalams kenksmingi organizmai, kuriuos įvežti ir platinti Lietuvoje draudžiama (1 priedas);

1.2. augalams kenksmingi organizmai, kurių įvežimas į Lietuvą draudžiamas, jei jie randami ant išvardytų augalų ir augalinės kilmės produktų (2 priedas);

1.3. augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką draudžiama (3 priedas);

1.4. augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurie turi atitikti specialiuosius reikalavimus juos įvežant į Lietuvos Respubliką (4 priedas);

1.5. augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina gamybos vietoje ir įvežant į Lietuvos Respubliką (5 priedas).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1998 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 321 „Dėl karantininių organizmų sąrašų patvirtinimo ir 1993 08 08 įsakymo Nr. 631 pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 1998, Nr. [115-3278](#)).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

ŽEMĖS ŪKIO Ministras

Kęstutis Kristinaitis

PATVIRTINTA
žemės ūkio ministro
2000 11 20 įsakymu Nr. 315
1 priedas

AUGALAMS KENKSMINGI ORGANIZMAI, KURIUOS ĮVEŽTI IR PLATINTI LIETUVOJE DRAUDŽIAMA

I. KENKSMINGI ORGANIZMAI, NEAPTINKAMI LIETUVOJE

1. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose:
 - 1.1. *Acleris* spp. – plokštieji lapsukiai (ne Europos);
 - 1.2. *Amauromyza maculosa* (Malloch) – chrizanteminė minamusė;
 - 1.3. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) – rytinis ūsuotis;
 - 1.4. *Anoplophora chinensis* (Thomson) – citrinmedinis ūsuotis;
 - 1.5. *Anoplophora malasiaca* (Forster) – baltataškis ūsuotis;
 - 1.6. *Arrhenodes minutus* Drury – mažasis ilgvabalis;
 - 1.7. *Bemisia tabaci* Genn. – tabakinis baltasparnis (Europos ir ne Europos);
 - 1.8. *Blitopertha orientalis* (Waterhouse) – rytinis grambuolys;
 - 1.9. *Cacoecimorpha pronubana* Hubner – pietinis lapsukis;
 - 1.10. *Callosobruchus chinensis* L. – kininis grūdinukas;
 - 1.11. *Callosobruchus maculatus* F. – keturtaškis grūdinukas;
 - 1.12. *Cicadellidae* – cikadėlės (ne Europos), žinomos kaip Pirso ligos (sukeliamos *Xylella fastidiosa*) nešiotojos:
 - 1.12.1. *Carneocephala fulgida* Nottingham – blizgančioji cikadėlė;
 - 1.12.2. *Draeculacephala minerva* Ball – raguotoji cikadėlė;
 - 1.12.3. *Graphocephala atropunctata* (Signoret) – tamsiadėmė cikadėlė;
 - 1.13. *Choristoneura* spp. – tamsieji lapsukiai (ne Europos);
 - 1.14. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst) – slyvinis straubliukas;
 - 1.15. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence – šiaurinis lapgraužis;
 - 1.16. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber – Hovardo dėmėtasis lapgraužis;
 - 1.17. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim – agurkinis dėmėtasis lapgraužis;
 - 1.18. *Diabrotica virgifera* Le Conte – vakarinis lapgraužis;
 - 1.19. *Globodera pallida* (Stone) Behrens – blyškasis bulvinis nematodas;
 - 1.20. *Helicoverpa armigera* (Hubner) – gelsvapilkis saulinukas;
 - 1.21. *Helicoverpa zea* (Boddie) – kukurūzinis saulinukas;
 - 1.22. *Hirschmanniella* spp. – nematodai, išskyrus *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc et Goodey – hiršmanielos nematodą;
 - 1.23. *Hyphantria cunea* (Drury) – amerikinė meškutė;
 - 1.24. *Liriomyza sativae* (Blanchard) – daržovinė minamusė;
 - 1.25. *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) – amerikinė minamusė;
 - 1.26. *Liriomyza trifolii* (Burgess) – šilumamėgė minamusė;
 - 1.27. *Longidorus* spp. – longidorai, išskyrus *Longidorus elongatus* (de Man) Thorne-Swanger – pailgąjį longidorą;
 - 1.28. *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* – kolumbinis gūlinis nematodas (visa populiacija);
 - 1.29. *Meloidogyne fallax* Karsen – klastingasis gūlinis nematodas;
 - 1.30. *Monochamus* spp. – ožiaragiai (ne Europos);
 - 1.31. *Myndus crudus* Van Duzee – palminė cikada;
 - 1.32. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne & Allen – netikrasis gūlinis nematodas;
 - 1.33. *Opogona sacchari* (Bojer) – bananinė kandis;

- 1.34. *Premnotrypes* spp. – andų straubliukai (ne Europos);
- 1.35. *Pseudopithyophthorus minutissimus* (Zimmermann) – raudonažuolė kinivarpa;
- 1.36. *Pseudopithyophthorus pruinus* (Eichhoff) – ažuolinė kinivarpa;
- 1.37. *Popillia japonica* (Newman) – japoninis vabalas;
- 1.38. *Rhizococcus hibisci* Kawai & Takagi – ybiškinis skydamaris;
- 1.39. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee) – baltajuostė cikadėlė;
- 1.40. *Spodoptera eridania* (Cramer) – pietinis dykrinukas;
- 1.41. *Spodoptera littoralis* (Boisduval) – afrikinis dykrinukas;
- 1.42. *Spodoptera frugiperda* (Smith) – kukurūzinis dykrinukas;
- 1.43. *Spodoptera litura* (Fabricius) – azijinis dykrinukas;
- 1.44. *Thrips palmi* Karny – palminis tripsas (Europos ir ne Europos);
- 1.45. *Tephritidae* – margasparnės musės (ne Europos):
 - 1.45.1. *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann) – panašioji margasparnė;
 - 1.45.2. *Anastrepha ludens* (Loew) – meksikinė margasparnė;
 - 1.45.3. *Anastrepha obliqua* Masquart – įstrižoji margasparnė;
 - 1.45.4. *Anastrepha suspensa* (Loew) – karibų margasparnė;
 - 1.45.5. *Dacus ciliatus* Loew – moliūginė margasparnė;
 - 1.45.6. *Bactrocera cucurbitae* Coquillett – agurkinė margasparnė;
 - 1.45.7. *Bactrocera dorsalis* Hendel – bananinė margasparnė;
 - 1.45.8. *Bactrocera tryoni* (Froggatt) – spiečiančioji margasparnė;
 - 1.45.9. *Bactrocera tsuneonis* Miyake – mandarininė margasparnė;
 - 1.45.10. *Bactrocera zonata* (Saunders) – persikinė margasparnė;
 - 1.45.11. *Euphranta canadensis* (Loew) – kanadinė margasparnė;
 - 1.45.12. *Trirhithromyia cyanescens* Bezzi – melsvoji margasparnė;
 - 1.45.13. *Ceratitis capitata* (Wiedemann) – viduržemio margasparnė;
 - 1.45.14. *Ceratitis quinaria* Bezzi – abrikosinė margasparnė;
 - 1.45.15. *Ceratitis rosa* (Karsch) – afrikinė margasparnė;
 - 1.45.16. *Euphranta japonica* Ito – japoninė margasparnė;
 - 1.45.17. *Rhagoletis cingulata* (Loew) – trešninė margasparnė;
 - 1.45.18. *Rhagoletis completa* Cresson – riešutmedinė margasparnė;
 - 1.45.19. *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken) – kaulavaisinė margasparnė;
 - 1.45.20. *Rhagoletis indifferens* Curran – slyvinė margasparnė;
 - 1.45.21. *Rhagoletis mendax* Curran – šilauoginė margasparnė;
 - 1.45.22. *Rhagoletis pomonella* Walsh – obuolinė margasparnė;
 - 1.45.23. *Rhagoletis ribicola* Doane – agrastinė margasparnė;
 - 1.45.24. *Rhagoletis suavis* (Loew) – dailioji margasparnė;
- 1.46. *Trogoderma granarium* Everts – kapravabalis;
- 1.47. *Xiphinema* spp. – durkliniai nematodai.
2. Bakterijos:
 - 2.1. *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) – Pirsio liga;
 - 2.2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* – bulvių rudasis puvinys.
3. Grybai:
 - 3.1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt – ažuolų vytulys;
 - 3.2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel – eglių raganų šluotų auksarūdė;
 - 3.3. *Cronartium* spp. – veimutrūdės (ne Europos);
 - 3.4. *Endocronartium harknessii* J. P. More – pušų gijų veimutrūdė;
 - 3.5. *Botryosphaeria laricina* (K. Sawada) Y. Zhang – maumedžių ūglių degligė;
 - 3.6. *Gymnosporangium* spp. – gleivetrūdės (ne Europos);
 - 3.7. *Phellinus weirii* (Murrill) R. L. Gilbertson – spygliuočių šaknų žiedinis puvinys;
 - 3.8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis – cūgų rūdligė;
 - 3.9. *Melampsora medusae* Thumen – tuopų rūdligė;
 - 3.10. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey – rudasis vaisių puvinys;

- 3.11. *Mycosphaerella larici-leptolepidis* K. Ito et al. – japoninių maumedžių spygliakritis;
 - 3.12. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson – tuopų degligė;
 - 3.13. *Phoma andina* Turkensteen – bulvių lapų juodoji dėmėtligė;
 - 3.14. *Phylosticta solitaria* Ell. & Evern. – obelių dėmėtligė;
 - 3.15. *Septoria lycopersici* Speg var. *malagutii* Ciccarone et Boerema – bulvių septoriozė;
 - 3.16. *Thecaphora solani* (Thir. & O'Brien) Mordue – bulvių kūlės;
 - 3.17. *Tilletia indica* Mitra – indijinės kūlės;
 - 3.18. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) D. P. Rogers & H. S. Jacson – medvilnės teksasinis puvinys.
4. Virusai ir į juos panašūs organizmai:
 - 4.1. *Apple proliferation mycoplasm* – obelių gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazma;
 - 4.2. *Apricot chlorotic leafroll mycoplasm* – abrikosų chlorotiško lapų susisukimo mikoplazma;
 - 4.3. *Beet necrotic yellow vein furovirus* (Rhizomania) – runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furovirusas (Rhizomania);
 - 4.4. *Pear decline mycoplasm* – kriaušių nykimo mikoplazma;
 - 4.5. *Elm phloem necrosis phytoplasma* – guobų (vinkšna, skirpstas) karnienos nekrozės fitoplazma;
 - 4.6. Bulvių virusai ir į virusus panašūs organizmai:
 - 4.6.1. *Andean potato latent virus* – bulvių Andų latentinis virusas;
 - 4.6.2. *Andean potato mottle virus* – bulvių Andų margligės virusas;
 - 4.6.3. *Arracacha potato B, oca strain* – arakacijos B virusas Oca štamais;
 - 4.6.4. *Potato black ringspot virus* – bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės virusas;
 - 4.6.5. *Potato spindle tuber viroid* – bulvių gumbų verpstiško viroidas;
 - 4.6.6. *Potato virus T* – bulvių T virusas;
 - 4.6.7. ne Europos izoliuoti bulvių A, M, S, V, X, ir Y (įskaitant Y⁰, Yⁿ ir Y^c) virusai ir *Potato leaf roll virus* – bulvių lapų susisukimo virusas;
 - 4.7. *Tobacco ringspot virus* – tabako žiediškosios dėmėtligės virusas;
 - 4.8. *Tomato ringspot virus* – pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas;
 - 4.9. *Tomato spotted wilt virus* / *Impatiens necrotic spot virus* – pomidorų dėmėtojo vytulio virusas / sprigių nekrotinės dėmėtligės virusas;
 - 4.10. Virusai ir į juos panašūs organizmai, kurie kenkia cidonijų (*Cydonia* Mill.), žemuogių ir braškių (*Fragaria* L.), obelių (*Malus* Mill.), slyvų (*Prunus* L.), kriaušių (*Pyrus* L.), serbentų (*Ribes* L.), aviečių (*Rubus* L.) ir vynuogių (*Vitis* L.) augalams:
 - 4.10.1. *Blueberry leaf mottle virus* – mėlynių lapų margligės virusas;
 - 4.10.2. *Cherry rasp leaf virus* (American) – vyšnių lapų šiurkštumo virusas;
 - 4.10.3. *Peach mosaic virus* (American) – persikų mozaikos virusas;
 - 4.10.4. *Peach phony rickettsia* – persikų netikroji riketcija;
 - 4.10.5. *Peach rosette mosaic virus* – persikų skrotelių mozaikos virusas;
 - 4.10.6. *Peach rosette mycoplasm* – persikų skrotelių mikoplazma;
 - 4.10.7. *Peach X-disease mycoplasm* – persikų X-ligos mikoplazma;
 - 4.10.8. *Peach yellows mycoplasm* – persikų geltos mikoplazma;
 - 4.10.9. *Plum line pattern virus* (American) – slyvų amerikinės juostligės virusas;
 - 4.10.10. *Strawberry latent „C“ virus* – žemuogių latentinis C virusas;
 - 4.10.11. *Strawberry vein banding virus* – žemuogių priegyslinės margligės virusas;
 - 4.10.12. *Strawberry witches' broom mycoplasm* – žemuogių raganų šluotų mikoplazma;
 - 4.10.13. ne Europos virusai ir į virusus panašūs organizmai, kurie kenkia cidonijų (*Cydonia* Mill.), žemuogių ir braškių (*Fragaria* L.), obelių (*Malus* Mill.), slyvų (*Prunus* L.), kriaušių (*Pyrus* L.), serbentų (*Ribes* L.), aviečių (*Rubus* L.) ir vynuogių (*Vitis* L.) augalams;
 - 4.11. Virusai, platinami *Bemisia tabaci* Genn. – tabakinio baltaspurnio:
 - 4.11.1. *Bean golden mosaic virus* – pupelių auksinės mozaikos virusas;

- 4.11.2. *Cow pea mild mottle virus* – vėgnos silpnosios margligės virusas;
- 4.11.3. *Lettuce infectious yellow virus* – salotų infekcinės geltligės virusas;
- 4.11.4. *Pepper mild tigré virus* – paprikos silpnosios margligės virusas;
- 4.11.5. *Squash leaf curl virus* – moliūgų lapų garbanės virusas;
- 4.11.6. *Euphorbia mosaic virus* – krapažolių mozaikos virusas;
- 4.11.7. *Florida tomato virus* – floridos pomidorų virusas.
- 5. Parazitiniai augalai – *Arceuthobium* spp. – nykštukiniai amalai (ne Europos).

II. KENKSMINGI ORGANIZMAI, RIBOTAI PAPLITĘ LIETUVOJE

- 6. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose:
 - 6.1. *Frankliniella occidentalis* Pergande – vakarinis tripsas;
 - 6.2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens – auksinis bulvinis nematodas;
 - 6.3. *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) – bulvinė minamusė.
- 7. Grybai – *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival. – bulvių vėžys.
- 8. Bakterijos – *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis *et al.* – bulvių žiedinis puvinys.

III. KARANTININĖS PIKTŽOLĖS

9. Karantininės piktžolės:

- | | |
|---|---------------------------|
| 9.1. <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC. | – karčioji šerpeta; |
| 9.2. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. | – kietinė ambrozija; |
| 9.3. <i>Ambrosia trifida</i> L. | – triskiautė ambrozija; |
| 9.4. <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. | – plikavarpė ambrozija; |
| 9.5. <i>Cuscuta campestris</i> Junck. | – dirvinis brantas; |
| 9.6. <i>Iva axilaris</i> Pursh. | – daugiametė grūstė; |
| 9.7. <i>Solanum cornutum</i> Lam. | – raguotoji kiauliauogė; |
| 9.8. <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. | – linijalapė kiauliauogė; |
| 9.9. <i>Solanum carolinense</i> L. | – karolininė kiauliauogė. |

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [91](#), 2002-03-19, Žin., 2002, Nr. 31-1164 (2002-03-27), i. k. 1022330ISAK00000091

PATVIRTINTA
žemės ūkio ministro
2000 11 20 įsakymu Nr. 315
2 priedas

**AUGALAMS KENKSMINGI ORGANIZMAI, KURIŲ ĮVEŽIMAS Į LIETUVĄ
DRAUDŽIAMAS, JEI JIE RANDAMI ANT IŠVARDYTŲ AUGALŲ IR AUGALINĖS
KILMĖS PRODUKTŲ**

I. KENKSMINGI ORGANIZMAI, NEAPTINKAMI LIETUVOJE

1. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose:

Rūšis	Užkrėtimo objektas
1.1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer – fuksijinė gumbaerkė	Fuksijų (<i>Fuchsia</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
1.2. <i>Aleurocanthus</i> spp. – azijiniai baltasparniai	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.3. <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling – japoninis žiedgraužis	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
1.4. <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say – vakarinis žiedgraužis	Cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), slyvų (<i>Prunus</i> L.) ir kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
1.5. <i>Anthonomus signatus</i> (Say) – braškinis žiedgraužis	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
1.6. <i>Aonidielle citrina</i> (Coquillett) – geltonasis skydamaris	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.7. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie – ryžinis nematodas	Ryžių (<i>Oryza</i> spp.) sėklos bei žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.) augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas
1.8. <i>Aschitonyx eppoi</i> Inouye – japoninis gumbauodis	Kadagių (<i>Juniperus</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių
1.9. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle et al. – pušinis stiebinis nematodas	Kėnių (<i>Abies</i> Mill.), kedrų (<i>Cedrus</i> Trew), maumedžių (<i>Larix</i> Mill.), eglių (<i>Picea</i> A. Dietr), pušų (<i>Pinus</i> L.), pocūgių (<i>Pseudotsuga</i> Carr.) ir cūgų (<i>Tsuga</i> Carr.) augalai, išskyrus kankorėžius ir sėklas; ir pušinių (<i>Pinaceae</i>) mediena

1.10. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham – japoninė karposina	Cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), slyvų (<i>Prunus</i> L.) ir kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, išskyrus sėklas
1.11. <i>Nealiturus haematoceps</i> (Mulsant et Rey) – leukonijinė cikadėlė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.12. <i>Circulifer tenellus</i> (Baker) – runkelinė cikadėlė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.13. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) – vynuoginė filoksera	Vynmedžių (<i>Vitis</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.14. <i>Diaphora citri</i> Kuway- citrusinė blakutė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.15. <i>Cydia packardi</i> (Zeller) – šilauoginis vaisėdis	Cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), slyvų (<i>Prunus</i> L.) ir kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
1.16. <i>Cydia prunivora</i> Walsh – amerikinis vaisėdis	Cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), slyvų (<i>Prunus</i> L.) ir kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
1.17. <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) – citrusinė erkė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.18. <i>Eotetranychus orientalis</i> (Klein) – rytinė erkė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.19. <i>Cydia inopinata</i> (Heinrich) – mandžiūrinis vaisėdis	Cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), slyvų (<i>Prunus</i> L.) ir kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
1.20. <i>Grapholita molesta</i> (Busck) – rytinis vaisėdis	Cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), slyvų (<i>Prunus</i> L.) ir kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.21. <i>Hishomonus phycitis</i> – sezaminė cikada	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.22. <i>Lopholencaspis japonica</i> Cockerel – japoninis skydamaris	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

1.23. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) – svidrinis straubliukas	Kryžmažiedžių (<i>Cruciferae</i>), varpinių (<i>Gramineae</i>) ir dobilų (<i>Trifolium</i> spp.) sėklos, kilusios iš Argentinos, Australijos, Bolivijos, Čilės, Naujosios Zelandijos ir Urugvajaus
1.24. <i>Margarodes</i> spp.- didieji skydamariai (ne Europos rūšys):	Vynmedžių (<i>Vitis</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.24.1. <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) – vynmedinis skydamaris;	
1.24.2. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk – perlinis skydamaris;	
1.24.3. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) – margarodinis skydamaris	
1.25. <i>Numonia pirivorella</i> (Matsumura) – kriaušinis ugniukas	Kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių
1.26. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker – kadaginė erkė	Kadagių (<i>Juniperus</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš ne Europos šalių
1.27. <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner) – juodasis skydamaris	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.28. <i>Phthorimaea operculella</i> Zeller – bulvinė kandis	Kiauliauoginių (<i>Solanaceae</i>) augalai ir stiebagumbiai, skirti sodinti, išskyrus sėklas
1.29. <i>Pissodes</i> spp. – smaliukai (ne Europos)	Pušinių (<i>Pinaceae</i>) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, pušinių (<i>Pinaceae</i>) mediena su žieve ir pušinių (<i>Pinaceae</i>) nuimta žievė, kilę iš ne Europos šalių
1.30. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan – citrinmedinis nematodas	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas, ir arekinių (<i>Araceae</i>), marantinių (<i>Marantaceae</i>), bananinių (<i>Musaceae</i>), persėjų (<i>Persea</i> spp.), strelicijinių (<i>Strelitziaceae</i>) augalai, įšaknydinti ar su substratu
1.31. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne – bananinis nematodas	Arekinių (<i>Araceae</i>), marantinių (<i>Marantaceae</i>), persėjų (<i>Persea</i> spp.), strelicijinių (<i>Strelitziaceae</i>) augalai, įšaknydinti ar su substratu
1.32. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure – afrikinis tripsas	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

1.33. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood – arbatinis tripsas	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.34. <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) – vynuoginis tripsas	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.35. <i>Scolytidae</i> – kinivarpos (ne Europos)	Pušinių (<i>Pinaceae</i>) augalai, aukštesni nei 3m, išskyrus kankorėžius ir sėklas, pušinių (<i>Pinaceae</i>) mediena su žieve, nuimta pušinių (<i>Pinaceae</i>) žievė, kilę ne iš Europos šalių
1.36. <i>Toxoptera citricidus</i> (Kirkaldy) – citrinmedinis amaras	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
1.37. <i>Trioza erytreae</i> (Del Guercio) – citrinmedinė blakutė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai ir (<i>Clausena</i> Burm.), išskyrus vaisius ir sėklas
1.38. <i>Unaspis citri</i> (Comstock) – apelsininis skydamaris	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

2. Bakterijos:

Sukėlėjas – ligos pavadinimas	Užkrėtimo objektas
2.1. <i>Citrus greening bacterium</i> – citrusinių bakterinė mozaika	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
2.2. <i>Citrus variegated chlorosis</i> – citrusinių margoji chlorozė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
2.3. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones – pupelių bakterinis vytulys	Pupelių (<i>Phaseolus</i> spp.) sėklos

2.4. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> – vaismedžių bakterinė degligė	Svarainių (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), kaulenių (<i>Cotoneaster</i> Ehrh.), gudobelių (<i>Crataegus</i> L.), cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), lokvų (<i>Eriobotrya</i> Lindl.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), šliandrų (<i>Mespilus</i> L.), dyglainių (<i>Pyracantha</i> Roem.), kriaušių (<i>Pyrus</i> L.), šermukšnių (<i>Sorbus</i> L.), išskyrus švedinių šermukšnių (<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.), ir (<i>Stranvaesia</i> Lindl.) augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas
2.5. <i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder <i>et. al.</i> – gvazdikų indų bakteriozė	Gvazdikų (<i>Dianthus</i> L.), chrizantemų (<i>Chrysanthemum</i> (sensu lato)), jurginų (<i>Dahlia</i> Cav.), difenbachijų (<i>Dieffenbachia</i> spp.), filodendrų (<i>Philodendron</i> spp.), puošniausiųjų krapažolių (<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch), raudonžiedžių kalankių (<i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Goelln.), bananų (<i>Musa</i> L.), našlaitinių sanpaulijų (<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.) augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas
2.6. <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert <i>et al.</i> – kukurūzų bakterinis vytulys	Paprastųjų kukurūzų (<i>Zea mais</i> L.) sėklos
2.7. <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi <i>et al.</i> – gvazdikų bakterinis vytulys	Gvazdikų (<i>Dianthus</i> L.) augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas
2.8. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i> – persikų ūglių bakteriozė	Paprastųjų persikų (<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.) ir (<i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait) Maxim.) augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas
2.9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Dye – citrinmedžių bakterinis vėžys	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
2.10. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> – slyvų lapų bakterinė dėmėtligė	Slyvų (<i>Prunus</i> L.) augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas
2.11. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (Mc Culloch et Pirone) Vauterin <i>et al.</i> – difenbachijų lapų bakterinė dėmėtligė	Dekoratyviniai arekinių (<i>Arecaceae</i>) augalai
2.12. <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> – pomidorų juodoji bakterinė dėmėtligė (rauplės)	Valgomųjų pomidorų (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.) ir paprikų (<i>Capsicum</i> spp.) augalai, skirti sodinti
2.13. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy <i>et King</i> – braškių lapų kampuotoji dėmėtligė	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.) augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

2.14. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings and <i>et al.</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang <i>et al.</i>) Swings <i>et al.</i> – ryžių bakterinė degligė ir bakterinė dryžligė	Ryžių (<i>Oryza</i> spp.) sėklos
2.15. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>hyacinthi</i> (Wakk) Downs. – jacintų geltonoji bakteriozė	Hiacintų (<i>Hyacinthus</i> L.) gumbasvogūniai
2.16. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i> – vynuogių bakterinė degligė	Vynmedžių (<i>Vitis</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

3. Grybai:

Sukėlėjas – ligos pavadinimas	Užkrėtimo objektas
3.1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler – alternariozinė lapų dėmėtligė (ne Europos)	Cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.) ir kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
3.2. <i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) v. Arx – slyvų šakų juodasis vėžys	Slyvų (<i>Prunus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
3.3. <i>Atropellis</i> spp. – pušų šakų ir kamienų vėžys	Pušų (<i>Pinus</i> L.) augalai, mediena ir nuimta žievė, išskyrus kankorėžius ir sėklas
3.4. <i>Botryosphaeria berengeriana</i> de Notaris f. sp. <i>piricola</i> (Nose) Kog. <i>et</i> Sak. – obelių žievės žiedinis puvinys	Cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), slyvų (<i>Prunus</i> L.) ir kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
3.5. <i>Ceratocystis coerulescens</i> Münch. – klevų viršūnių džiūсна	Cukrinių klevų (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) augalai ir mediena, įskaitant ir natūraliai apvalaus paviršiaus neturinčią, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę iš Šiaurės Amerikos šalių
3.6. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter – platanų mėlynasis vėžys	Platanų (<i>Platanus</i> L.) augalai, skirti auginimui, ir mediena, įskaitant ir natūraliai apvalaus paviršiaus neturinčią, išskyrus sėklas
3.7. <i>Cercoseptoria pini densiflorae</i> (Hora <i>et</i> Nambu) Deighton – pušų spyglių degligė.	Pušų (<i>Pinus</i> L.) augalai ir mediena, išskyrus kankorėžius ir sėklas
3.8. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn – kamelijų žiedų degligė	Kamelijų (<i>Camellia</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
3.9. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds – braškių juodoji dėmėtligė	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.) augalai, skirti auginti, ir sėklos

3.10. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murril) Barr. – kaštainių žievės vėžys	Kaštainių (<i>Castanea</i> Mill.) ir ąžuolų (<i>Quercus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas, kaštainių (<i>Castanea</i> Mill.) mediena ir nuimta žievė.
3.11. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davies) v. Arx – chrizantemų askochitozė	Chrizantemų (<i>Chrysanthemum</i> (sensu lato)) augalai, išskyrus sėklas
3.12. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer. – fomopsinis šilauogių vėžys	Šilauogių (<i>Vaccinium</i> spp.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
3.13. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes – antraknozė	Kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius bei sėklas, taip pat citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.) augalai bei jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas, išskyrus mandarininių citrinmedžių citrinmedžių (<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck) vaisius, kilusius iš Pietų (<i>Citrus reticulata</i> Blanco) ir apelsininių Amerikos šalių
3.14. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albenensis</i> (Kilian et Maire) Gordon – fuzarinis vytulys	Finikų (<i>Phoenix</i> spp.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas
3.15. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely – juodoji dėmėtligė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas
3.16. <i>Phaeoramularia angolensis</i> (Carv. et Mendes) P. M. Kirk. – citrusinių cerkosporiozė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas
3.17. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma – gvazdikų žydroji džiūсна	Gvazdikų (<i>Dianthus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
3.18. <i>Phoma exiqua</i> var. <i>foveata</i> (Foister) Boer. – bulvių gangrena	Sėklinių valgomųjų bulvių (<i>Solanum tuberosum</i> L.) stiebagumbiai
3.19. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili – malseko liga	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas
3.20. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> Wilcox et Duncan – gervuogių fitoftorozė	Aviečių ir gervuogių (<i>Rubus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
3.21. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni – saulėgrąžų netikroji miltligė	Tikrųjų saulėgrąžų (<i>Helianthus annuus</i> L.) augalai ir sėklos
3.22. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings – bulvių rūdligė	Kiauliauoginių (<i>Solanaceae</i>) augalai, išskyrus stiebagumbius ir sėklas

3.23. <i>Mycosphaerella dearnessii</i> M. E. Bar – rudoji spyglių dėmėtligė	Pušų (<i>Pinus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus kankorėžius ir sėklas
3.24. <i>Mycosphaerella pini</i> E. Rostrup – raudonkraštė spyglių dėmėtligė	Pušų (<i>Pinus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus kankorėžius ir sėklas
3.25. <i>Tilletia controversa</i> Kuhn. – nykštukinės kūlės	Kviečių (<i>Triticum</i> L.), rugių (<i>Secale</i> L.) ir kvietrugių (x <i>Triticosecale</i>)
3.26. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto – kriaušių japoninės rauplės	Kriaušių (<i>Pyrus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
3.27. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Bertholde – apynių verticiliozė	Paprastųjų apynių (<i>Humulus lupulus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
3.28. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn – apynių verticiliozė	Paprastųjų apynių (<i>Humulus lupulus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas

4. Virusai ir į juos panašūs organizmai:

Sukėlėjas	Užkrėtimo objektas
4.1. <i>Arabid mosaic virus</i> – vaistučio mozaikos virusas	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.), aviečių (<i>Rubus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.2. <i>Beet curly top virus</i> – runkelių viršūnių garbanės virusas (ne Europos izoliatai)	Paprastųjų runkelių (<i>Beta vulgaris</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.3. <i>Beet leaf curl virus</i> – runkelių lapų garbanės virusas	Paprastųjų runkelių (<i>Beta vulgaris</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.4. <i>Black raspberry latent virus</i> – gervuogių latentinis virusas	Aviečių (<i>Rubus</i> L.) augalai, skirti auginti
4.5. <i>Blight and Blight-like</i> – deguliai arba į degulius panašūs	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
4.6. <i>Cadang-Cadang viroid</i> – Cadang-Cadang viroidas	Arekinių (<i>Arecaceae</i>) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
4.7. <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> – chrizantemų žemaūgės viroidas	Arekinių (<i>Arecaceae</i>) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
4.8. <i>Citrus triteza virus</i> – citrusinių greito sunykimo virusas (ne Europos izoliatai)	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

4.9. <i>Citrus vein enation woody gall</i> – citrusinių gyslų sumedėjusių išaugų ‘virusas’	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
4.10. <i>Cherry leaf roll virus</i> – vyšnių lapų susisukimo virusas	Aviečių (<i>Rubus</i> L.) augalai, skirti auginti
4.11. <i>Citrus mosaic virus</i> – citrusinių mozaikos virusas	Vynmedžių (<i>Vitis</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas
4.12. <i>Citrus tristeza virus</i> – citrusinių greito sunykimo virusas (ne Europos izoliatai)	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
4.13. <i>Grapevine Flavescence dorée MLO</i> – vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas	Vynmedžių (<i>Vitis</i> L.) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas
4.14. <i>Leprosis</i> – raupai	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas
4.15. <i>Little cherry pathogen</i> – vyšnių susmulkėjimo patogenas (ne Europos izoliatas)	Paprastųjų vyšnių (<i>Prunus cerasus</i> L.), trešnių (<i>Prunus avium</i> L.), <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., smailiadančių vyšnių (<i>Prunus serrulata</i> Lindl.), <i>speciosa</i> (Koidz) Ingram., <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Prunus Matsum. augalai ir jų hibridai bei veislės, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.16. <i>Naturally spreading psorosis</i> – natūraliai plintanti psorozė	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus sėklas
4.17. <i>Palm lethal yellowing mycoplasma</i> – palmių žudančiosios geltligės mikoplazma	Arekinių (<i>Arecaceae</i>) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas, kilę iš ne Europos šalių
4.18. <i>Potato stolbur mycoplasma</i> – bulvių stolburo mikoplazma	Kiauliuoginių (<i>Solanaceae</i>) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.19. <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> – slyvų nekrotinės žiediškosios dėmėtligės virusas	Aviečių (<i>Rubus</i> L.) augalai, skirti auginti
4.20. <i>Raspberry ringspot virus</i> – aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.), aviečių (<i>Rubus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.21. <i>Satsuma dwarf virus</i> – satsuma žemaūgės virusas	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

4.22. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> – citrusinių spirop plazma	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
4.23. Strawberry crinkle virus – žemuogių raukšlėtligės virusas	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.24. <i>Strawberry latent ringspot virus</i> – žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.), aviečių (<i>Rubus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.25. <i>Strawberry mild yellow edge virus</i> – žemuogių silpnojo pakraščių pageltimo virusas	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.26. <i>Tatter leaf virus</i> – tatter lapų virusas	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas
4.27. <i>Tomato black ring virus</i> – pomidorų juodojo žiediško virusas	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.), aviečių (<i>Rubus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
4.28. <i>Witches' broom (MLO)</i> – raganų šluotų mikoplazma	Citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

II. KENKSMINGI ORGANIZMAI, RIBOTAI PAPLITĘ LIETUVOJE

5. Vabzdžiai, erkės ir nematodai visose jų vystymosi stadijose:

Rūšis	Užkrėtimo objektas
5.1. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne – stiebinis bulvinis nematodas	Krokų (<i>Crocus</i> L.), kardelių (<i>Gladiolus</i> L.) rūšys ir jų hibridai, tokie kaip: (<i>Gladiolus callianthus</i> Marais.), (<i>Gladiolus colvillei</i> Sweet.), (<i>Gladiolus nanus</i> Hort.), (<i>Gladiolus ramosus</i> hort.), (<i>Gladiolus tubergenii</i> Hort.), hiacintų (<i>Hyacinthus</i> L.), vilkdalgių (<i>Iris</i> L.), tigrenių (<i>Tigridia</i> Juss.), tulpių (<i>Tulipa</i> L.) gumbasvogūniai ir šakniastiebiai, skirti sodinti, ir valgomųjų bulvių stiebagumbiai (<i>Solanum tuberosum</i> L.), skirti sodinti

5.2. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev – stiebinis nematodas	(<i>Allium ascalonicum</i> L.), valgomųjų svogūnų (<i>Allium cepa</i> L.), laiškinių česnakų (<i>Allium schoenoprasum</i> L.) sėklos ir svogūnai, skirti auginti, kamasijų (<i>Camassia</i> Lindl.), sniegžydrių (<i>Chionodoxa</i> Boiss.), geltonųjų krokų (<i>Crocus flavus</i> Weston „Golden Yellow“), snieguolių (<i>Galanthus</i> L.), balsvųjų galtonijų (<i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne), hiacintų (<i>Hyacinthus</i> L.), <i>Ismene</i> Herber, žydrių (<i>Muscari</i> Miller), narcizų (<i>Narcissus</i> L.), paukštpienių (<i>Ornithogalum</i> L.), puškinijų (<i>Puschkinia</i> Adams), scylių (<i>Scilla</i> L.), tulpių (<i>Tulipa</i> L.) svogūnai ir stiebagumbiai, skirti auginti, mėlynžiedžių liucernų (<i>Medicago sativa</i> L.) sėklos
---	--

6. Bakterijos:

Sukėlėjas – ligos pavadinimas	Užkrėtimo objektas
6.1. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davies <i>et al.</i> – liucernos bakterinis vytulys	Mėlynžiedžių liucernų (<i>Medicago sativa</i> L.) sėklos
6.2. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> – pomidorų bakterinis vėžys („paukščių akis“)	Valgomųjų pomidorų (<i>Lycopersicon esculentum</i> L.) augalai, skirti auginti
6.3. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> – pupelių bakterinė degligė (rudoji dėmėtligė)	Pupelių (<i>Phaseolus</i> L.) sėklos

7. Grybai:

Sukėlėjas – ligos pavadinimas	Užkrėtimo objektas
7.1. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> Wilc. <i>et</i> Dunc. – braškių šaknų šerdies raudonligė	Žemuogių ir braškių (<i>Fragaria</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas
7.2. <i>Puccinia horiana</i> Hennings – chrizantemų baltosios rūdys	Chrizantemų (<i>Chrysanthemum</i> (sensu lato)) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas

8. Virusai ir į juos panašūs organizmai:

Rūšis	Užkrėtimo objektas
8.1. <i>Plum pox virus</i> „ <i>Sharka</i> “ – slyvų raupligės virusas („Šarka“)	Slyvų (<i>Prunus</i> L.) augalai, skirti auginti, išskyrus sėklas

PATVIRTINTA
žemės ūkio ministro
2000 11 20 įsakymu Nr. 315
3 priedas

**AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KURIUOS ĮVEŽTI Į
LIETUVOS RESPUBLIKĄ DRAUDŽIAMA**

1. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką draudžiama

Aprašymas	Kilmės šalis
1.1. Augalai: kėniai (<i>Abies</i> Mill.), kedrai (<i>Cedrus</i> Trew), puskiparisiai (<i>Chamaecyparis</i> Spach), kadagiai (<i>Juniperus</i> L.), maumedžiai (<i>Larix</i> Mill.), eglės (<i>Picea</i> A. Dietr.), pušys (<i>Pinus</i> L.), pocūgės (<i>Pseudotsuga</i> Carr.) ir cūgos (<i>Tsuga</i> Carr.), išskyrus vaisius ir sėklas	Visos šalys, išskyrus Europos šalis*
1.2. Augalai: kaštainiai (<i>Castanea</i> Mill.) ir ąžuolai (<i>Quercus</i> L.) su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.3. Augalai: tuopos (<i>Populus</i> L.) su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas	Šiaurės Amerikos šalys
1.4. Nulupta pušinių (<i>Pinaceae</i>) žievė	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.5. Nulupta kaštainių (<i>Castanea</i> Mill.) žievė	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.6. Nulupta ąžuolų (<i>Quercus</i> L.) žievė, išskyrus kamštinių ąžuolų (<i>Quercus suber</i> L.)	Šiaurės Amerikos šalys
1.7. Nulupta cukrinių klevų (<i>Acer saccharum</i> Marsh) žievė	Šiaurės Amerikos šalys
1.8. Nulupta tuopų (<i>Populus</i> L.) žievė	Visos Amerikos žemynų šalys
1.9. Augalai: svarainiai (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), cidonijos (<i>Cydonia</i> Mill.), gudobelės (<i>Crataegus</i> L.), obelys (<i>Malus</i> Mill.), slyvos (<i>Prunus</i> L.), kriaušės (<i>Pyrus</i> L.) ir erškėčiai (<i>Rosa</i> L.), skirti sodinti, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.10. Augalai: fotinijos (<i>Photinia</i> Ldl.), skirtos sodinti, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių	JAV, Kinija, Japonija, Korėjos Respublika, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika
1.11. Valgomųjų bulvių (<i>Solanum tuberosum</i> L.) stiebagumbiai, skirti sodinti	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.12. Stolonius ar gumbus formuojantys kiaučiauogių (<i>Solanum</i> L.) rūšių augalai ar jų hibridai, skirti sodinti, išskyrus tuos valgomųjų bulvių (<i>Solanum tuberosum</i> L.) gumbus, kurie nurodyti (1.11.)	Visos šalys, išskyrus Europos šalis

* Geografiškai apibrėžtos Europos šalys, įskaitant Rusijos europinę dalį.

1.13. Stiebagumbiai kiauliuogių (<i>Solanum</i> L.) ir jų hibridų rūšių, išskyrus tuos, kurie išvardyti (1.11.) ir (1.12.)	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.14. Kiauliuoginių (<i>Solanaceae</i>) šeimos augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas ir augalus, išvardytus (1.11.), (1.12.) ar (1.13.)	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.15. Dirvožemis, organinės trąšos, augimo terpė, kurie visiškai ar dalinai sudaryti iš žemės ar kietų organinių dalių, tokių kaip augalų dalys, žievė, humusas, įskaitant durpes, išskyrus tuos, kurie sudaryti vien iš durpių	Visos šalys
1.16. Augalai: vynmedžiai (<i>Vitis</i> L.), išskyrus vaisius	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.17. Augalai: cidonijos (<i>Cydonia</i> Mill.), obelys (<i>Malus</i> Mill.), slyvos (<i>Prunus</i> L.), kriaušės (<i>Pyrus</i> L.) ir jų hibridai bei žemuogės ir braškės (<i>Fragaria</i> L.), skirti sodinti, išskyrus sėklas, neatsižvelgiant į draudimą, taikomą augalams, išvardytiems (1.9.)	Visos šalys, išskyrus Europos ir Viduržemio pajūrio šalis, Australiją, Naująją Zelandiją, Kanadą, JAV
1.18. Augalai: citrinmedžiai (<i>Citrus</i> L.), kinkanai (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirai (<i>Poncirus</i> Raf.) ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas	Visos šalys, išskyrus Europos šalis
1.19. Augalai: finikai (<i>Phoenix</i> L.), išskyrus vaisius ir sėklas	Alžyras, Marokas
1.20. Augalai: varpinių (<i>Gramineae</i>), išskyrus dekoratyvinius daugiamečius žolinius augalus <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> pošeimių ir (<i>Calamagrostis</i> Adans), kortaderijas (<i>Cortaderia</i> Stapf.), monažoles (<i>Glyceria</i> R. Br.), <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., lendrūnus <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , melvenes (<i>Molinia</i> Schrank), strypainius (<i>Phalaris</i> L.), <i>Shibataea</i> , spartinas (<i>Spartina</i> Schreb.), ašuotes (<i>Stipa</i> L.) ir <i>Uniola</i> L., skirtus sodinti, išskyrus sėklas	Visos šalys, išskyrus Europos ir Viduržemio pajūrio šalis
1.21. Kviečių (<i>Triticum</i>), rugių (<i>Secale</i>) ir kvietrugių (x) (<i>Triticosecale</i>) grūdai	Afganistanas, Indija, Irakas, JAV, Meksika, Nepalas, Pakistanas

PATVIRTINTA
žemės ūkio ministro
2000 11 20 įsakymu Nr. 315
4 priedas

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, KURIE TURI ATITIkti SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS JUOS ĮVEŽANT Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

1. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurie turi atitikti specialiuosius reikalavimus juos įvežant į Lietuvos Respubliką:

Augalai, augalinės kilmės produktai	Specialieji reikalavimai
1.1. Pušinių (<i>Pinaceae</i>), išskyrus tujas (<i>Thuja</i> L.), kitokios formos mediena nei: - drožlės, pjuvenos, atliekos ar gabaliukai, kurie visi ar jų dalis gauti iš pušinių medienos; - pakavimo dėžės, rėmai ar būgnai; - paletės, dėžės-paletės ar kitos pakavimo lentos; - padėklai po kroviniu, tarpikliai ir atramos, įskaitant medieną, kuri nėra natūraliai apvalaus paviršiaus, kilusi iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos, Taivano ir JAV	Oficialus patvirtinimas*, kad mediena buvo termiškai apdorota ir minimali medienos šerdies temperatūra 30 minučių siekė 56°C.
1.2. Pušinių (<i>Pinaceae</i>) medienos drožlės, dalelės, atliekos ar gabaliukai, kurie visi ar jų dalis gauti iš pušinių medienos, kilusios iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos, Taivano ir JAV	Oficialus patvirtinimas, kad: - produkcija buvo fumiguota laivo denyje ar konteineryje iki pakrovimo; - produkcija buvo gabenama užantspauduotuose konteineriuose ar kitokiu būdu taip, kad būtų apsaugota nuo bet kokio galimo užsikrėtimo kenksmingais organizmais.
1.3. Pušinių (<i>Pinaceae</i>) mediena, išskyrus tujas (<i>Thuja</i> L.), šių formų: pakavimo dėžės, rėmai, būgnai, paletės, dėžės – paletės ar kitos pakavimo lentos, padėklai po kroviniu, tarpikliai ir atramos, įskaitant medieną, kuri nėra natūraliai apvalaus paviršiaus, kilusi iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos, Taivano ir JAV	Mediena turi būti be žievės, be ožiaragių (<i>Monochamus</i> spp.) genties (ne europinio porūšio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens; mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, sudaro mažiau nei 20 procentų masės.
1.4. Tujų (<i>Thuja</i> L.) mediena, įskaitant tą, kuri nėra natūraliai apvalaus paviršiaus, kilusi iš Kanados, Kinijos, Japonijos, Korėjos, Taivano ir JAV	Mediena turi būti be žievės, be ožiaragių (<i>Monochamus</i> spp.) genties (ne europinio porūšio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens.

* Privaloma žyma fitosanitariniame sertifikate apie nurodytų priemonių taikymą.

1.5. Pušinių (<i>Pinaceae</i>) mediena, išskyrus drožlių, pjuvenų, atliekų ar gabaliukų formos, kuri visa ar jos dalis gauta iš pušinių medienos, įskaitant ir tą, kuri nėra natūraliai apvalaus paviršiaus, kilusi iš visų šalių, išskyrus Europos šalis	Mediena turi būti be žievės, be ožiaragių (<i>Monochamus</i> spp.) (ne europinio porūšio) lervų padarytų skylių, didesnių nei 3 mm skersmens; arba- turi būti aiškus ženklas „Kiln-dried“, „KD“ ar kitas tarptautinis ženklas, pažymėtas ant medienos ar jos pakuotės, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, sudaro mažiau nei 20 procentų masės.
1.6. Cukrinių klevų (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) mediena, įskaitant medieną, kuri nėra natūraliai apvalaus paviršiaus, išskyrus medieną, skirtą faneros gamybai, kilusi iš Šiaurės Amerikos šalių	Turi būti aiškus ženklas „Kiln-dried“, „KD“ ar kitas tarptautinis ženklas, pažymėtas ant medienos ar jos pakuotės, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, sudaro mažiau nei 20 procentų masės.
1.7. Cukrinių klevų (<i>Acer saccharum</i> Marsh.) mediena, išskyrus medieną, nurodytą 1.6 punkte, kilusi iš Šiaurės Amerikos šalių	Turi būti pateiktas įrodymas lydimaisiais dokumentais ar kitokiu būdu, kad mediena skirta faneros gamybai.
1.8. Kaštainių (<i>Castaneae</i> Mill.) ir ąžuolų (<i>Quercus</i> L.) mediena, įskaitant medieną, kuri nėra natūraliai apvalaus paviršiaus, kilusi iš Šiaurės Amerikos šalių	Mediena turi būti be žievės arba: - aptašyta taip, kad nebūtų natūraliai apvalaus paviršiaus; - oficialiai patvirtinta, kad drėgmės kiekis medienoje neviršija 20 procentų sausosios medžiagos, išreikštos procentais; - oficialiai patvirtinta, kad mediena buvo dezinfekuota karštu oru ar karštu vandeniu arba (pjautos medienos atveju) su žievės likučiais ar be jų, paženklinta „Kiln-dried“, „KD“ ar kitu tarptautiniu ženklu ant medienos ar jos pakuotės. Tai reikštų, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, sudaro mažiau nei 20 procentų masės.
1.9. Kaštainių (<i>Castaneae</i> Mill.) mediena	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - mediena kilusi iš teritorijos, kurioje nėra kaštainių žievės vėžio (<i>Cryphonectria parasitica</i> Barr.); - mediena yra be žievės.
1.10. Platanų (<i>Platanus</i> L.) mediena, įskaitant medieną, kuri nėra natūraliai apvalaus paviršiaus, kilusi iš JAV ar Armėnijos	Turi būti aiškus ženklas „Kiln-dried“, „KD“ ar kitas tarptautinis ženklas, pažymėtas ant medienos ar jos pakuotės, kad mediena išdžiovinta ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, sudaro mažiau nei 20 procentų masės.
1.11. Tuopų (<i>Populus</i> L.) mediena, kilusi iš abiejų Amerikos žemynų šalių	Mediena turi būti be žievės.

1.12. Medienos drožlės, pjuvenos, atliekos ar gabaliukai, kurie visi ar jų dalis gauti iš cukrinių klevų (*Acer saccharum* Marsh), kaštainių (*Castanea* Mill.), platanų (*Platanus* L.), tuopų (*Populus* L.) ir ąžuolų (*Quercus* L.), kilę iš visų šalių, išskyrus Europos, ir pušinių (*Pinaceae*) mediena, kilusi iš visų šalių, išskyrus Europos šalis, Kanadą, Kiniją, Japoniją, Korėją, Taivanį ir JAV

1.13. Pušinių (*Pinaceae*) augalai, išskyrus kankorėžius ir sėklas, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos šalis

1.14. Pušinių (*Pinaceae*) augalai, išskyrus kankorėžius ir sėklas, aukštesni nei 3 m, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos šalis

1.15. Augalai: pušys (*Pinus* L.), skirtos sodinti, išskyrus sėklas

1.16. Augalai: kėniai (*Abies* Mill.), maumedžiai (*Larix* Mill.), eglės (*Picea* A. Dietr.), pušys (*Pinus* L.), pocūgės (*Pseudotsuga* Carr.) ir cūgos (*Tsuga* Carr.), skirti sodinti, išskyrus sėklas

1.17. Augalai: kaštainiai (*Castanea* Mill.) ir ąžuolai (*Quercus* L.), išskyrus vaisius ir sėklas, kilę
- iš visų šalių, išskyrus Europos šalis
- iš Šiaurės Amerikos šalių

Produktas pagamintas tik iš medienos, kuri arba:

- be žievės;
- buvo išdžiovinta, ir drėgmė, išreikšta sausos medžiagos kiekiu, sudaro mažiau nei 20 procentų masės;
- fumiguota laivo denyje ar konteineriuose iki pakrovimo ir pervežama užantspauduotuose konteineriuose ar kitokiu būdu taip, kad būtų apsaugota nuo bet kokio galimo užsikrėtimo.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo išauginti medelynuose ir kad auginimo vieta neužkrėsta neeuropinio porūšio smaliukais (*Pissodes*).

Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo išauginti medelynuose ir kad auginimo vieta neužkrėsta neeuropinio porūšio kinivarpomis (*Scolytidae*).

Oficialus patvirtinimas, kad rudosios spyglių dėmėtligės (*Mycosphaerella dearnesii* M. E. Barr.) ir raudonkraštės spyglių dėmėtligės (*Mycosphaerella pini* E. Rostrup) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

Oficialus patvirtinimas, kad tuopų rūdligės (*Melampsora medusae* Thuemen) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

Oficialus patvirtinimas, kad veimutrūdžių (*Cronartium* spp. (neeuropinių)) rūšių požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta. Oficialus patvirtinimas, kad kilę iš teritorijų, kurios neužkrėstos ąžuolų vytuliu (*Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt.).

1.18. Augalai: kaštainiai (<i>Castanea</i> Mill.) ir ąžuolai (<i>Quercus</i> L.), skirti sodinti, išskyrus sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - augalai kilę iš teritorijų, neužkrėstų kaštonų žievės vėžiu (<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr); - kaštainių žievės vėžio (<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.19. Augalai: platanai (<i>Platanus</i> L.), skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš JAV ar Armėnijos	Oficialus patvirtinimas, kad jokių platanų mėlynojo vėžio (<i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. platani Walter) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.20. Augalai: tuopos (<i>Populus</i> L.), skirtos sodinti, išskyrus sėklas, kilusios iš visų šalių, išskyrus Europos šalis	Oficialus patvirtinimas, kad tuopų rūdligės (<i>Melampsora medusae</i> Thuemen) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.21. Augalai: tuopos (<i>Populus</i> L.), išskyrus vaisius ir sėklas, kilusios iš abiejų Amerikos žemynų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad tuopų degligės (<i>Mycosphaerella populorum</i> G. E. Thompson) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.22. Augalai: guobos (<i>Ulmus</i> L.), skirtos sodinti, išskyrus sėklas, kilusios iš Šiaurės Amerikos šalių	Oficialus patvirtinimas, kad guobų (vinkšna, skirpstas) karnienos nekrozės fitoplazmos (<i>Elm phloem necrosis phytoplasma</i>) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.23. Iš pušinių (<i>Pinaceae</i>) medienos pagaminta pakuotė (konteineriai, dėžės, paletės, būgnai, padėklai ir kt.), kilusi iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad pakuotei buvo naudojama arba: - tik be žievės mediena; - mediena, kilusi iš šalių, kur pušinio stiebinio nematodo (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle <i>et al.</i>) ir jo nešiotojų neeuropinio porūšio ožiaragių (<i>Monochamus</i> spp.) nerasta.
1.24. Pušinių (<i>Pinaceae</i>) mediena, kilusi iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad mediena kilusi iš šalių, kur pušinio stiebinio nematodo (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle <i>et al.</i>) ir jo nešiotojų neeuropinio porūšio ožiaragių (<i>Monochamus</i> spp.) nerasta.

1.25. Augalai ir skintos šakos: svarainių (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), kaulenių (<i>Cotoneaster</i> Ehrh.), gudobelių (<i>Crataegus</i> L.), cidonijų (<i>Cydonia</i> Mill.), obelių (<i>Malus</i> Mill.), dyglainių (<i>Pyracantha</i> Roem.), kriaušių (<i>Pyrus</i> L.), šermukšnių (<i>Sorbus</i> L.), išskyrus švedinius šermukšnius (<i>S. intermedia</i> (Ehrh.), (<i>Stranvaesia</i> Lindl.)	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš kultūrų, kurios pačios ir jų artimiausia aplinka yra neužkrėstos vaismedžių bakterine deglige (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>), ir atlikti oficialūs tyrimai per paskutinius du auginimo sezonus.
1.26. Augalai: svarainiai (<i>Chaenomeles</i> Lindl), gudobelės (<i>Crataegus</i> L.), cidonijos (<i>Cydonia</i> Mill.), lokvos (<i>Eriobotrya</i> Lindl.), obelys (<i>Malus</i> Mill.), slyvos (<i>Prunus</i> L.), kriaušės (<i>Pyrus</i> L.), kilę iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - augalai užauginti regionuose, kur rudojo vaisių puvinio (<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey) nepastebėta; - rudojo vaisių puvinio (<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey) požymių produkcijos augimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.27. Slyvų (<i>Prunus</i> L.) vaisiai nuo vasario 15 d. iki rugsėjo 30 d., kilę iš visų šalių, išskyrus Europos šalis	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - vaisiai kilę iš šalių, kurios neužkrėstos ruduoju vaisių puvinio (<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey); - vaisiai patikrinti ir tinkamai apdoroti prieš derliaus nuėmimą ir/ ar eksportą.
1.28. Augalai: citrinmedžiai (<i>Citrus</i> L.), kinkanai (<i>Fortunella</i> Swingle), persėjos (<i>Persea</i> spp.), poncirai (<i>Poncirus</i> Raf.), arekinių (<i>Araceae</i>), marantinių (<i>Maranthaceae</i>), bananinių (<i>Musaceae</i>), strelicinių (<i>Strelitziaceae</i>) šeimų, kilę iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę arba: - iš šalių, neužkrėstų citrusiniu nematodu (<i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan) ir bananiniu nematodu (<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne); - iš neužkrėstų citrusiniu nematodu (<i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan) ir bananiniu nematodu (<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne) produkcijos auginimo vietų. Tai nustatyta nematologiniais testais, ištyrus augimo substratą ir augalų šaknų pavyzdžius paskutinio vegetacijos ciklo metu.
1.29. Vaisiai: citrinmedžių (<i>Citrus</i> L.), kinkanų (<i>Fortunella</i> Swingle), poncirų (<i>Poncirus</i> Raf.) ir jų hibridų, kilusių iš visų šalių, išskyrus Europos šalis	Vaisiai turi būti be žiedkočių ir lapų ir ant pakuotės turi būti produkto kilmės ženklas.

1.30. Vaisiai: citrinmedžių (*Citrus L.*), kinkanų (*Fortunella Swingle*), poncirų (*Poncirus Raf.*) ir jų hibridų, kilusių iš visų šalių, išskyrus Europos šalis

Oficialus patvirtinimas, kad arba:

- vaisiai kilę iš šalies, kuri pripažinta neužkrėsta citrinmedžių bakteriniu vėžiu (*Xanthomonas campestris* pv. *citri* (Hasse) Dye));
- vaisiai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta citrinmedžių bakteriniu vėžiu (*Xanthomonas campestris* pv. *citri* (Hasse) Dye));
- pagal oficialius kontrolės ir tyrimų metodus citrinmedžių bakterinio vėžio (*Xanthomonas campestris* pv. *citri* (Hasse) Dye) požymių auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nenustatyta ir nė vienas vaisius, gautas auginimo vietoje nuėmus derlių, neturėjo citrinmedžių bakterinio vėžio (*Xanthomonas campestris* pv. *citri* (Hasse) Dye); požymių. Vaisiai buvo apdoroti ir supakuoti patalpose ar paskirstymo centruose, kurie užregistruoti šiam tikslui arba taikyta sertifikavimo sistema, pripažinta kaip atitinkanti nuostatas.

1.31. Vaisiai: citrinmedžių (*Citrus L.*), kinkanų (*Fortunella Swingle*), poncirų (*Poncirus Raf.*) ir jų hibridų, kilusių iš visų šalių, išskyrus Europos šalis

Oficialus patvirtinimas, kad arba:

- vaisiai kilę iš šalių, kur citrinmedžių cercosporiozė (*Phaeoramularia angolensis* (T. Carvalha & O. Mendes) P. M. Kirk.) nenustatyta;
- vaisiai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta citrinmedžių cercosporioze (*Phaeoramularia angolensis* (T. Carvalha & O. Mendes) P. M. Kirk.);
- citrinmedžių cercosporiozės (*Phaeoramularia angolensis* (T. Carvalha & O. Mendes) P. M. Kirk.) požymių produkcijos auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta ir vaisiai, nuėmus derlių produkcijos auginimo vietoje, pagal oficialių tyrimų rezultatus neturėjo požymių.

1.32. Vaisiai: citrinmedžių (*Citrus* L.), kinkanų (*Fortunella* Swingle), poncirų (*Poncirus* Raf.) ir jų hibridų, išskyrus (*Citrus aurantium* L.) vaisius, kilusius iš visų šalių, išskyrus Europos šalis

1.33. Vaisiai: citrinmedžių (*Citrus* L.), kinkanų (*Fortunella* Swingle), poncirų (*Poncirus* Raf.) ir jų hibridų, kilusių iš visų šalių, išskyrus Europos, kur paplitusios margasparnės musės (*Thephritidae*) (neeuropiniai) ant šių vaisių

1.34. Augalai: gudobelės (*Crataegus* L.), obelys (*Malus* Mill.), kriaušės (*Pyrus* L.), kilusios iš visų šalių

Oficialus patvirtinimas, kad arba:

- vaisiai kilę iš šalies, kuri pripažinta neužkrėsta juodąja dėmėtligė (*Guignardia citricarpa* Kiely);
- vaisiai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta juodąja dėmėtligė (*Guignardia citricarpa* Kiely);
- juodosios dėmėtligės (*Guignardia citricarpa* Kiely) požymių produkcijos auginimo vietoje ir artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta ir vaisiai, produkcijos auginimo teritorijoje nuėmus derlių, pagal atitinkamus oficialius tyrimus neturėjo jokių šios ligos požymių.

Oficialus patvirtinimas, kad arba:

- vaisiai kilę iš teritorijų, kuriose šie kenkėjai nepaplitę;
- paskutinį vegetacijos ciklą, vykdant oficialius patikrinimus mažiausiai kartą per mėnesį (likus trims mėnesiams iki derliaus nuėmimo) nurodytų kenksmingų organizmų buvimo požymių produkcijos auginimo vietoje ar artimiausioje aplinkoje nenustatyta ir joks vaisius auginimo vietoje neturėjo nurodytų organizmų pakenkimo požymių;
- vaisiai nebuvo pažeisti nurodytais organizmais visose kenkėjų vystymosi stadijose;
- vaisiai atitinkamai apdoroti karštais garais, šalčiu, greitai atšaldyti nepažeidžiant vaisiaus arba chemiškai apdoroti.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš kultūrų, paskutinį vegetacijos ciklą neužkrėstų obelių dėmėtligė (*Phyllosticta solitaria* Ell. et Evern.).

1.35. Augalai: cidonijos (*Cydonia* Mill.), žemuogės ir braškės (*Fragaria* L.), obelys (*Malus* Mill.), slyvos (*Prunus* L.), kriaušės (*Pyrus* L.), serbentai (*Ribes* L.), avietės (*Rubus* L.), skirtos sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur tam tikras organizmas kenkia šių genčių augalams: žemuogėms ir braškėms (*Fragaria* L.):

- braškių šaknų šerdies raudonligė (*Phytophthora fragariae* Hickman var. *fragariae*);
- vaistučio mozaikos virusas (*Arabis* mosaic virus);
- aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas (Raspberry ringspot virus);
- žemuogių raukšlėtligės virusas (Strawberry crinkle virus);
- žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas (Strawberry latent ringspot virus);
- žemuogių silpnojo pakraščių pageltimo virusas (Strawberry mild yellow edge virus);
- pomidorų juodojo žiediskumo virusas (Tomato black ring virus);
- braškių lapų kampuotoji dėmėtligė (*Xanthomonas fragariae* Kennedy & King); obelims (*Malus* Mill.):
- obelių dėmėtligė (*Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.);
- slyvoms (*Prunus* L.):
- abrikosų chlorotiško lapų susisukimo mikoplazma (Apricot chlorotic leafroll mycoplasma);
- slyvų lapų bakterinė dėmėtligė (*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Dye); paprastiesiems persikams (*Prunus persica* (L.) Batsch):
- persikų ūglių bakteriozė (*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al.); kriaušėms (*Pyrus* L.):
- obelių dėmėtligė (*Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.);
- avietėms (*Rubus* L.):
- vaistučio mozaikos virusas (*Arabis* mosaic virus);
- aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas (Raspberry

Oficialus patvirtinimas, kad paskutinį vegetacijos ciklą produkcijos auginimo vietoje kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų nepastebėta.

ringspot virus);
- žemuogių latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas
(Srawberry latent ringspot virus);
- pomidorų juodojo žiediškumo virusas (Tomato black ring virus); visų rūšių augalams:
- neeuropiniai virusai ir į virusus panašūs organizmai

1.36. Augalai: paprastosios cidonijos (*Cydonia oblonga* Mill.), beržalapės kriaušės (*Pyrus betulaefolia* Bge), paprastosios kriaušės (*Pyrus communis* L.), vėlyvosios kriaušės (*Pyrus pyrifolia* (Burm.)), usūrinės kriaušės (*Pyrus ussuriensis* Maxim.), įskaitant jų hibridus,

Augalai, kilę iš kultūrų, tikrintų paskutinius 3 auginimo sezonus: augalai su kriaušių nykimo mikoplazmos (Pear decline MLO) infekcijos požymiais buvo išrauti, o kiti augalai paskutinį vegetacijos ciklą neužkrėsti jokiais virusais ir į virusus panašiais organizmais.

1.37. Žemuogių ir braškių (*Fragaria* L.) daigai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur paplitę svarbūs

kenksmingi organizmai:

- žemuogių latentinis C virusas (Strawberry latent „C“ virus);
- žemuogių priegyslinės margligės virusas (Strawberry vein banding virus);
- žemuogių raganų šluotų mikoplazma (Strawberry witches' broom mycoplasma)

1.38. Žemuogių ir braškių (*Fragaria* L.) daigai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių

1.39. Žemuogių ir braškių (*Fragaria* L.) daigai, skirti sodinti, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad:

- augalai tiesiogiai kilę iš kultūros, kuri buvo auginama pagal tam tikras sąlygas ir kuri patikrinta mažiausiai vieną kartą per paskutinius tris vegetacijos ciklus, naudojant atitinkamus indikatorius ir ekvivalenčius metodus. Tyrimų metu nustatyta, kad kultūra neužkrėsta šiais kenksmingais organizmais;
- svarbių kenksmingų organizmų sukeltų ligų požymių ant augalų auginimo vietoje ar jų artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

- auginimo vietoje ryžinio nematodo (*Aphelenchoides besseyi* Christie) buvimo požymių ant augalų paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta; arba
- augalai kilę iš kultūrų, kurios buvo ištirtos ir nustatyta, kad jos neužsikrėtusios ryžiniu nematodu (*Aphelenchoides besseyi* Christie).

Oficialus patvirtinimas, kad augalai užauginti teritorijoje, kur japoninio žiedgraužio (*Anthonomus bisignifer* (Schenkling)) ir braškinio žiedgraužio (*Anthonomus signatus* (Say)) nepastebėta.

1.40. Augalai: obelys (*Malus* Mill.), skirtos sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur paplitę:
- obelių gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazma (Apple proliferation MLO);
- pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (Tomato ringspot nepovirus);
- vyšnių lapų šiurkštumo virusas (Cherry rasp leaf nepovirus) (amerikinis)

1.41. Augalai: slyvos (*Prunus* L.), skirtos sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur paplitęs slyvų raupligės virusas („Šarka“) (Plum pox potyvirus):
- paprastieji migdolai (*Prunus amygdalus* Batsch);
- abrikosai (*P. armeniaca* L.);
- (*P. blireiana* Andre);
- (*P. brigantina* Vill.);
- vyšninės slyvos (*P. cerasifera* Ehrh.);
- (*P. cistena* Hansen);
- (*P. curdica* Fenzl et Fritsch.);
- naminės europinės slyvos (*P. domestica* ssp. *Domestica* L.);
- ternoslyvos (*P. domestica* ssp. *insititia* (L.) C. K. Schneid.);
- renklodinės slyvos (*P. domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi.);
- (*P. glandulosa* Thunb.);
- (*P. holoseircea* Batal.);
- (*P. hortulana* Bailey);
- (*P. japonica* Thunb.);
- (*P. mandshurica* (Maxim.) Koehne);
- (*P. maritima* Marsh.);
- (*P. mume* Sieb. et Zucc.);
- juodosios slyvos (*P. nigra* Ait.);
- paprastieji persikai (*P. persica* (L.) Batsch);
- kininės slyvos (*P. salicina* L.);
- (*P. sibirica* L.);
- (*P. simonii* Carr.);
- dygiosios slyvos (*P. spinosa* L.);

Oficialus patvirtinimas, kad:
- augalai kilę iš motininės medžiagos iki antros generacijos, kuri testuota naudojant EPPO rekomenduotus metodus ir pagal juos nerasta obelių gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazmos (Apple proliferation MLO), pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso (Tomato ringspot nepovirus) ir vyšnių lapų šiurkštumo viruso (Cherry rasp leaf nepovirus), be to, augalai buvo auginami (laikomi) tokiomis sąlygomis, kad neužsikrėtų;
- kilę iš kultūrų, kurių artimiausia aplinka neužkrėsta obelių gausaus išsišakojimo (proliferacijos) mikoplazma (Apple proliferation MLO), kitais virusais ir į virusus panašiais organizmais paskutinį vegetacijos ciklą.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:
- kilę iš motininės medžiagos iki antros generacijos, kuri testuota naudojant EPPO rekomenduotus metodus ir pagal juos slyvų raupligės viruso („Šarka“) (Plum pox potyvirus) nerasta, be to, augalai buvo auginami (laikomi) tokiomis sąlygomis, kad neužsikrėtų;
- užauginti laukuose, kurie patys ir jų artimiausia aplinka neužkrėsti slyvų raupligės virusu („Šarka“) (Plum pox potyvirus) paskutinį visą vegetacijos ciklą, be to, neužkrėsti kitais virusais ir į virusus panašiais organizmais.

-
- (*P. tomentosa* Thunb.);
 - triskiaučiai migdolai (*P. triloba* Lindl.)
- ir kitos *Prunus* L. rūšys, jautrios slyvų raupligės virusui
(„Šarka“) (Plum pox potyvirus)
-

1.42. Augalai: slyvos (*Prunus L.*), skirtos sodinti:

- kilę iš šalių, kur paplitę slyvoms svarbūs kenksmingi organizmai:
- pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (Tomato ringspot virus);
- išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur paplitę svarbūs kenksmingi organizmai:
- vyšnių lapų šiurkštumo (Cherry rasp leaf virus (amerikinis));
- persikų mozaikos virusas (Peach mosaic virus (amerikinis));
- persikų netikroji riketija (Peach phony rickettsia);
- persikų skrotelių mikoplazma (Peach rosette mycoplasma);
- persikų geltos mikoplazma (Peach yellows mycoplasma);
- slyvų amerikinės juostligės virusas (Plum line pattern virus (amerikinis));
- persikų X-ligos mikoplazma (Peach X disease mycoplasma);
- išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos, kur paplitę svarbūs kenksmingi organizmai:
- vyšnių susmulkėjimo patogenas (Little cherry pathogen)

1.43. Augalai: slyvos (*Prunus L.*), kilę iš šalių, kur paplitęs slyvų šakų juodasis vėžys (*Apiosporina morbosa* (Schwein.) von Arx)

Oficialus patvirtinimas, kad augalai arba:

- sertifikuoti pagal schemą, kuri reikalauja, kad augalai būtų tiesiogiai kilę iš medžiagos, kuri buvo prižiūrima pagal tinkamas sąlygas ir oficialiai ištirta bent dėl svarbių kenksmingų organizmų, naudojant atitinkamus indikatorius ar ekvivalentčius metodus ir pagal tyrimų rezultatus užkrėtimas svarbiais kenksmingais organizmais nenustatytas;
- kilę tiesiogiai iš medžiagos, kuri buvo prižiūrima tinkamomis sąlygomis ir per paskutinius tris vegetacijos ciklus buvo ištirta bent vieną kartą dėl svarbių kenksmingų organizmų, naudojant tinkamus indikatorius ar ekvivalentčius metodus, ir pagal tyrimų rezultatus užkrėtimo šiais kenksmingais organizmais nenustatyta;
- ligos simptomų, sukeltų svarbių kenksmingų organizmų, ant augalų jų auginimo vietoje ar artimiausioje aplinkoje paskutinius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš kultūrų, kur slyvų šakų juodojo vėžio (*Apiosporina morbosa* (Schwein.) von Arx) paskutinius du vegetacijos ciklus nepastebėta.

1.44. Augalai: avietės (*Rubus* L.), skirtos sodinti:
- – kilusios iš šalių, kur paplitę avietėms kenksmingi organizmai;
- pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (Tomato ringspot nepovirus);
- vyšnių lapų susisukimo virusas (Cherry leaf roll nepovirus);
- aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas (Raspberry ringspot nepovirus);
- gervuogių latentinis virusas (Black raspberry latent virus);
- slyvų nekrotinės žiediškosios dėmėtligės virusas (Prunus necrotic ringspot virus);
- – išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur avietėms svarbūs kenksmingi organizmai paplitę:
- vyšnių lapų šiurkštumo virusas (Cherry rasp leaf virus (amerikinis))

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:
- kilę iš motininės medžiagos iki trečios generacijos, kuri testuota naudojant EPPO rekomenduotus metodus ir pagal testus pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso (Tomato ringspot nepovirus), vyšnių lapų susisukimo viruso (Cherry leaf roll nepovirus), aviečių žiediškosios dėmėtligės viruso (Raspberry ringspot nepovirus) nenustatyta ir medžiaga buvo laikyta nurodytomis sąlygomis, kad neužsikrėstų;
- užauginti laukuose, kurie patys ir jų artimiausia aplinka nebuvo užkrėsti žiediškosios dėmėtligės virusu (Tomato ringspot nepovirus), vyšnių lapų susisukimo virusu (Cherry leaf roll nepovirus), aviečių žiediškosios dėmėtligės virusu (Raspberry ringspot nepovirus) ir paskutinį vegetacijos ciklą nebuvo užkrėsti kitais virusais ir į virusus panašiais organizmais.

1.45. Augalai: avietės ir gervuogės (*Rubus* L.), skirtos sodinti, kilusios iš šalių, kur paplitusi aviečių fitoftorozė (*Phytophthora fragariae* Hickman var. *rubi* Wilcox et Duncan)

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš kultūrų, kurios paskutinį vegetacijos ciklą nebuvo užkrėstos aviečių fitoftorozė (*Phytophthora fragariae* Hickman var. *rubi* Wilcox et Duncan).

1.46. Valgomųjų bulvių (*Solanum tuberosum* L.) stiebagumbiai, skirti maistui

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai užauginti teritorijoje, kur nepaplitę:
- bulvių žiedinis puvinys (*Clavibacter michiganensis* subsp. *Sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.);
- bulvių rudasis puvinys (*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.);
- bulvių gangrena (*Phoma exiguua* var. *foveata* (Foister) Boer.);
- stiebinis bulvinis nematodas (*Ditylenchus destructor* Thorne);
- kolumbinis galinis nematodas (*Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (visos populiacijos));
- klatingasis galinis nematodas (*Meloidogyne fallax* Karssen). Taip pat kad stiebagumbių žemėtumas neviršija 1 procento bendros masės.

1.47. Valgomųjų bulvių (*Solanum tuberosum* L.) stiebagumbiai, skirti sodinti

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai užauginti teritorijoje, kur nepaplitę:

- bulvių vėžys (*Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival);
- bulvių žiedinis puvinys (*Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Davis *et al.*);
- bulvių gangrena (*Phoma exigua* var. *foveata* (Foister) Boer.);
- auksinis bulvinis nematodas (*Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens);
- blyškasis bulvinis nematodas (*Globodera pallida* (Stone) Behrens);
- bulvių rudasis puvinys (*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*);
- kolumbinis galinis nematodas (*Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (visos populiacijos));
- klastingasis galinis nematodas (*Meloidogyne fallax* Karssen);
- stiebinis bulvinis nematodas (*Ditylenchus destructor* Thorne);
- bulvių stolburo mikoplazma (Potato stolbur mycoplasma);
- bulvių gumbų verpstiškumo viroidas (Potato spindle tuber viroid).

Taip pat kad stiebagumbių žemėtumas neviršija 1 procento bendros masės.

Oficialus patvirtinimas, kad bulvių stolburo mikoplazma (Potato stolbur mycoplasma) jų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

Oficialus patvirtinimas, kad bulvių gumbų verpstiškumo viroido (Potato spindle tuber viroid) požymių ant augalų jų auginimo vietoje paskutinį visą vegetacijos ciklą nepastebėta.

1.48. Kiauliauoginių (*Solanaceae*) šeimos augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kurie kilę iš šalių, kur paplitusi bulvių stolburo mikoplazma (Potato stolbur mycoplasma)

1.49. Kiauliauoginių (*Solanaceae*) šeimos augalai, skirti sodinti, išskyrus valgomųjų bulvių (*Solanum tuberosum* L.) stiebagumbius ir išskyrus valgomųjų pomidorų (*Lycopersicon esculentum* Mill.) sėklas, kilę iš

šalių, kur paplitęs bulvių gumbų verpstiškumo viroidas (Potato spindle tuber viroid)

1.50. Augalai: vienametės paprikos (*Capsicum annuum* L.), valgomieji pomidorai (*Lycopersicon esculentum* Mill.), bananai (*Musa* L.), tabakas (*Nicotiana* L.) ir baklažanai (*Solanum melongena* L.),

skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur bulvių rudasis puvinys (*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*) paplitęs

Oficialus patvirtinimas, kad arba:

- augalai užauginti areale, kur bulvių rudojo puvinio (*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*) nerasta;
- bulvių rudojo puvinio (*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*) požymių ant augalų jų augimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.

1.51. Augalai: paprastieji apyniai (<i>Humulus lupulus</i> L.), skirti sodinti, išskyrus sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad apynių verticiliozių (<i>Verticilium albo- atrum</i> Reinke et Bertholde, <i>Verticilium dahliae</i> Klebahn) požymių ant apynių jų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.52. Augalai su šaknimis, pasodinti ar skirti sodinti, kilę iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad augalai užauginti dirvožemyje, kuris neužkrėstas: - bulvių žiediniu puvinio (<i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Davis <i>et al.</i>); - bulvių ruduoju puvinio (<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>); - bulvių vėžiu (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.); - blyškiuoju bulviniu nematodu (<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens); - auksiniu bulviniu nematodu (<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens). Taip pat kad augalų šaknys be dirvožemio likučių.
1.53. Gumbasvogūniai, svogūnai, šaknys ir šaknelės, žinomi kaip stiebinio nematodo (<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev) augalai šeimininkai (II priedo 2 dalies 3 punktas), kilę iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad: - kilę iš kultūrų, kuriose tikrinimo metu stiebinio nematodo (<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev) buvimo požymių paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta; - švarūs, be substrato.
1.54. Augalai: valgomieji salierai (<i>Apium graveolens</i> L.), <i>Argyranthemum</i> spp., astrai (<i>Aster</i> spp.), kopūstai (<i>Brassica</i> spp.), vienametės paprikos (<i>Capsicum annuum</i> L.), agurkai (<i>Cucumis</i> spp.), chrizantemos (<i>Chrysanthemum (sensu lato)</i>), gvazdikai (<i>Dianthus</i> L.) ir jų hibridai, <i>Exacum</i> spp., gerberos (<i>Gerbera</i> Cass.), gubojos (<i>Gypsophila</i> L.), salotos (<i>Lactuca</i> spp.), baltagalvės (<i>Leucanthemum</i> L.), lubinai (<i>Lupinus</i> L.), valgomieji pomidorai (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.), baklažanai (<i>Solanum melongena</i> L.), skaisteniai (<i>Tanacetum</i> L.) ir verbenos (<i>Verbena</i> L.), skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kuriose šių svarbių kenksmingų organizmų nerasta: - chrizanteminės minamusės (<i>Amauromyza maculosa</i>)	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - per tris mėnesius iki eksporto, tikrinant mažiausiai 30 dienų, augalų auginimo vietoje kenksmingų organizmų buvimo požymių nepastebėta; - iki eksporto augalai buvo patikrinti ir kenksmingų organizmų ar jų požymių nerasta, augalai tinkamai apdoroti.

(Malloch));
- bulvinės minamosės (*Liriomyza bryoniae*
(Kaltenbach));
- amerikinės minamosės (*Liriomyza huidobrensis*
(Blanchard));
- daržovinės minamosės (*Liriomyza sativae*
Blanchard);
- šilumamėgės minamosės (*Liriomyza trifolii*
(Burgess))

1.55. Augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti iš kultūrų, kuriose per tris mėnesius iki eksporto, tikrinant mažiausiai 30 dienų, nerasta šių kenksmingų organizmų:

- chrizanteminės minamosės (*Amauromyza maculosa* (Malloch));
- amerikinės minamosės (*Liriomyza huidobrensis* (Blanchard));
- daržovinės minamosės (*Liriomyza sativae* (Blanchard));
- šilumamėgės minamosės (*Liriomyza trifolii* (Burgess));
- tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.);
- vakarinio tripso (*Frankliniella occidentalis* Pergande);
- palminio tripso (*Thrips palmi* Karny).

1.56. Visi augalai, skirti sodinti, kilę iš šalių, kur paplitę dykrinukai (*Spodoptera* spp.), gelsvapilkis saulinukas (*Helicoverpa armigera* (Hubner)) ir kukurūzinis saulinukas (*Helicoverpa zea* (Boddie))

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš kultūrų, kuriose dykrinukų (*Spodoptera* spp.), gelsvapilkių saulinukų (*Helicoverpa armigera* (Hubner)) ir kukurūzinių saulinukų (*Helicoverpa zea* (Boddie)) tris mėnesius iki išvežimo nerasta.

1.57. Augalai: chrizantemos (*Chrysanthemum* (sensu lato)), gvazdikai (*Dianthus* L.), pelargonijos (*Pelargonium* L'Herit ex Ait.), erškėčiai (*Rosa* L.), išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių

Oficialus patvirtinimas, kad arba:
- šalyje nepaplitęs pietinis lapsukis (*Cacoecimorpha pronubana* Hubner);
- augalai kilę iš kultūrų, kuriose pietinio lapsukio (*Cacoecimorpha pronubana* Hubner) paskutinį visą vegetacijos ciklą nerasta;
- augalai buvo apdoroti nuo pietinio lapsukio (*Cacoecimorpha pronubana* Hubner).

1.58. Augalai: chrizantemos (*Chrysanthemum* (sensu lato)), gvazdikai (*Dianthus* L.) ir pelargonijos (*Pelargonium* L'Herit ex Ait.), skirti sodinti, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad arba:
- gelsvapilkio sauliuuko (*Heliothis armigera* Hubner) ir afrikinio dykrinuko (*Spodoptera littoralis* (Boisduval)) buvimo požymių augimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta;
- augalai tinkamai apdoroti nuo šių kenksmingų organizmų.

1.59. Augalai: chrizantemos (*Chrysanthemum* (sensu lato)), gvazdikai (*Dianthus* L.) ir pelargonijos (*Pelargonium* L'Herit ex Ait.), išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad arba:
- pietinio dykrinuko (*Spodoptera eridania* Cramer), kukurūzinio dykrinuko (*Spodoptera frugiperda* Smith) ir azijinio dykrinuko (*Spodoptera litura* Fabricius) buvimo požymių auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta;
- augalai tinkamai apdoroti nuo minėtų organizmų.

1.60. Augalai: chrizantemos (*Chrysanthemum* (sensu lato)), kilusios iš visų šalių, išskyrus sėklas

Oficialus patvirtinimas, kad:
- augalai kilę iš motininės medžiagos iki trečios generacijos, kuri tyrimais patvirtinta neužkrėsta chrizantemų žemaūgės viroidu (*Chrysanthemum stunt viroid*). Augalai kilę iš medžiagos, kuri žydėjimo metu oficialiai patikrinta ir chrizantemų žemaūgės viroido (*Chrysanthemum stunt viroid*) nerasta;
- augalai ar neįsaknydinti daigai kilę iš baltosiomis rūdimis (*Puccinia horiana* Hennings) neužkrėstų kultūrų, kurios tikrintos bent mėnesį per tris mėnesius iki eksporto, arba buvo apdoroti prieš baltąsias rūdis (*Puccinia horiana* Hennings);
- neįsaknydinti daigai kilę iš motininių augalų, kurie paskutinį vegetacijos ciklą nebuvo užkrėsti chrizantemų askochitoze (*Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davies) von Arx). Įsaknydinti daigai išauginti substrate, kuris paskutinį vegetacijos ciklą nebuvo užkrėstas chrizantemų askochitoze (*Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davies) von Arx).

1.61. Augalai: gvazdikai (<i>Dianthus</i> L.), skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš motininio augalų, kurie pagal atliktus testus per 2 ištikus vegetacijos ciklus nebuvo užkrėsti gvazdikų žydraja džiūсна (<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma), gvazdikų indų bakterioze (<i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder <i>et al.</i>) ir gvazdikų bakteriniu vytuliu (<i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi <i>et al.</i>).
1.62. Augalai: pelargonijos (<i>Pelargonium</i> L'Herit ex Ait.), skirtos sodinti, kilusios iš šalių, kur paplitęs pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas (Tomato ringspot nepovirus)	Oficialus patvirtinimas, kad: - augalai kilę iš motininės medžiagos iki ketvirtos generacijos, kuri testuota EPPO rekomenduotais metodais ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso (Tomato ringspot nepovirus) nerasta; - augalai išauginti substrate, neužkrėstame durkliniais nematodais (<i>Xiphinema</i> spp.); - augalai išauginti vietose, kuriose paskutinį visą vegetacijos ciklą žiediškosios dėmėtligės viruso (Tomato ringspot nepovirus) nerasta.
1.63. Augalai: paprastieji runkeliai (<i>Beta vulgaris</i> L.), kilę iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad: - augalai užauginti regionuose, kur runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furoviruso (Beet necrotic yellow vein furovirus) ir runkelių lapų garbanės viruso (Beet leaf curl virus) nerasta; - laukas, kuriame augo augalai, neužkrėstas runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furovirusu (Beet necrotic yellow vein furovirus) ir runkelių lapų garbanės virusu (Beet leaf curl virus) paskutinį vegetacijos ciklą; - šaknų žemėtumas neviršija 1% bendros masės.
1.64. Augalai: fikusai (<i>Ficus</i> L.), skirti sodinti, išskyrus sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - per tris mėnesius iki eksporto, tikrinant mažiausiai 30 dienų, augalų auginimo vietoje palminio tripso (<i>Thrips palmi</i> Karny) nerasta; - siunta tinkamai apdorota nuo tripsų (<i>Thysanoptera</i>); - augalai auginti šiltnamiuose, kuriuose kontroliuotas palminis tripsas (<i>Thrips palmi</i> Karny) ir tuo laikotarpiu jo nerasta.
1.65. Augalai, išskyrus fikusus (<i>Ficus</i> L.), skirti sodinti, išskyrus sėklas	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - augalai kilę iš šalių, kur palminio tripso (<i>Thrips palmi</i> Karny) nerasta; - siunta tinkamai apdorota nuo tripsų (<i>Thysanoptera</i>).

1.66. Augalai: arekinių (<i>Arecaceae</i>) šeimos, skirti sodinti, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos šalis	Oficialus patvirtinimas, kad: a) palmių žudančiosios geltligės mikoplazmos (Palm lethal yellowing mycoplasma) ir Cadang – Cadang viroido (Cadang-cadang viroid) nėra ir jų požymių auginimo vietoje bei artimiausioje aplinkoje paskutinį vegetacijos ciklą nerasta; arba b) palmių žudančiosios geltligės mikoplazmos (Palm lethal yellowing mycoplasma) ir Cadang – Cadang viroido (Cadang-cadang viroid) požymių ant augalų paskutinį vegetacijos ciklą nerasta ir auginimo vietoje įtartini augalai pašalinti ar tinkamai apdoroti nuo palminės cikados (<i>Myndus crudus</i> Van Duzee); - audinių kultūrų atveju augalai išauginti iš augalų, kurie atitinka reikalavimus, išdėstytus (a) ar (b) dalyse.
1.67. Augalai: kamelijos (<i>Camellia</i> L.), skirtos sodinti, išskyrus sėklas, kilusios iš visų šalių, išskyrus Europos šalis	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - augalai užauginti teritorijoje, kurioje kamelijų žiedų degligės (<i>Ciborinia camelliae</i> Kohn.) nerasta; - kamelijų žiedų degligės (<i>Ciborinia camelliae</i> Kohn.) požymių ant žydinčių augalų jų auginimo vietoje paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.68. Augalai: fuksijos (<i>Fuchsia</i> L.), skirtos sodinti, kilusios iš Brazilijos ir JAV	Oficialus patvirtinimas, kad fuksijinės gumbaerkės (<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer) buvimo požymių auginimo vietoje nerasta.
1.69. Medžiai ir krūmai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir augalų audinių kultūros, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio pajūrio šalis	Oficialus patvirtinimas, kad augalai: - švarūs, be augalų liekanų, žiedų ir vaisių; - auginti medelynuose; - iki eksporto tinkamu metu patikrinti ir kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų, kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ar grybų požymių nepastebėta arba taikytas tinkamas apdorojimas siekiant išnaikinti šiuos organizmus.

1.70. Lapus metantys medžiai ir krūmai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, ir augalų audinių kultūros, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio pajūrio šalis

1.71. Vienmečiai ir dvimečiai augalai, išskyrus varpinių (*Gramineae*) šeimos, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio pajūrio šalis

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra ramybės būsenos, be lapų.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

- auginti medelynuose;
- švarūs, be augalų liekanų, žiedų ir vaisių;
- iki eksporto tinkamu metu patikrinti ir kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų, kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ar grybų požymių nepastebėta arba taikytas tinkamas apdorojimas siekiant išnaikinti šiuos organizmus.

1.72. Daugiamečių dekoratyvinių žolių varpinių (*Gramineae*) šeimos augalai šių pošeimių: *Bambusoideae*, *Panicoideae* ir *Buchloe*, *Bouteloua* Lag., lendrūnai (*Calamagrostis*), kortaderijos (*Cortaderia* Stapf.), monažolės (*Glyceria* R. Br.), *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix*, melvenės (*Molinia*), strypainiai (*Phalaris* L.), *Shibataea*, spartinos (*Spartina* Schreb.), aštuotės (*Stipa* L.) ir *Uniola* L. genčių augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kurios yra kilusios iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio pajūrio šalis

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

- auginti medelynuose;
- švarūs, be augalų liekanų, žiedų ir vaisių;
- iki eksporto tinkamu metu patikrinti ir kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų, kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ar grybų požymių nepastebėta arba taikytas tinkamas apdorojimas siekiant išnaikinti šiuos organizmus.

1.73. Natūraliai ar dirbtinai išauginti žemaūgiai augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš visų šalių, išskyrus Europos šalis

Oficialus patvirtinimas, kad:

- augalai, įskaitant tuos, kurie buvo tiesiogiai atrinkti iš natūraliai augančių augalų, privalo būti išauginti ir laikyti oficialiai registruotuose augnuose, kuriems mažiausiai dvejus metus iki eksporto buvo nuolat taikytas oficialus priežiūros kontrolės režimas,
- augalai augnuose:
 - (a) bent jau minėto periodo metu buvo:
 - pasodinti į vazonus, kurie padėti į lentynas, ne žemiau kaip 50 cm nuo žemės;
 - atitinkamai apdoroti, siekiant apsaugoti nuo neeuropinių rūdžių (aktyvioji medžiaga, koncentracija ir duomenys apie apdorojimą turi būti nurodyti fitosanitarinio sertifikato antraštėje „dezinfekcija“);
 - oficialiai patikrinti mažiausiai 6 kartus per metus atitinkamais intervalais dėl kenksmingų organizmų. Taip pat patikrintos artimiausios aplinkos augalai lauke ar augyne dėl kenkėjų ir ligų;
 - pagal tikrinimo rezultatus užkrėsti augalai pašalinti, o likusieji augalai efektyviai apdoroti, laikyti reikiamą periodą ir tikrinti, ar neužsikrėtę kenksmingais organizmais;
 - augalai buvo pasodinti į nenaudotą dirbtinę augimo terpę arba į natūralią augimo terpę, kuri buvo fumiguota ar termiškai apdorota ir ją ištyrus nenustatyta užsikrėtimo;
 - augimo terpė buvo prižiūrima taip, kad į ją nepatektų kenksmingi organizmai. Likus dviem savaitėms iki išsiuntimo augalams buvo:
 - – nupurtytos ir švariu vandeniu nuplautos šaknys (laikomos plikos) arba augimo terpė buvo prižiūrima taip, kad neužsikrėstų kenksmingais organizmais ir kad atitiktų nustatytas sąlygas; arba
 - – buvo taikytas atitinkamas apdorojimas, užtikrinant, kad augimo terpė nebūtų užkrėsta kenksmingais organizmais.
 - Apdorojimo duomenys nurodyti fitosanitarinio sertifikato antraštėje „dezinfekcija“ (veiklioji medžiaga, koncentracija, apdorojimo laikas);
 - (b) augalai supakuoti į uždarus konteinerius, kurie oficialiai užantspauduoti ir turi registruoto augyno registracijos numerį. Šis numeris taip pat nurodomas fitosanitarinio sertifikato antraštėje „papildoma deklaracija“, pagal kurią siuntas galima identifikuoti.

1.74. Gvazdikinių (*Caryophyllaceae*) šeimos daugiamečiai žoliniai augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas (išskyrus gvazdikus (*Dianthus* L.)), graižaziedžių (*Compositae*) (išskyrus chrizantemas (*Chrysanthemum* (sensu lato))), kryžmažiedžių (*Cruciferae*), ankštinių (*Leguminosae*) ir erškėtinių (*Rosaceae*) (išskyrus braškes, žemuoges (*Fragaria* L.)) šeimų augalai, kilę

iš visų šalių, išskyrus Europos ir Viduržemio pajūrio šalis

1.75. Augalai: puošniausiosios krapažolės (*Euphorbia pulcherrima* Willd.), skirtos sodinti, išskyrus sėklas, kilusios iš šalių, kur paplitęs tabakinis baltasparnis (*Bemisia tabaci* Genn.)

1.76. Augalai: valgomieji pomidorai (*Lycopersicon esculentum* Mill.), skirti sodinti, išskyrus sėklas, kilę iš šalių, kur paplitęs pomidorų geltonosios garbanės virusas (Tomato yellow leaf curl virus):
- kur tabakinis baltasparnis (*Bemisia tabaci* Genn.) nepaplitęs;
- kur tabakinis baltasparnis (*Bemisia tabaci* Genn.) paplitęs

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

- auginti medelynuose;
- švarūs, be augalų liekanų, žiedų ir vaisių;
- iki eksporto tinkamu metu patikrinti ir kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų, kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ar grybų požymių nepastebėta arba taikytas tinkamas apdorojimas siekiant išnaikinti šiuos organizmus.

Oficialus patvirtinimas, kad arba:

- augalai užauginti areale, kur tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.) nerasta;
- tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.) buvimo požymių ant augalų jų augimo vietoje tris mėnesius iki eksporto tikrinant mažiausiai mėnesį nepastebėta.

Oficialus patvirtinimas, kad pomidorų geltonosios garbanės viruso (Tomato yellow leaf curl virus) požymių ant augalų nepastebėta.

Oficialus patvirtinimas, kad arba:

- pomidorų geltonosios garbanės viruso (Tomato yellow leaf curl virus) požymių nepastebėta, ir augalai užauginti areale, kur tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.) nerasta, ar oficialiai tikrinant auginimo vietą, tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.) buvimo požymių nepastebėta ant augalų jų auginimo vietoje, tris mėnesius iki eksporto tikrinant mažiausiai mėnesį;
- pomidorų geltonosios garbanės viruso (Tomato yellow leaf curl virus) požymių auginimo vietoje nepastebėta ir auginimo vieta buvo tinkamai apdorota dėl tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.).

1.77. Augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas, svogūnus, stiebagumbius, gumbasvogūnius, šakniastiebius, kilę iš šalių, kur svarbūs kenksmingi organizmai yra paplitę:

- pupelių auksinės mozaikos virusas (Bean golden mosaic virus);
- vagnos silpnosios margligės virusas (Cowpea mild mottle virus);
- salotų infekcinės geltligės virusas (Lettuce infectious yellows virus);
- paprikos silpnosios margligės virusas (Pepper mild tigré virus);
- moliūgų lapų garbanės virusas (Squash leaf curl virus);
- kiti virusai, kuriuos perneša tabakinis baltasparnis (*Bemisia tabaci* Genn.);
- kur tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.) ar kitų svarbių ligos pernešėjų nerasta;
- kur tabakinis baltasparnis (*Bemisia tabaci* Genn.) ar kiti svarbūs ligos pernešėjai paplitę

Oficialus patvirtinimas, kad jokių svarbių kenksmingų organizmų ant augalų paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta; Oficialus patvirtinimas, kad svarbių kenksmingų organizmų požymių ant augalų per tam tikrą periodą nepastebėta, ir

- augalai užauginti areale, kur tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.) ir kitų ligas pernešančių svarbių kenksmingų organizmų nerasta;
- arba
- auginimo vieta neužkrėsta tabakiniu baltasparniu (*Bemisia tabaci* Genn.) ir kitais ligas pernešančiais svarbiais kenksmingais organizmais;
- arba
- augalai tinkamai apdoroti nuo tabakinio baltasparnio (*Bemisia tabaci* Genn.).

1.78. Sėklos, kilusios iš visų šalių

Oficialus patvirtinimas, kad sėklos neužkrėstos piktžolių sėklomis, išvardytomis I priedo 3 dalyje.

1.79. Paprastųjų kukurūzų (*Zea mays* L.) sėklos, kilusios iš šalių, kur paplitęs kukurūzų bakterinis vytulys (*Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Margaert *et al.*)

Oficialus patvirtinimas, kad arba:

- sėklinė medžiaga kilusi iš sėklinės kultūros, kuri vegetacijos metu tirta ir kukurūzų bakterinio vytulio (*Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Margaert *et al.*) nerasta;
- sėklų pavyzdžiai ištirti pagal EPPO rekomenduojamas metodikas ir kukurūzų bakterinio vytulio (*Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Margaert *et al.*) nerasta.

1.80. Paprastųjų runkelių (*Beta vulgaris* L.) sėklos, kilusios iš visų šalių

Oficialus patvirtinimas, kad sėklinė medžiaga kilusi iš regionų, kur runkelių gyslų nekrotinio pageltimo furoviruso (Beet necrotic yellow vein furovirus) nerasta.

1.81. Sėjamųjų ryžių (<i>Oryza sativa</i> L.) sėklos	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - sėklos buvo oficialiai ištirtos nematologiniais tyrimais ir ryžinio nematodo (<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie) nerasta; - sėklos termiškai ar kitu būdu apdorotos prieš ryžinį nematodą (<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie).
1.82. Tikrųjų saulėgrąžų (<i>Helianthus annuus</i> L.) sėklos	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - sėklos užaugintos teritorijoje, kur saulėgrąžų netikrosios miltligės (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni) nepastebėta; - sėkloms, išskyrus tas, kurios išaugintos iš atsparių saulėgrąžų veislių visoms saulėgrąžų netikrosios miltligės (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni) rasėms, kurių auginimo vietoje saulėgrąžų netikroji miltligė (<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni) yra paplitusi ir buvo taikytas atitinkamas apdorojimas.
1.83. Pupelių (<i>Phaseolus</i> L.) sėklos	Oficialus patvirtinimas, kad: - sėklos užaugintos areale, kur pupelių bakterinės degligės (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al.) nerasta; arba - sėklų pavyzdys ištirtas ir pupelių bakterinės degligės (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al.) nerasta; ir - sėklinė medžiaga užauginta regionuose, kur pupelių bakterinio vytulio (<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones) nerasta.
1.84. Miežių (<i>Hordeum</i> L.), kviečių (<i>Triticum</i> L.), rugių (<i>Secale</i> L.), x kvietrugių (x <i>Triticosecale</i>) grūdai, kilę iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad sėklinė medžiaga užauginta iš sėklinių kultūrų, kurios vegetacijos metu ištirtos ir nykštukinių kūlių (<i>Tilletia controversa</i> Kuhn.) ir indijinių kūlių (<i>Tilletia indica</i> Mitra) nerasta.
1.85. Miežių (<i>Hordeum</i> L.), kviečių (<i>Triticum</i> L.), rugių (<i>Secale</i> L.), x kvietrugių (x <i>Triticosecale</i>) grūdai, kilę iš visų šalių	Grūduose nėra gyvų kenkėjų.

1.86. Daržinių pupelių (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.), gauruotųjų sojų (<i>Glycine max</i> (L.) Merr.), sėjamųjų žirnių (<i>Pisum sativum</i> L.) ir pupų (<i>Vicia faba</i> L.) sėklos, kilusios iš šalių, kur paplitęs pupelių bakterinis vytulys (<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones)	Oficialus patvirtinimas, kad arba: - sėklinė medžiaga užauginta regionuose, kur pupelių bakterinio vytulio (<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones) nerasta; - sėklinė medžiaga užauginta iš sėklinių kultūrų, kurios vegetacijos metu tirtos ir pupelių bakterinio vytulio (<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones) nerasta.
1.87. Mėlynžiedžių liucernų (<i>Medicago sativa</i> L.) sėklos, kilusios iš visų šalių	Oficialus patvirtinimas, kad sėklinė medžiaga užauginta iš sėklinių kultūrų, kuriose stiebinio nematodo (<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev) buvimo požymių paskutinį vegetacijos ciklą nepastebėta.
1.88. Mėlynžiedžių liucernų (<i>Medicago sativa</i> L.) sėklos, kilusios iš šalių, kur liucernos bakterinis vytulys (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davies et al.) paplitęs	Oficialus patvirtinimas, kad sėklinė medžiaga kilusi iš: - produkcijos auginimo vietų, kurios pačios ir jų artimiausia aplinka nebuvo užkrėstos liucernos bakteriniu vytuliu (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davies et al.) per paskutinius 10 metų; - kultūrų, kurios priklauso atsparioms liucernos bakteriniam vytuliui (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davies et al.) veislėms; - sėklinių kultūrų, kurios pačios ir jų artimiausia aplinka nebuvo užkrėstos liucernos bakteriniu vytuliu (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davies et al.) per paskutinį augimo sezoną; - kultūrų, kurios buvo auginamos plote, kur trejus metus iki sėjos nebuvo auginamos mėlynžiedės liucernos (<i>Medicago sativa</i> L.).

1.89. Valgomųjų pomidorų (*Lycopersicon
esculentum*
Mill.) sėklos, kilusios iš visų šalių

Oficialus patvirtinimas, kad sėklinė
medžiaga kilusi iš:
- augalų, neužkrėtų pomidorų bakteriniu
vėžiu (*Clavibacter michiganensis* subsp.
michiganensis (Smith) Davis *et al.*) ir bulvių
gumbų verpstiškumo viroidu (Potato spindle
tuber viroid) paskutinį vegetacijos ciklą;
- sėklų, kurios oficialiai testuotos tinkamais
metodais ir nebuvo užkrėstos pomidorų
bakteriniu vėžiu (*Clavibacter michiganensis*
subsp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*) ir
bulvių gumbų verpstiškumo viroidu (Potato
spindle tuber viroidu).

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2000 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 315
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2003 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3 D-86
redakcija)
5 priedas

**AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR KITŲ OBJEKTŲ, KURIŲ FITOSANITARINĖ
KONTROLĖ BŪTINA GAMYBOS VIETOJE IR ĮVEŽANT Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ,
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	KPN kodas ¹	Prekės pavadinimas
1.	06.01	Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje, trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 12.12 pozicijoje.
2.	ex 06.02	Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai, išskyrus grybieną, klasifikuojamą KPN 0602.90.10.0 subpozicijoje.
3.	06.03	Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos.
4.	06.04	Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanės ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos.
5.	07.01	Bulvės, šviežios arba šaldytos.
6.	0702.00.0 0	Pomidorai, švieži arba šaldyti.
7.	07.03	Svogūnai, askaloniniai česnakai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba šaldytos.
8.	07.04	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, kalieropės, savojos (garbanotieji) kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (<i>brassica</i>) daržovės, šviežios arba šaldytos.
9.	07.05	Salotos (<i>Lactuca sativa</i>) ir trūkažolės (cikorijos) (<i>Cichorium spp.</i>), šviežios arba šaldytos.
10.	07.06	Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba šaldyti.
11.	0707.00	Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba šaldyti.
12.	07.08	Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba šaldytos.
13.	07.09	Kitos daržovės, šviežios arba šaldytos.
14.	07.13	Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelų, skaldytos arba neskaldytos.
15.	08.01	Kokosai, braziliniai riešutai (bertoletijos) ir anakardžio (<i>cashew</i>) riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti.
16.	08.02	Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti.

¹ Šiame sąraše prekių kodai nurodyti pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2003 metų versiją.

17. 0803.00 Bananai, įskaitant tikruosius bananus (*plantains*), švieži arba džiovinti.
18. 08.04 Datulės, figos, ananasai, avokados, gvajavos, mangai ir garcinijos, švieži arba džiovinti.
19. 08.05 Citrusų vaisiai, švieži arba džiovinti.
20. 08.06 Vynuogės, šviežios arba džiovintos.
21. 08.07 Melionai (įskaitant arbūzus) ir melionmedžio vaisiai (*papayas*), švieži.
22. 08.08 Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži.
23. 08.09 Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus (*nectarines*)), slyvos ir dygiosios slyvos vaisiai, švieži.
24. 08.10 Kiti vaisiai, švieži.
25. 09.09 Anyžinės ožiažolės, žvaigždanyžių (badijonų), pankolio, kalendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklos; kadagių uogos.
26. 10.01 Kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys).
27. 1002.00.0 Rugsiai.
28. 1003.00 Miežiai.
29. 1004.00.0 Avižos.
30. 10.05 Kukurūzai.
31. 10.06 Ryžiai.
32. 1007.00 Grūdinis sorgas.
33. 10.08 Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas (strypainio sėklos); kiti javai.
34. 1201.00 Sojos pupelės, skaldytos arba neskaldytos.
35. 1204.00 Linų sėmenys, skaldyti arba neskaldyti.
36. 12.05 Rapsų arba rapsukų sėklos, skaldytos arba neskaldytos.
37. 1206.00 Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos.
38. 12.07 Kitos aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, skaldyti arba neskaldyti.
39. 12.09 Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti.
40. 1212.20.0 Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai.
41. 1212.91.8 Kiti.
42. 1213.00.0 Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti, kapoti arba nekapoti, susmulkinti arba nesusmulkinti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti.
43. 1214.90.1 Pašariniai runkeliai, šakniavaisiniai griežčiai ir kiti pašariniai šakniavaisiai.
44. 14.01 Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (*rattans*), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos).
45. 44.01 Kurui skirta mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą; medienos skiedros arba drožlės; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą.
46. 44.03 Žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjuvį arba neaptašyta.
47. 44.04 Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medienos kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės lazdos, grubiai aptašytos, bet nutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos, tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba panašiams dirbiniams gaminti; plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena.
48. 44.06 Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai.

49.	44.07	Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifluota arba nešlifluota, sujungta arba nesujungta galais.
50.	44.15	Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara, mediniai kabelių būgnai, padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai, mediniai padėklų apvadaai.
51.	ex5201.00 .90.0	Nekaršta ir nešukuota medvilnė, išskyrus higroskopintą arba balintą.
52.	ex52.02	Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą).
53.	53.01	Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti, linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą).

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-86](#), 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 29-1201 (2003-03-26), i. k. 1032330ISAK0003D-86

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [91](#), 2002-03-19, Žin., 2002, Nr. 31-1164 (2002-03-27), i. k. 1022330ISAK00000091

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 315 "Dėl karantininių organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo ir 1998 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 321 pripažinimo netekusiu galios" 1 priedo dalinio pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-86](#), 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 29-1201 (2003-03-26), i. k. 1032330ISAK0003D-86

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 315 "Dėl karantininių organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo ir 1998 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 321 pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo