

*Suvestinė redakcija nuo 2006-07-15 iki 2009-01-27*

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [90-3880](#), i. k. 1022250ISAK00000422*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

**Į S A K Y M A S**

**DĖL LIGŲ DIAGNOSTIKOS BEI AMBULATORINIO GYDYMO, KOMPENSUOJAMO  
IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, METODIKŲ  
PATVIRTINIMO**

2002 m. rugpjūčio 14 d. nr. 422  
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. Gruodžio 22 d. Nutarimą nr. 1595 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. Sausio 24 d. Nutarimo nr. 84 „dėl ambulatoriniam gydymui skirtų vaistų, kompensuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (žin., 2001, nr. [108-3957](#)):

1. T v i r t i n u pridedamas ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, metodikas:

- 1.1. Cukrinio diabeto (tlk-10 kodai e10-e14).
- 1.2. Dializuojamų pacientų ir ligonių po inkstų persodinimo (tlk-10 kodai z49, z94.0).
- 1.3. Epilepsijos (tlk-10 kodas g40).
- 1.4. Glaukomos (tlk-10 kodai h40-h42, q15.0).
- 1.5. Hipertenzinės ligos ir hipertenzinės nefropatijos (tlk-10 kodai i10-i13, i15).
- 1.6. Krūties piktybinių navikų (tlk-10 kodas c50).
- 1.7. Plaučių piktybinių navikų (tlk-10 kodas c34).
- 1.8. Prostatos piktybinių navikų (tlk-10 kodas c61).
- 1.9. Širdies veiklos nepakankamumo (tlk-10 kodas i50).
- 1.10. Šizofrenijos (tlk-10 kodai f20-f29) ir afektinių sutrikimų (tlk kodai f30.2, f31.2-f31.5, f32.1-f32.3, f33.1-f33.3).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui v. Žilinskui.

3. N u s t a t a u, kad išrašant kompensuojamuosius vaistus šiomis metodikomis vadovautis nuo 2002 m. Spalio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS  
MINISTRAS

KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 422  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2005 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-152  
redakcija)

## **CUKRINIO DIABETO DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, METODIKA**

### **I. CUKRINIO DIABETO DIAGNOSTIKA**

1. Cukrinio diabeto diagnozė nustatoma:
  - 1.1. pagal hiperglikemijos lygį;
  - 1.2. atlikus gliukozės tolerancijos mėginį (toliau – GTM), nes tai yra tiksliausias cukrinio diabeto nustatymo būdas.
2. Cukrinio diabeto diagnozė nekelia abejonių tik tada, kai nustatomi specifiniai diabeto simptomai ir ryški hiperglikemija.
3. Jei diabetui būdingų simptomų nėra, tai vienas glikemijos tyrimas negali būti laikomas kriterijumi diagnozei nustatyti. Tokiu atveju diagnozė patvirtinama pagal du ar daugiau, tačiau ne tą pačią dieną atliktus tyrimus, rodančius patologinę glikemiją.
4. Pirmo tipo diabeto eiga dažniausiai audringa: poliurija, polifagija, polidipsija, svorio kritimas, regėjimo sutrikimai. Atliekant tyrimą randama hiperglikemija, polinkis ketonurijai.
5. Antro tipo diabetas dažnai nustatomas pavėluotai, nes 20–50 proc. pacientų jau yra pasireiškusios komplikacijos. Todėl labai svarbu laiku diagnozuoti šio tipo diabetą. Sergant antro tipo diabetu simptomų dažnai nenustatoma. Dažniausi simptomai: regėjimo sutrikimas (neaiškus matymas), šlapimo takų infekcija, infekcija mielių grybeliu, sausa niežtinti oda, galūnių tirpimas ar dilgčiojimas, nuolatinis nuovargis ir kt. Nepastovūs simptomai: padažnėjęs ar naktinis šlapinimasis, troškulys ar padidėjęs apetitas, svorio netekimas ir kt. Ketonų šlapime dažniausiai nenustatoma.
6. Antro tipo cukriniu diabetu gali susirgti bet kokio amžiaus asmenys (tiek suaugusieji, tiek ir vaikai), tačiau dažniausiai jis nustatomas vyresnio amžiaus asmenims.
7. Aktyvus antro tipo cukrinio diabeto išaiškinimas:
  - 7.1. aktyviai antro tipo cukrinio diabeto reikia ieškoti vyresniems nei 45 metų amžiaus asmenims, kuriems būdingas bent vienas iš šių rizikos veiksnių:
    - 7.1.1. padidėjusi kūno masė ( $KMI \geq 27 \text{ kg/m}^2$ ) arba liemens apimtis: vyrų –  $\geq 102 \text{ cm}$ , moterų –  $\geq 88 \text{ cm}$ ;
    - 7.1.2. sergančiųjų cukriniu diabetu pirmos eilės giminės (tėvai, broliai, seserys, vaikai);
    - 7.1.3. moterys, gimdžiusios  $> 4 \text{ kg}$  naujagimius ir/ar sirgusios gestaciniu cukriniu diabetu;
    - 7.1.4. padidėjęs AKS ( $\geq 140/90 \text{ mmHg}$ );
    - 7.1.5. didelio tankio lipoproteidų (toliau – DTL)  $\leq 0,9 \text{ mmol/l}$  ir/ar trigliceridų (toliau – Tg)  $\geq 2,2 \text{ mmol/l}$  kiekis;
    - 7.1.6. buvę gliukozės tolerancijos sutrikimai ar sutrikusi glikemija nevalgius;
    - 7.1.7. kardiovaskulinės ligos (kardiomiopatija I42–I43; I11; išemija I20–I25; I60–I69; I70–I79);
    - 7.1.8. diabetui būdingi simptomai (žr. 4, 5 punktus).
8. Kad būtų išvengta diabeto hiperdiagnostikos, negalima diabeto nustatyti vadovaujantis vien tik gliukozurijos ar gliukozės kiekiu kapiliariniame kraujyje. Diabeto diagnozė turi būti patvirtinta laboratorijoje nustatant gliukozės kiekį kraujo plazmoje (nesant galimybės tirti plazmą – bent kraujo serumą pagal laboratorinio tyrimo standartą). Pacientui, sergančiam antro tipo cukriniu

diabetu, per 3 mėnesius turi būti suteikta gydytojo endokrinologo konsultacija dėl galimos diabeto gydymo korekcijos ir diabetinių komplikacijų diagnostikos bei gydymo. Diagnozavus pirmo tipo cukrinį diabetą, pacientas nedelsiant turi būti siunčiamas konsultuotis pas gydytoją endokrinologą.

9. Diagnostiniai kriterijai pateikti 1 lentelėje:

Cukrinio diabeto, gliukozės tolerancijos sutrikimų ir sutrikusios glikemijos nevalgius diagnostiniai kriterijai

1 lentelė

| Diagnozė ir jos nustatymo sąlygos                                                                                               | Glikemija (mmol/l)        |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                 | Kraujyje                  |                           | Kraujo plazmoje           |                           |
|                                                                                                                                 | Veniniame                 | Kapiliariniame            | Veninėje                  | Kapiliarinėje             |
| <b>Cukrinis diabetas:</b><br>glikemija nevalgius<br>arba<br>praėjus 2 val. po 75 g*<br>gliukozės krūvio,<br>arba abu kriterijai | ≥6,1<br><br>≥10,0         | ≥6,1<br><br>≥11,1         | ≥7,0<br><br>≥11,1         | ≥7,0<br><br>≥12,2         |
| <b>Gliukozės tolerancijos sutrikimas</b><br>glikemija nevalgius (jei tirta)<br>ir<br>praėjus 2 val. po 75 g<br>gliukozės krūvio | <6,1<br><br>≥6,7 ir <10,0 | <6,1<br><br>≥7,8 ir <11,1 | <7,0<br><br>≥7,8 ir <11,1 | <7,0<br><br>≥8,9 ir <12,2 |
| <b>Sutrikusi glikemija nevalgius</b><br>glikemija nevalgius<br>ir<br>praėjus 2 val. po 75 g<br>gliukozės krūvio (jei tirta)     | ≥5,6 ir <6,1<br><br><6,7  | ≥5,6 ir <6,1<br><br><7,8  | ≥6,1 ir <7,0<br><br><7,8  | ≥6,1 ir <7,0<br><br><8,9  |

\*Vaikų mėginiui reikalingas gliukozės kiekis apskaičiuojamas taip: 1,75 g/kg svorio, bet ne daugiau kaip 75 g.

10. Jei neaišku, koks yra diabeto tipas ir kokią parinkti gydymą, rekomenduojama atlikti C peptido ir/ar insulino tyrimą (sprendžia gydytojas endokrinologas).

11. Gliukozės kiekio kraujyje (veniniame ar kapiliariniame) tyrimas atliekamas atrenkant žmones, kuriems galima nustatyti angliavandenių apykaitos sutrikimus. Diabeto kontrolei ir savikontrolei taip pat pakanka kapiliarinio kraujo glikemijos, nustatytos individualiu glikemijos matavimo aparatu, tyrimo. Individualaus glikemijos matavimo aparato rodmenimis gali būti remiamasi ir atliekant pacientų atranką. Nustačius individualiu aparatu bet kokio lygio atsitiktinę hiperglikemiją, diabeto diagnozės nustatyti negalima. Diabeto diagnozę rekomenduojama patvirtinti ar atmesti per 3 mėnesius, nustatant glikemiją (veninėje ar kapiliarinėje) kraujo plazmoje.

12. Gestaciniu (nėščiųjų) diabetu vadinamas angliavandenių apykaitos sutrikimas, pasireiškiantis įvairaus laipsnio hiperglikemija, pirmą kartą nustatytas nėštumo metu. Gestaciniam diabetui nustatyti atliekamas standartinis GTM. Gliukozės kiekis tiriamas kraujo plazmoje arba bent serume nevalgius ir praėjus 2 val. po valgio. Gestacinis diabetas diagnozuojamas, kai nustatyta glikemija atitinka cukrinio diabeto ar gliukozės tolerancijos sutrikimo kriterijus. Praėjus 6–12 savaičių po gimdymo vėl atliekamas GTM, tiriant glikemiją kraujo plazmoje arba serume, ir nustatoma galutinė diagnozė: cukrinis diabetas, gliukozės tolerancijos sutrikimas ar normali gliukozės tolerancija. Nustačius sutrikusią glikemiją nevalgius, vieną kartą per metus turi būti atliekamas GTM.

13. Lėtinių diabeto komplikacijų rizikos veiksnių nustatymas:

13.1. diabeto komplikacijų rizikos veiksnius išaiškinti padės:

13.1.1. paciento šeimos, gretutinių ligų ir rūkymo anamnezė, surinkta nustatant diagnozę;

- 13.1.2. arterinio kraujospūdžio, kūno masės, glikemijos svyravimų įvertinimas kiekvieno vizito metu;
- 13.1.3. gliukuoto hemoglobino (toliau – HbA<sub>1C</sub>) nustatymas;
- 13.1.4. kasmet (esant pakitimams – ir dažniau):
- 13.1.4.1. cholesterolio, didelio tankio lipoproteidų (toliau – DTL), mažo tankio lipoproteidų (toliau – MTL), trigliceridų (toliau – Tg) nustatymas;
- 13.1.4.2. proteinurijos kiekio nustatymas šlapime; jei šis tyrimas negatyvus – tirti mikroalbuminurijos kiekį (sergant pirmo tipo cukriniu diabetu – pirmą kartą po 5 metų);
- 13.1.4.3. bendrų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių įvertinimas.
14. Lėtinių komplikacijų nustatymas:
- 14.1. vieną kartą per metus būtina įvertinti paciento būklę diabetinių komplikacijų požiūriu:
- 14.1.1. joms būdingų požymių išaiškinimas ir paciento apžiūra;
- 14.1.2. pėdų apžiūra ir žaizdų rizikos nustatymas „monofilamentu“ ir kitais tyrimais;
- 14.1.3. elektrokardiograma;
- 14.1.4. mikroalbuminurijos kiekio (rytinio šlapimo porcijoje), baltymo paros šlapime nustatymas;
- 14.1.5. kreatinino kiekio serume nustatymas;
- 14.1.6. albumino/kreatinino santykio nustatymas arba glomerulų filtracijos greičio nustatymas;
- 14.1.7. atsiradus nuolatinei proteinurijai ir/arba sutrikus inkstų funkcijai (padidėjus *ureos* ar *kreatinino* kiekiui), siųsti konsultuotis pas nefrologą. Jei kreatinino yra  $\geq 180\text{--}200$  mmol/l, pacientas reguliariai turi būti konsultuojamas ir nefrologo;
- 14.1.8. akių dugno tyrimas;
- 14.1.9. cholesterolio ir kitų lipidų nustatymas.
15. Prieš skiriant gydymą antro tipo diabeto atveju, būtina:
- 15.1. apskaičiuoti kūno masės indeksą (toliau KMI) pagal šią formulę:  

$$\text{KMI} = \frac{\text{svoris (kg)}}{\text{ūgis m}^2}$$
rezultatus vertinti taip:
- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| normali kūno masė –    | 18,5–24,9 kg/m <sup>2</sup> ;   |
| padidėjusi kūno masė – | $\geq 25$ kg/m <sup>2</sup> ;   |
| antsvoris –            | 25–29,9 kg/m <sup>2</sup> ;     |
| I klasės nutukimas –   | 30–34,9 kg/m <sup>2</sup> ;     |
| II klasės nutukimas –  | 35–39,9 kg/m <sup>2</sup> ;     |
| III klasės nutukimas – | $\geq 40,0$ kg/m <sup>2</sup> ; |
- 15.2. išmatuoti arterinį kraujospūdį;
- 15.3. ištirti akis;
- 15.4. ištirti kojas (nuospauda, neuropatija ir kt.);
- 15.5. nustatyti periferinį pulsą kojose;
- 15.6. įvertinti širdies veiklą.

## II. CUKRINIO DIABETO GYDYMAS

16. Gydymo tikslas – metabolinių sutrikimų kontrolė.

Cukrinio diabeto kontrolės kriterijai

2 lentelė

| Rodiklis                                                                                                                                                                                     | Tikslas                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Savikontrolės būdu nustatomas gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje.<br>Daugiau kaip 50 proc. rezultatų turi atitikti tokį lygį:<br>prieš valgį<br>po valgio (2 val. nuo valgio pradžios) | 4,4 – 6,7 mmol/l (70–140 mg%) |

|                                                                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| prieš miegą<br>nėra ryškios (kuriai reikėtų koreguoti) ar<br>naktinės hipoglikemijos                          | <8,9 mmol/l (<160 mg%)<br>5,5-8,9 mmol/l (100-160 mg%)   |
| HbA <sub>1C</sub> neviršija 1 proc. normalaus lygio<br>norma<br>tikslas<br>HbA <sub>1C</sub> nustatymo dažnis | ≤ 6,0%<br>≤ 7,0%<br>kas 3–4 mėn.                         |
| Arterinis kraujospūdis                                                                                        | <130/80 mmHg                                             |
| Lipidai<br>MTL<br>DTL<br>Tg<br>Bendras cholesterolis                                                          | <3,0 mmol/l<br>>1,0 mmol/l<br><1,7 mmol/l<br><4,8 mmol/l |

17. Vaistai diabetui gydyti. Šiuo metu diabetui gydyti Lietuvoje iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų kompensuojamos šios vaistų grupės:

17.1. peroraliniai vaistai. Tai vaistai, veikiantys gliukozės gamybą ir/arba gliukozės utilizaciją (didinantys jautrumą insulinui):

17.1.1. biguanidai;

17.1.2. sulfonilkarbamido dariniai (trumpo ir ilgesnio veikimo vaistai, skatinantys insulino sekreciją);

17.1.3. tiazolidinedionai;

17.2. insulino preparatai, kurie grupuojami pagal kilmę, veikimo trukmę ir vartojimo ypatumus:

17.2.1. pagal kilmę insulino preparatai skirstomi į:

17.2.1.1. gyvulinės kilmės insuliną;

17.2.1.2. biosintetinį žmogaus insuliną;

17.2.2. pagal veikimo trukmę insulino preparatai skirstomi į:

17.2.2.1. greito veikimo;

17.2.2.2. trumpo veikimo;

17.2.2.3. vidutinio veikimo;

17.2.2.4. ilgo veikimo;


17.2.2.5. mišraus veikimo;

17.2.4. pagal vartojimo būdą insulino preparatai skirstomi į išleidžiamus buteliukuose (flakonuose) ir spec. pakuotėse (cilindrinėse ampulėse);

17.2.5. nustačius pirmo tipo cukrinį diabetą, ir vaikams, ir suaugusiesiems gydymas insulinu skiriamas iš karto ir insulino terapija taikoma visą paciento gyvenimą. Insulino preparatai skiriami įvairiomis dozėmis, derinant ilgesnio veikimo insulino preparatus su greito arba trumpo veikimo preparatais: greito arba trumpo veikimo insulino injekcijos prieš pagrindinius valgymus + vidutinio veikimo trukmės insulinas vieną arba du kartus. Ligoniams, kuriems šios paprastos schemos neefektyvios, kombinuojamas gydymas ilgesnio veikimo trukmės arba ilgo\*\* veikimo ir greito arba trumpo veikimo insulino preparatais keliomis injekcijomis.

17.2.6. sergantis antro tipo diabetu pacientas tam tikrą laiką (nesant komplikacijų, sprendžiama individualiai) gali būti gydomas tik dieta ir padidintu fiziniu krūviu, vėliau – peroraliniais (geriamaisiais) hipoglikemizuojančiais vaistais. Jei gydant peroraliniais vaistais diabeto kontrolė prastėja, pacientui turi būti skiriami insulino preparatai arba jie derinami su peroraliniais vaistais. Pagrindinis gydymo principas – siekiant geresnės glikemijos kontrolės, nuo standartinio gydymo schemų pereinama prie sudėtingesnio gydymo. Sumažėjus vaistų poreikiui ar pasikeitus gyvensenai galimas gydymo keitimas ir priešinga kryptimi. Antro tipo diabetas gydomas 4 etapais (1 pav.).

## ANTRO TIPO CUKRINIŲ DIABETU SERGANTIS PACIENTAS



1 pav. Bendroji gydymo strategija


PASTABA. N – jei glikemijos kontrolė nėra pakankama – pasirinkti kitą gydymo etapą.

#### 18. Nemedikamentinis antro tipo cukrinio diabeto gydymas:

18.1. Pagrindinis dietinio gydymo principas – subalansuoti pagrindinių maisto medžiagų santykį ir mažinti riebalų kiekį maiste. Dieta ir fizinis krūvis turi būti taikomi nuolatos, nuo pat gydymo pradžios (2 pav.). Visi naujai susirgę cukriniu diabetu pacientai turėtų būti siunčiami konsultuotis pas slaugytoją diabetologą arba dietologą. Mažesnio kaloringumo dieta reikalinga pacientams, turintiems antsvorį. Didėjant kūno masei būtina peržiūrėti ir mitybą, ir medikamentinį gydymą.

18.2. Fiziniai pratimai (padidintas fizinis krūvis) yra sudėtinė gydymo dalis. Pacientui reikia išaiškinti jų įtaką glikemijai, hipoglikemijų pavojų.

18.3. Gyvenimo būdo optimizavimas.




2 pav. Gyvenimo būdo optimizavimas

PASTABA. N – jei glikemijos kontrolė nėra pakankama – pasirinkti kitą gydymo etapą; T – tęsti išminktą gyvenimo būdą.

19. Pacientų, sergančių antro tipo cukriniu diabetu, gydymas peroraliniais gliukozės kiekį kraujyje mažinančiais vaistais.

19.1. Pacientai, kuriems gyvenimo būdo optimizavimas per 4–12 savaičių nebuvo efektyvus, turi būti gydomi medikamentais (monoterapija arba kombinuota terapija peroraliniais vaistais) (3 ir 4 pav.). Tačiau atskirų ligonių gydymo etapai yra labai individualūs. Glikemijos korekcija gali būti pradėta nuo bet kurio gydymo etapo, įvertinus ligonio amžių, taikytą gydymą ir jo efektyvumą, diabetines komplikacijas, gretutinius susirgimus, diabeto požymių ryškumą.



3 pav. Monoterapija peroraliniais vaistais

PASTABOS: GN – glikemija nevalgius, GPV – glikemija po valgio; MET – metforminas; SK – sulfonilkarbamido preparatai; TZD – tiazolidinedionai; N – jei glikemijos kontrolė nėra pakankama – pasirinkti kitą gydymo būdą; T – tęsti monoterapiją peroraliniais vaistais


19.2. Skiriant peroralinius gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus laikomasi tam tikrų principų:

- 19.2.1. pasirenkant vaistą iš pradžių reikia atsižvelgti į:
  - 19.2.1.1. glikemiją nevalgius ir/arba,
  - 19.2.1.2. glikemiją po valgio,
  - 19.2.1.3. kūno masės indeksą,
  - 19.2.1.4. esančias diabeto komplikacijas;

19.2.2. jei paciento kūno masės indeksas  $\geq 25 \text{ kg/m}^2$ , pirmo pasirinkimo vaistai – biguanidai arba tiazolidinedionai;

19.2.3. jei paciento kūno masės indeksas  $< 25 \text{ kg/m}^2$ , skiriami sulfonilkarbamido grupės vaistai;

19.2.4. gydymas pradedamas vienu vaistu. Daugumai ligonių monoterapija peroraliniais vaistais gerą diabeto kontrolę užtikrina daug metų. Vėliau taikomas kombinuotas peroralinis gydymas arba insulino terapija (4 pav.).



4 pav. Kombinuota terapija peroraliniais vaistais

PASTABOS: MET – metforminas; SK – sulfonilkarbamido preparatai; TZD – tiazolidinedionai; N – jei glikemijos kontrolė nėra pakankama – pasirinkti kitą gydymo būdą; T – tęsti gydymą (jei glikemijos kontrolė gera)

19.3. Derinant peroralinį gydymą, dažniausiai derinami biguanidai su sulfonilkarbamido dariniais. Kombinuota sulfonilkarbamidų su tiazolidinedionais\* terapija skiriama tuomet, kai netoleruojamas metforminas arba kombinuotas gydymas sulfonilkarbamidais su metforminu neduoda efekto. Gydymo trukmė individuali.

19.4. Pradėjus gydymą peroraliniais vaistais visi pacientai supažindinami ir su insulino terapija, kurios gali prireikti vėlesniais cukrinio diabeto gydymo etapais.

20. Indikacijos, rodančios, kad reikia taikyti insulino terapiją antro tipo cukrinio diabeto atveju:

20.1. sutrikusi glikemijos kontrolė skiriant maksimalias vaistų dozes, kai taikoma kombinuota peroralinė terapija;

20.2. bloga glikemijos kontrolė (dekompensacija) esant interkurentinei infekcijai;

20.3. ligonio parengimas operacijai;

20.4. nėštumas ir laktacija;

20.5. gyvybinių organų pažeidimas;

20.6. alergija ar kitos reakcijos į peroralinius preparatus, kuriais gydomas diabetas;

20.7. ryški hiperglikemija nuo pat diabeto nustatymo pradžios ( $16 \text{ mmol/l}$  ir daugiau);

20.8. ūmus miokardo infarktas.

21. Kombinuotas antro tipo cukrinio diabeto gydymas insulinu ir peroraliniais gliukozės kieki kraujyje mažinančiais vaistais taikomas:

21.1. kai gydymas peroraliniais vaistais nėra efektyvus;

21.2. kai nutukę pacientai jau buvo nuolat gydomi didelėmis insulino dozėmis;

21.2.1. tikslingiau insuliną skirti kartu su metforminu, nes tuomet mažesnis pavojus didėti kūno masei;

21.2.2. gali būti skiriami insulino ir sulfonilkarbamido darinių deriniai;

21.2.3. taikant kombinuotą gydymą, pradinė insulino dozė 0,1–0,2 vv/kg didinama iki efektyvios; tokiems ligoniams būtina savikontrolė;

21.2.4. jei šis gydymas neefektyvus (bloga diabeto kontrolė) – taikoma monoterapija insulinu. Insulinas skiriamas pagal įvairias schemas. Insulino skiriama 0,7–0,8 vv/kg kūno masės. Jei organizmas atsparus insulinui, sergama gretutinėmis ligomis, infekcija, ūmios diabetinės komplikacijos ir kt., insulino poreikis didėja iki 1,0–1,5 vv/kg ar net daugiau.

21.3. Pradedant paciento gydymą insulinu, būtinas glaudus pirminio ir antrinio lygių sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių medikų bendradarbiavimas, vienodas cukrinio diabeto kontrolės kriterijų ir jų korekcijos suvokimas bei interpretavimas.

21.4. Vyresnio amžiaus pacientams insuliną reikia skirti atsargiai: įvertinant lėtines diabeto komplikacijas ir gretutines ligas – vengiant hipoglikeminių būklių. Insulinas skiriamas įvairiomis schemomis: dvi (ryte ir vakare) monofazinio vidutinės veikimo trukmės insulino injekcijos arba dvi bifazinio vidutinės veikimo trukmės insulino injekcijos + trumpo arba greito veikimo insulinas prieš pietus; trumpo veikimo insulino injekcijos prieš pagrindinius valgymus + vidutinės veikimo trukmės insulinas vieną arba du kartus. Ligoniams, kuriems šios schemos neefektyvios, kombinuojamas gydymas ilgo\*\* veikimo ir greito arba trumpo veikimo insulino preparatais keliomis injekcijomis.

22. Gydymo keitimo kriterijai:

22.1. jeigu  $HbA_{1C}$  randama daugiau kaip 7,0 proc., gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje nevalgius nuolat yra didesnis nei 6,7 mmol/l, po valgio nuolatos yra didesnis nei 8,9 mmol/l, reikia peržiūrėti gydymą ir atitinkamai jį koreguoti;

22.1.1. jei pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems nepavyksta koreguoti to per 3 mėn. (bloga diabeto kontrolė) – pacientas turi būti siunčiamas konsultuotis pas specialistą;

22.1.2. glikemijos kontrolė vertinama pagal  $HbA_{1C}$  lygį. Nesant galimybės tirti  $HbA_{1C}$  kas 3–4 mėn., glikemijos kontrolė vertinama bent pagal glikemiją nevalgius ir 2 val. po valgio. (Pastaba.  $HbA_{1C}$  tyrimas cukrinio diabeto diagnostikai nenaudojamas).

22.2. Sergančiojo cukriniu diabetu ligos eigą prižiūri šeimos gydytojai po specialisto (gydytojo endokrinologo) konsultacijos, vaikų – vaikų endokrinologai.

22.3. Jei įtariamas antro tipo cukrinis diabetas, diabeto komplikacijoms išaiškinti pacientas per 3 mėn. turi būti konsultuojamas gydytojo endokrinologo ir atitinkamų specialistų.

22.4. Vieną kartą per metus, nors diabetas ir kontroliuojamas, pacientas turi būti konsultuojamas specialisto (gydytojo endokrinologo), kad būtų įvertintas diabetinių komplikacijų atsiradimas, jų progresavimas bei numatytas priežiūros planas.

22.4.1. Specialisto konsultacija būtina, kai:

22.4.1.1 pirmą kartą įtariamas cukrinis diabetas;

22.4.1.2. labili diabeto eiga;

22.4.1.3. 3 mėn. nekontroliuojamas diabetas;

22.4.1.4. naujai išaiškinus cukrinio diabeto komplikacijas;

22.4.1.5. diabetinių komplikacijų progresavimas;

22.4.1.6. poliendokrinopatija;

22.4.1.7. alergija insulinui;

22.4.1.8. diabetinė nefropatija;

22.4.1.9. prieš ir po inkstų transplantacijos;

22.4.1.10. neurologinės komplikacijos:

22.4.1.10.1. diabetinė amiotrofija;

22.4.1.10.2. neuroišeminės opos;

22.4.1.10.3. autonominė neuropatija, kai pažeistas organas arba sutrikusi jo funkcija;

22.4.1.10.4. diabetinė artropatija;

- 22.4.1.11. specialus cukrinio diabeto ištyrimas (Z13.1);
- 22.4.1.12. cukrinis diabetas ir nėštumas; nėščiąjų cukrinis diabetas:
  - 22.4.1.12.1. aktyvi priežiūra visą nėštumo laikotarpį;
  - 22.4.1.12.2. aktyvus diabetinių komplikacijų dinamikos stebėjimas ir korekcija;
  - 22.4.1.12.3. griežta cukrinio diabeto kontrolė planuojant nėštumą;
- 22.4.1.13. esant neaiškiam diabeto tipui.

23. Nustačius antro tipo cukrinio diabeto diagnozę, taikomas etapinis gydymas – nuo paprastesnio pereinama prie sudėtingesnio:

23.1. Pirmas etapas: gydymas dieta ir padidinto fizinio krūvio taikymas. Etapo trukmė – iki kelerių metų.

23.2. Antras etapas: monoterapija peroraliniais vaistais;

23.2.1. esant didesnei kūno masei ( $KMI > 25 \text{ kg/m}^2$ ):

23.2.1.1. gydymas dieta ir padidintu fiziniu krūviu ir biguanidais, netoleruojant biguanidų – sulfonilkarbamidais arba tiazolidinedionais\*. Biguanidų leistina paros dozė – 2,55 g, sulfonilkarbamidų leistina paros dozė: gliklazido – 320 mg, ilgo veikimo gliklazido – 120 mg, glimepirido 6 mg, ilgo veikimo glipizido – 20 mg, glibenklamido – 15 mg, glibenklamido (mikronizuoto) – 10,5 mg, glikvidono – 180 mg, tiazolidinedionų: roziglitazono – 8 mg, pioglitazono – 45 mg, etapo trukmė – iki kelerių metų;

23.2.2. esant normaliai kūno masei:

23.2.2.1. gydymas dieta, padidintu fiziniu krūviu ir sulfonilkarbamido preparatais. Pirmenybė teikiama ilgo veikimo preparatams. Etapo trukmė – nuo kelerių mėnesių iki kelių metų.

23.3. Trečias etapas: kombinuotas gydymas peroraliniais vaistais:

23.3.1. gydymas dieta, padidintu fiziniu krūviu, sulfonilkarbamido preparatais ir biguanidais;

23.3.2. gydymas dieta, padidintu fiziniu krūviu ir biguanidais arba sulfonilkarbamido dariniais ir tiazolidinedionais. Etapo trukmė – iki kelerių metų.

23.4. Ketvirtas etapas: kombinuotas gydymas peroraliniais vaistais ir insulino preparatais\*\*:

23.4.1. gydymas dieta, padidintu fiziniu krūviu, sulfonilkarbamido preparatais arba biguanidais ir insulino preparatais., Etapo trukmė – iki kelerių metų;

23.4.2. gydymas dieta, padidintu fiziniu krūviu, sulfonilkarbamido preparatais, biguanidais ir insulino preparatais. Etapo trukmė – iki kelerių metų.

23.4.3. jei sergant antro tipo diabetu glikemijos kiekis nuolat viršija 16 mmol/l arba nustatomos ryškios komplikacijos, sukėlusios organų funkcijos sutrikimą, skiriami insulino preparatai.

23.5. Penktas etapas: gydymas dieta, padidintu fiziniu krūviu, insulino preparatais\*\*. Etapo trukmė – nuolatinis gydymas.

PASTABOS:

1. \*Tiazolidinedionai skiriami taikant monoterapiją ligoniams, turintiems padidėjusią kūno masę ( $KMI > 25 \text{ kg/m}^2$ ), kuriems yra nepakankama diabeto kontrolė, gydant dieta, padidintu fiziniu krūviu ir biguanidais, taip pat – kai biguanidai netoleruojami arba kontraindikuotini.

Tiazolidinedionai skiriami derinant sergančiųjų antro tipo cukriniu diabetu gydymą peroraliniais vaistais, kai kontrolė nepasiekama maksimaliai toleruojamomis biguanidų ar sulfonilkarbamidų dozėmis.

Tiazolidinedionai su metforminu skiriami ligoniams, turintiems padidėjusią kūno masę ( $KMI > 25 \text{ kg/m}^2$ ), su sulfonilkarbamidų preparatais – tiems ligoniams, kurie netoleruoja biguanidų arba kuriems jie kontraindikuotini.

Tiazolidinedionai neskiriami su insulinu.

2. \*\* Ilgai veikiantis insulinas (išskyrus gyvulinės kilmės) skiriamas pacientams, sergantiems pirmo tipo cukriniu diabetu, kuriems po 3 mėn. įprastinės insulino terapijos išlieka stabili  $> 7,8 \text{ mmol/l}$  rytinė hiperglikemija (tyrimai atliekami ne rečiau kaip kas 2 sav.) ir  $> 7,0 \text{ proc. HbA1c}$ . Ilgai veikiantis insulinas (išskyrus gyvulinės kilmės) skiriamas derinant gydymą kartu su

peroraliniais hipoglikemizuojamaisiais vaistais ar įprastiniu insulinu pacientams, sergantiems antro tipo cukriniu diabetu, kuriems po 3 mėn. įprastinės insulino ar insulino ir peroralinių hipoglikemizuojamųjų preparatų terapijos kliniškai ir savikontrolės priemonėmis ar laboratoriniais tyrimais nustatomas hipoglikemijos sindromas (tyrimai atliekami ne rečiau kaip kas 2 sav.) ir per 12 mėn. laikotarpį dokumentais patvirtintos lėtinės kardiologinės komplikacijos – stabili III–IV funkcinės klasės krūtinės angina, persirgtas miokardo infarktas, koronarografija, ar kitais tyrimais (echoskopija, doputamino mėginys, veloergometrija) įrodyta vainikinių kraujagyslių patologija, aterosklerozės kilmės širdies ritmo ir laidumo sutrikimai, lėtinės neurologinės komplikacijos ar ligos (persirgtas ischeminis, hemoraginis insultas, vaskulinės smegenų ischemijos būklė, epilepsinis sindromas) ir proliferacinė retinopatija.“

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-152](#), 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 33-1074 (2005-03-10), i. k. 1052250ISAK000V-152

## PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d.  
įsakymu Nr. 422


### **DIALIZUOJAMŲ PACIENTŲ IR LIGONIŲ PO INKSTŲ PERSODINIMO (TLK-10 KODAI Z49, Z94.0) DIAGNOSTIKOS BEI AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ METODIKA**


#### **I. LIGONIŲ, KURIEMS GALI PRIREIKTI DIALIZĖS (PREDIALIZUOJAMŲJŲ), IR LIGONIŲ, KURIEMS ATLIKTA INKSTŲ TRANSPLANTACIJA, GYDYMO ALFA ARBA BETA EPOETINAI (TOLIAU – EPO) ARBA DARBEPOETINU ALFA METODIKA**

1. Gydyto tikslas – palaikyti vidutinišką, 115 g/l, hemoglobino (toliau – Hb) koncentraciją.
2. Gydytas pradamas, kai Hb kiekis < 110g/l ir Ht < 33%, nustačius feritino atsargas. Jei serumo feritino < 100 mcg/ml, papildyti Fe.
3. Gydytas EPO arba darbepoetinu alfa pradamas tik pasiekus minėtą feritino normą.
4. EPO pradinė dozė TV/kg/sav. į poodį: jei Hb kiekis 100–110 g/l – 50, jei 90–100 g/l – 100, jei 80–90 g/l – 150, jei < 80 g/l – daugiau kaip 150. Darbepoetino alfa pradinė dozė – 0,45 mcg/kg į poodį per savaitę arba 0,75 mcg/kg į poodį vieną kartą per dvi savaites.
5. Tirti Hb kiekį 1 k/mėn. Hb turi didėti 10–20 g/l/mėn. Jei Hb kiekis didėja < 7 g/l/mėn., Ht < 2 %, EPO dozė didinti 50 %/mėn., darbepoetino alfa dozė didinti 25 %/mėn. Jei Hb kiekis didėja > 25 g/l/mėn., Ht > 8 %, EPO, darbepoetino alfa dozė mažinti 25-50 %/mėn.
6. Gydyto tikslas – Hb-110–120 g/l, Ht-33–36 %. Pasiekus norimą lygį, Hb ir Ht tirti 1 k/mėn., feritiną – kas 3 mėn.
7. Palaikomoji EPO dozė – 50-100 TV/kg/sav., darbepoetino alfa – 0,187–0,5625 mcg/kg/sav. Jei Hb kiekis didesnis kaip 120 g/l, 1 mėn. palaikomosios dozės nekeisti. Jei Hb kiekis išlieka didesnis kaip 120 g/l – mažinti EPO arba darbepoetino alfa dozę. Jei Hb kiekis neviršija 120 g/l – palikti tokią pačią dozę. Jei Hb kiekis sumažėjo mažiau kaip 110 g/l, 1 mėn. dozės nekeisti. Jei Hb kiekis išlieka mažesnis kaip 110 g/l – didinti EPO arba darbepoetino alfa dozę. Jei Hb kiekis viršija 110 g/l – palikti tokią pačią dozę. Jei Hb kiekis didesnis kaip 120 g/l ir išlieka skiriant minimalias EPO arba darbepoetino alfa dozes 1 mėn., gydymą EPO arba darbepoetinu alfa laikinai nutraukti (1 schema).

1 schema

#### **LIGONIŲ, KURIEMS GALI PRIREIKTI DIALIZĖS (PREDIALIZUOJAMŲJŲ), IR LIGONIŲ, KURIEMS ATLIKTA INKSTŲ TRANSPLANTACIJA, GYDYMO ALFA ARBA BETA EPOETINAI (TOLIAU – EPO) ARBA DARBEPOETINU ALFA METODIKOS SCHEMA**





Skyriaus pakeitimai:


Nr. [V-350](#), 2006-04-28, Žin., 2006, Nr. 51-1901 (2006-05-11), i. k. 1062250ISAK000V-350

## II. DIALIZUOJAMŲJŲ LIGONIŲ GYDYMO ALFA ARBA BETA EPOETINAIŠ ARBA DARBEPOETINU ALFA METODIKA

8. Gydyto tikslas – palaikyti vidutinišką Hb koncentraciją (100 g/l).
9. Gydyto pradamas, kai Hb < 100 g/l ir Ht < 28 %, nustačius feritino atsargas: jei serumo feritino ≤ 100 mcg/ml, papildyti Fe.
10. Gydyto EPO arba darbopoetinu alfa pradamas tik pasiekus minėtas feritino normas. EPO pradinė dozė TV/kg/sav. į poodį: jei Hb 90–100 g/l – 50, jei 80–90 g/l – 100, jei 70–80 g/l – 150, jei < 70 g/l – daugiau kaip 150. Darbopoetino alfa pradinė dozė – 0,45 mcg/kg į poodį ar į veną vieną kartą per savaitę.
11. Tirti Hb kiekį 1 k/mėn. Hb kiekis turi didėti 10–20 g/l/mėn. Jei Hb kiekis didėja < 7 g/l/mėn., Ht < 2 %, EPO dozę didinti 50 %/mėn., darbopoetino alfa dozę didinti 25 %/mėn. Jei Hb kiekis didėja > 25 g/l/mėn., Ht > 8 %, EPO arba darbopoetino alfa dozę mažinti 25–50 %/mėn.
12. Gydyto tikslas – Hb-100–105 g/l, Ht-28–31 %.
13. Pasiekus norimą lygį, Hb ir Ht tirti 1k/mėn., feritiną – kas 3 mėn.
14. Palaikomoji EPO dozė – 50–75 TV/kg/sav., darbopoetino alfa 0,187–0,5625 mcg/kg/sav. Jei Hb kiekis padidėja daugiau kaip 105 g/l, 1 mėn. palaikomosios dozės nekeisti, vėliau jei Hb kiekis nesumažėja – mažinti dozę. Jei Hb neviršija 105 g/l – palikti tokią pačią dozę. Jei Hb kiekis sumažėjo mažiau kaip 100 g/l, 1 mėn. dozės nekeisti. Jei Hb kiekis laikosi mažesnis kaip 100 g/l – didinti dozę. Jei Hb kiekis padidėja daugiau kaip 100 g/l – palikti tokią pačią dozę. Jei Hb pakyla daugiau kaip 115 g/l ir skiriant minimalias vaistų dozes 1 mėn. laikosi didesnis kaip 100 g/l, gydymą EPO arba darbopoetinu alfa laikinai nutraukti (2 schema).

2 schema

## DIALIZUOJAMŲJŲ LIGONIŲ GYDYMO ALFA ARBA BETA EPOETINAIŠ ARBA DARBEPOETINU ALFA METODIKOS SCHEMA



*Skyriaus pakeitimai:*

Nr. [V-350](#), 2006-04-28, Žin., 2006, Nr. 51-1901 (2006-05-11), i. k. 1062250ISAK000V-350

### III. ALFAKALCIDOLIO SKYRIMO INDIKACIJOS ESANT ANTRINIAM HIPERPARATIREOIDIZMUI

Sergant lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu vystosi antrinis hiperparatireoidizmas, t. y. mažėja kalcio ir didėja parathormono (PTH) kiekis kraujo serume. Kad būtų užblokuota paraskyminių liaukų hiperfunkcija ir pagerėtų kalcio rezorbcija žarnyne, skiriamas alfacalcidolis (aktyvusis D<sub>3</sub> vitaminas).

Jis indikuotinas, kai:

1. PTH norma (18,2 – 74 pg/ml, o kalcio kiekis < 2,2 mmol/l – alfacalcidolio skiriama 0,25–0,5 mkg/d.
2. PTH > 2-5 kartus už normą, o kalcio kiekis – norma (2,2 – 2,7 mmol/l) arba < 2,2 mmol/l, alfacalcidolio skiriama 0,5 – 1,0 mkg/d.
3. PTH > 5-10 kartų už normą, o kalcio kiekis – norma arba < 2,2 mmol/l, alfacalcidolio skiriama 2,0 mkg/d.
4. PTH > 10 kartų už normą, o kalcio kiekis – norma arba < 2,2 mmol/l, alfacalcidolio skiriama maksimali dozė – 4 mkg/d arba „puls“ terapija; 4-8 mg/3 kartus per savaitę.

Pastaba: alfacalcidolis neskiriamas, kai fosforo kiekis viršija 2,0 mmol/l, nepaisant padidėjusio PTH ar sumažėjusio kalcio kiekio kraujo serume.

#### IV. IMUNOSUPRESIJOS PO INKSTŲ TRANSPLANTACIJOS SCHEMOS

| Rizikos laipsnis | Recipientai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bazinė imunosupresija                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įprastas         | 1) recipientas nesensitizuotas, inkstas kadaverinis, HLA dermė- $\geq 3$ bendri Ag iš 6<br>2) recipientas nesensitizuotas, inkstas gyvo donoro, HLA dermė -1-6 bendri Ag iš 6<br>3) limfocitotoksinų iki 50 proc., inkstas gyvo donoro su HLA dermė-6bendri Ag iš 6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Methylprednizolonas,<br>Azatioprinas,<br>Ciklosporinas (CsA)<br><br>Methylprednizolonas,<br>Azatioprinas,<br>Ciklosporinas<br><br>Methylprednizolonas,<br>Azatioprinas,<br>Ciklosporinas |
| Vidutinis        | 1) inkstų nepakankamumas išsivystė dėl autoimuninių ligų 2) po pakartotinės transplantacijos<br>3) asmenys iki 18 metų ir audinių dermė -< 3 bendri Ag iš 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Methylprednizolonas,<br>Mikofenolato mofetilis,<br>Ciklosporinas                                                                                                                         |
| Didelis          | 1) recipientas sensitizuotas >50 %, inkstas kadaverinis, HLA dermė -<3 bendri Ag iš 6<br>2) recipientas sensitizuotas >50%, pakartotinis persodinimas, kadaverinis ar gyvo donoro inkstas, HLA dermė- 0-6 bendri Ag iš 6<br>3) recipientas sensitizuotas >50%, pakartotinė transplantacija, praėityje transplantatas atmetas per pirmuosius metus dėl imuninės priežasties<br>4) recipientas sensitizuotas >50%, asmenys iki 18 m., inkstas kadaverinis ar gyvo donoro, HLA dermė -0-6bendri Ag iš 6<br>5) kai yra steroidams atsparios atmetimo reakcijos. | Ciklosporinas,<br>Methylprednizolonas,<br>Mikofenolato mofetilis                                                                                                                         |

#### V. HIPERKALEMIJOS GYDYMO TAKTIKA

Kalio kiekiui organizme padidėjus iki 7,5 mmol/l, kyla asistolijos grėsmė.

Kai ligonio organizmas, nepaisant hemodializės, kaupia kalį ir tarp hemodializių vystosi hiperkalemija (kalio kiekis kraujo serume > 6 mmol/l), būtina:

1) Dieta, ribojant kalio kiekį: vengti maisto produktų, kuriuose daug kalio, pavyzdžiui, vaisiai ir daržovės, ypač džiovinti vaisiai, riešutai, arbata, kava, konservuoti ir rauginti produktai ir kt; specialiai ruošti maistą, pvz., bulves prieš gaminant 2-3 val. mirkyti vandenyje jį nuolat keičiant, taip pat rekomenduojamas troškintas arba garuose virtas maistas.

2) Jeigu dieta neefektyvi, esant uždegimui, audinių griuvimui, anurijai, reikia skirti sorbisteritą. Jis skiriamas, kai kalio kiekis kraujo serume  $\geq 6,0$  mmol/l. Pradinė dozė, atsižvelgiant į kūno svorį, 20-40 g/d per os. Maksimali dozė – 60 g/d. Kai kalio koncentracija kraujo serume sumažėja iki 5,0 mmol/l, šio medikamento dozė sumažinama iki minimalios – 20 g/d arba nutraukiama.

3) Sorbisteritas skiriamas ir tais atvejais, kai dėl kokių nors priežasčių: kraujavimo, žaizdos hematomos operacijos atlikti negalima, o kalio kiekis ligonio kraujo serume didėja.

Pastaba: kontraindikacijos nurodytos aprašyme.

## VI. IMUNOSUPRESIJA PO INKSTŲ TRANSPLANTACIJOS (ambulatorinė)

Ligoniams po inksto transplantacijos imunosupresantus (methylprednizoloną, azatiopriną, ciklosporiną, mikofenolato mofetilį) skiria gydytojai nefrologai ir vaikų nefrologai, o bendrosios praktikos gydytojai bei pediatrai – 3 mėn. po nefrologo konsultacijos.

| Mėnesiai               | Ciklosporinas<br>(pagal koncentraciją<br>kraujo serume) | AZATIOPRINA<br>S | Methylpred-<br>nizolonas | Mikofenolato<br>mofetilis |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 mėn. po Tx           | 250 – 350 ng/ml                                         | 2 mg/kg          | 12 mg                    | 2,0 –3,0 g/d*             |
| 2 mėn. po Tx           | 150 – 200 ng/ml                                         |                  | 10 mg                    | 2,0 –3,0 g/d              |
| 3 mėn. po Tx ir vėliau | 100 – 150 ng/ml                                         |                  | 8 mg                     | 2,0 –3,0 g/d              |

\* Pastaba: apmokama iš Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos lėšų.

### Ciklosporino koncentracijos kontrolė

1. Sandimuno koncentracija nustatoma EMIT tyrimo metodu.
2. Matuojama mažiausia koncentracija kraujyje.
3. Jeigu dozė keičiama, ciklosporino koncentracija matuojama po 3 vaisto skilimo pusperiodžių, t. y. po 72 val.
4. Gydant tam tikrais vaistais (pvz., CYP 3A4 inhibitoriais), ciklosporino koncentracija ypatingai didėja, todėl koncentracija turi būti nustatoma dažniau.

## VII. INDIKACIJOS IR DOZAVIMAS

| Vaisto pavadinimas | Indikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dozavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gancikloviras      | Kai inksto donoras turi teigiamų CMV antikūnų, o recipientas neturi (D+/R-), 3 mėn. po transplantacijos skiriamas profilaktinis gydymas po 1 g 3 kartus per dieną.<br>Po persirgtos ūmios CMV infekcijos ir viremijos (PP 65 teigiamas, t. y. >0 teigiamų leukocitų iš peržiūrėtų, nustatomas APAAP metodu) toliau tęsiamas ambulatorinis peroralinis gydymo kursas iki 4 mėn.<br>Jei buvo gydyta ūmi CMV infekcija, bet PP 65 neigiamas, gancikloviras skiriamas tik gydytojų konsiliumo sprendimu. | 1 g 3 kartus per dieną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fluconazolis       | Grybelinei infekcijai po inksto transplantacijos: burnos, virškinamojo trakto, šlapimo takų, odos, t. p. išaugus grybeliui iš skreplių, pasėlyje iš genitalijų, skiriamas Fluconazolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Burnos ir ryklės kandidozė gydoma skiriant 100 mg (prireikus po 200 mg) per parą 7-14 dienų; stemplės ir žarnyno kandidozė – tokia pačia doze 14-30 dienų, genitalijų kandidozė – 150–200 mg per savaitę iki pusės metų; odos kandidozė – 50-100 mg per dieną (ilgiausiai 6 sav.); sistemeinei kandidozei – 200-400 mg per parą iki 6-8 sav. |

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d.  
įsakymu Nr. 422

**EPILEPSIJOS DIAGNOSTIKOS BEI AMBULATORINIO GYDYMO,  
KOMPENSUOJAMO IŠ PSDF BIUDŽETO, METODIKA**

**I. EPILEPSIJOS DIAGNOZĖS NUSTATYMAS**

1. Epilepsija diagnozuojama ir ilgalaikis medikamentinis gydymas skiriamas įvykus 2 ir daugiau epilepsijos priepuolių.
2. Epilepsija diagnozuojama:
  - 2.1. įvertinus anamnezę:
    - 2.1.1. klinikinius priepuolių požymius, trukmę ir aplinkybes,
    - 2.1.2. prenatalinio ir perinatalinio periodo komplikacijas,
    - 2.1.3. nervų sistemos raidą ir būklę iki priepuolių pradžios,
    - 2.1.4. neuroinfekcijas, traumas, insultus, intoksikacijas praeityje,
    - 2.1.5. febrilinius ar kitus traukulius,
    - 2.1.6. šeiminių anamnezę epilepsijos ar kitų nervų sistemos ligų požįūriu,
    - 2.1.7. priklausomybę nuo alkoholio ar toksinių medžiagų;
  - 2.2. atlikus elektroencefalogramą (EEG), kurios tikslas:
    - 2.2.1. patvirtinti epilepsijos diagnozę,
    - 2.2.2. nustatyti epileptogeninio židinio vietą,
    - 2.2.3. klasifikuoti epilepsijos formą,
    - 2.2.4. atmesti neepilepsinės kilmės priepuolius,
    - 2.2.5. įvertinti gydymo efektyvumą,
    - 2.2.6. spręsti dėl gydymo vaistais nuo epilepsijos (toliau – VNE) baigimo.
3. Miego EEG ir ilgalaikė EEG stebėseną atliekama, kai būdravimo EEG nepakanka epilepsijos diagnozei patvirtinti, jos formai nustatyti ar tiksliai epileptogeninio židinio vietai surasti spendžiant dėl operacinio gydymo.
4. Magnetinio rezonanso tomografija (MRT) indikuotina:
  - 4.1. įtarus židininę epilepsiją,
  - 4.2. esant neklasifikuotų ar generalizuotų priepuolių, prasidėjusių ikimokyklinio amžiaus vaikams,
  - 4.3. nustačius pastovių ar progresuojančių židinių neurologinių požymių klinikinio ar neuropsichologinio tyrimo metu,
  - 4.4. esant priepuolių, nors taikomas gydymas.
5. Kompiuterinė tomografija (KT) atliekama, kai nėra galimybės atlikti MRT arba reikia skubaus vaizdo tyrimo.
6. MRT ir KT rezultatai interpretuojami atsižvelgiant į klinikinius požymius.
7. Klinikiniai kraujo bei kepenų fermentų tyrimai atliekami įtarus nepageidaujamą VNE poveikį ar padidėjus jų atsiradimo rizikai bei valproatus vartojant jaunesniems nei 2 metų amžiaus vaikams.
8. VNE koncentracijos plazmoje tyrimai atliekami, kai:
  - 8.1. priepuoliai kartojasi skyrus gydymą,
  - 8.2. reikia koreguoti vaisto dozę,
  - 8.3. vaistai blogai toleruojami,
  - 8.4. įtariamas nuo dozės priklausantis nepageidaujamas vaistų poveikis,
  - 8.5. įtariama nepageidaujama vaistų sąveika,
  - 8.6. įtariamas gydymo režimo pažeidimas,
  - 8.7. nenumatyta kinta VNE koncentracija (pvz., dėl nėštumo, hipoalbuminemijos,

kepenų nepakankamumo, uremijos, virškinimo sutrikimų, interkurentinių ligų).

9. Psichologo konsultacija padeda patikslinti diagnozę, įvertinti ligos eigą bei psichoemocinius sutrikimus. Ji atliekama, įtarus pažinimo funkcijų, emocijų ar elgesio pakitimų, taip pat priešoperacinio tyrimo metu.

## II. EPILEPSIJOS GYDYMAS

10. Ištikus dviem, ar daugiau kliniškai patvirtintų epilepsijos priepuolių, pradedamas ilgalaikis gydymas VNE. Tokiu atveju EEG pakitimų nebuvimas nepaneigia epilepsijos diagnozės.

11. Epilepsija gali būti diagnozuojama ir gydymas skiriamas po vieno epilepsijos priepuolio ar pasikartojančių išprovokuotų priepuolių (didelė rizika), kai:

11.1. yra struktūrinio nervų sistemos pažeidimo požymių,

11.2. ryškūs pakitimai EEG,

11.3. pirmasis priepuolis tęsėsi 15 min. ar ilgiau.

12. Po dviejų priepuolių galima neskirti gydymo (maža rizika), kai:

12.1. nepakanka klinikinių ir EEG duomenų apie epilepsinę priepuolių kilmę,

12.2. pirmąjį ir antrąjį priepuolius skiria ne trumpesnis nei vienerių metų laikotarpis.

13. Gydymo indikacijos nustatomos individualiai, įvertinus priepuolių riziką bei paciento gyvenimo būdo ypatumus. Vertinant gydymo efektą, atsižvelgiama į galimus gydymo režimo pažeidimus.

14. VNE skiria ir koreguoja gydytojas neurologas (vaikų neurologas). Gydymą paskirtais VNE gali tęsti šeimos gydytojas (vidaus arba vaikų ligų gydytojas) pagal galiojančius teisės aktus. Priepuoliams kartojantis, pacientas siunčiamas konsultuotis pas gydytoją neurologą (vaikų neurologą)

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-205](#), 2005-03-25, *Žin.*, 2005, Nr. 45-1470 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-205

## III. EPILEPSIJOS GYDYMO PROTOKOLAS

15. Diagnozavus epilepsiją, skiriami vieni vaistai (monoterapija) ir taikomas terapinis mokymas.

16. Vaisto dozė didinama iki maksimalios toleruojamos (kliniškai ar stebint plazmos koncentraciją) arba kol priepuoliai nebesikartoja.

17. Jei priepuoliai nesikartoja, gydymas tęsiamas 2-5 m. nuo paskutiniojo priepuolio, dėl gydymo nutraukimo sprendžiama individualiai.

18. Jei gydymo režimas nepažeidžiamas, bet priepuoliai kartojasi, gydymas pirmaisiais vaistais palaipsniui keičiamas kitais (monoterapija).

19. Jeigu dvi monoterapijos neduoda efekto (priepuoliai tokie kaip ir iki gydymo) arba tik iš dalies efektyvios (priepuoliai retesni ir lengvesni), pradedama politerapija.

20. Jei vartojant dvejus vaistus priepuoliai žymiai palengvėja, nėra nepageidaujamos reakcijos į vaistus, tęsiama politerapija.

21. Jei priepuoliai nesikartoja, svarstoma dėl gydymo pirmaisiais vaistais užbaigimo, tęsiant gydymą antraisiais.

22. Jei priepuoliai nepasikeitė, antrieji vaistai keičiami kitais.

23. Priepuoliams kartojantis, skiriami kiti vaistų deriniai.

24. Apie VNE keitimą, papildymą kitais arba gydymo nutraukimą kiekvienu atveju sprendžiama pasiekus terapinę vaisto dozę ir/ar terapinę vaisto koncentraciją kraujo plazmoje ir praėjus ne trumpesniam kaip dviem tarppriepuoliniams periodams laikotarpiui.

25. Įprastos VNE dozės:

| Vaistas    | ĮPRASTA PALAIKOMOJI PAROS DOZĖ |                     |
|------------|--------------------------------|---------------------|
|            | Vaikams (mg/kg)                | Suaugusiesiems (mg) |
| Valproatas | 20 – 30 (60)                   | 1000-2500           |

|                               |              |           |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| Karbamazepinas                | 10 – 20 (30) | 400-1800  |
| Okskarbazepinas               | 30 (40)      | 600-2400  |
| Sultiamas                     | 5 (10)       |           |
| Etosukcimidas                 | 20 – 40      | 500-2000  |
| Lamotriginas                  | 2-15         | 100-400   |
| Topiramatas                   | 3 – 9        | 200-600   |
| Nitrazepamas                  | 0,5          |           |
| Klonazepamas                  | 0,1 – 0,2    | 2-6       |
| Diazepamas (vienkartinė dozė) | 0,5 – 1      | 10-20     |
| Gabapentinas                  | 25-35 (60)   | 900-3600  |
| Vigabatrinas                  | 40-80 (100)  | 1000-3000 |
| Fenitoinas                    | 4 – 8        | 200-300   |
| Fenobarbitalis                | 2 – 5        | 60-180    |
| Primidonas                    | 5 – 20       | 750-1000  |

26. Priepuoliams kartojantis, visų VNE dozės didinamos iki didžiausios toleruojamos ar veiksmingos.

27. Taikant politerapiją, įvertinama vaistų sąveikos ir nepageidaujamo poveikio tikimybė. Politerapijai taikant fenitoiną, būtina stebėti jo koncentraciją plazmoje.

28. Vaistai atskiroms epilepsijos formoms gydyti:

| <b><i>Epilepsijos forma ir kodas pagal TLK- 10</i></b>                                                                              | <b><i>Pirmojo pasirinkimo vaistai</i></b>                                                                       | <b><i>Antrojo pasirinkimo vaistai</i></b>                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Židininė idopatinė epilepsija<br>(Rolando)<br>G40.0                                                                                 | Valproatas<br>Sultiamas<br>Karbamazepinas<br>Okskarbazepinas                                                    | Klonazepamas<br>Nitrazepamas<br>Fenitoinas<br>Gabapentinas*                     |
| Simptominė ir kriptogeninė (paprastieji ar sudėtingieji židininiai priepuoliai su antrine generalizacija ar be jos)<br>G40.1, G40.2 | Karbamazepinas<br>Okskarbazepinas<br>Valproatas<br>Fenitoinas<br>Lamotriginas*<br>Topiramatas*<br>Gabapentinas* | Fenobarbitalis<br>Primidonas<br>Nitrazepamas<br>Klonazepamas Sultiamas          |
| Generalizuota idiopatinė epilepsija<br>G40.3<br><input type="checkbox"/> Absansai                                                   | Valproatas<br>Etosukcimidas<br>Lamotriginas*<br>Topiramatas* Nitrazepamas<br>Klonazepamas                       | Fenobarbitalis                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Mioklonijos                                                                                                | Valproatas<br>Klonazepamas<br>Lamotriginas*<br>Topiramatas*                                                     | Etosukcimidas                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Generalizuoti toniniai –kloniniai traukuliai                                                               | Valproatas<br>Lamotriginas*<br>Topiramatas*                                                                     | Fenobarbitalis<br>Karbamazepinas<br>Okskarbazepinas<br>Fenitoinas<br>Primidonas |
| Specialieji sindromai<br>G40.4<br><input type="checkbox"/> West                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                 |
|                                                                                                                                     | Valproatai<br>Klonazepamas<br>Nitrazepamas<br>Lamotriginas*<br>Topiramatas*                                     |                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Lennox-Gastaut ir miokloninė-astatinė epilepsija                                                           | Valproatai<br>Lamotriginas*                                                                                     | Karbamazepinas<br>Okskarbazepinas                                               |

|                                                                                                |                                                                                          |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | Topiramatas*<br>Klonazepamas<br>Nitrazepamas<br>Etosukcimidas                            | Fenobarbitalis                                                      |
| <input type="checkbox"/> Sindromai su bioelektrine epilepsine būkle miego metu (ESES)<br>G40.8 | Etosukcimidas<br>Valproatas<br>Sultiamas<br>Klonazepamas<br>Nitrazepamas<br>Topiramatas* | Lamotriginas*<br>Karbamazepinas<br>Okskarbazepinas<br>Gabapentinas* |
| <input type="checkbox"/> Komplikuoti febriliniai traukuliai<br>G40.8                           | Valproatas<br>Fenobarbitalis<br>Klonazepamas<br>Nitrazepamas<br>Topiramatas*             | Etosukcimidas<br>Lamotriginas*                                      |

\* – vaistai skiriami nustačius gydymui atsparios epilepsijos formą arba esant kontraindikacijoms skirti kitus vaistus nuo epilepsijos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-205](#), 2005-03-25, *Žin.*, 2005, Nr. 45-1470 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-205

29. Atspari gydymui epilepsija nustatoma, jei po dviejų mėnesių gydymo dviem VNE, epilepsijos priepuoliai kartojasi.

30. Jei priepuoliai vartojant vaistus kartojasi, 2 metų laikotarpiu turi būti išbandyti visi prieinami VNE ar jų deriniai ir svarstoma dėl chirurginio gydymo.

#### IV. EPILEPSIJOS GYDYMO UŽBAIGIMAS

31. Epilepsija gydoma 2–5 metus nuo paskutiniojo priepuolio. Tai priklauso nuo ligos formos, eigos ir sunkumo.

32. Idiopatinių vaikystės epilepsijų gydymą galima užbaigti po 2 m. nuo paskutiniojo priepuolio, jei EEG pakitimų nelieta (išskyrus jaunuolių miokloninę epilepsiją, kuomet gydoma visą jaunystės laikotarpį ar visą gyvenimą).

33. Ilgiau (iki 5 m. nuo paskutiniojo priepuolio) gydomos simptominės bei kriptogeninės epilepsijos, taip pat vyresniame amžiuje prasidėjusios ligos formos ir kai priepuoliai ilgai kartojosi gydymo pradžioje.

## GLAUKOMOS (H 40-42) GYDYMO METODIKA

### I. PROBLEMA

1. Glaukoma – neurodegeneracinė liga, kuriai būdingas tinklainės ganglinių ląstelių ir jų aksonų žuvimas, regos nervo disko audinio remodeliavimas bei vidinių tinklainės sluoksnių pokyčiai. Dažniausiai šios ligos eiga yra lėtinė, besimptomė (išskyrus priepuolinės glaukomos atvejus), todėl pacientai retai kada kreipiasi į gydytojus pradinėse ligos stadijose, kuomet dar galima sustabdyti ligos progresavimą ir išsaugoti geras regėjimo funkcijas. Glaukoma yra viena dažniausių negrįžtamo aklumo priežasčių pasaulyje.

2. Glaukoma klasifikuojama pagal TLK-10.

3. Akispūdžio vertinimas:

3.1. kompensuotas akispūdis (a) < 21 mm Hg;

3.2. nekompensuotas akispūdis (b) > 21 mm Hg.

4. Glaukomos stadijos pagal A. Nesterovą – A. Buniną arba pagal J. J. Kanski.

5. Glaukomos rizikos veiksniai

| Kontroliuojami                            | Nekontroliuojami                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Akispūdis<br>Kraujagyslinė disreguliacija | Amžius<br>Lytis<br>Šeiminė anamnezė<br>Rasė<br>Refrakcija |

### II. DIAGNOSTIKA

6. Pagrindiniai diagnostikos kriterijai:

6.1. padidėjęs akispūdis, nustatomas tonometrijos būdu;

6.2. patologinė regos nervo disko ekskavacija, nustatoma oftalmoskopijos būdu;

6.3. tipiniai akipločio defektai, nustatomi perimetrijos būdu.

7. Papildomi diagnostiniai kriterijai:

7.1. šeiminė anamnezė;

7.2. amžius;

7.3. regėjimo aštrumas;

7.4. priekinės kameros kampo įvertinimas gonioskopuojant;

7.5. priekinio akies segmento pakitimai biomikroskopuojant;

7.6. sisteminės kraujotakos sutrikimai.

### III. TYRIMAI

8. Tonometrija.

9. Tonografija.

10. Oftalmoskopija.

11. Perimetrija.

12. Gonioskopija.

### IV. GLAUKOMOS PROFILAKTIKA

13. Profilaktikos priemonių, padedančių užkirsti kelią lėtinei glaukomai, nėra. Kuo anksčiau ši liga diagnozuojama (t. Y. pradinėje stadijoje), tuo geresnė ligos prognozė ir mažesnė apakimo tikimybė.

14. Uždaro kampo glaukomos priepuolio profilaktikai yra taikoma lazerinė periferinė iridektomija.

## V. VIETINIS GLAUKOMOS GYDYMAS

15. Patvirtinus diagnozę, gydymas pradedamas monoterapija  $\beta$  adrenoblokatorių lašais.

16. Jei akispūdis sumažėja iki siektino, stabilūs regos nervo ir akipločio pakitimai, nėra pašalinių reiškinių, tęsiama ilgalaikė monoterapija  $\beta$  adrenoblokatorių lašais.

17. Jei gydymas neefektyvus (t. y. akispūdis nesumažėja, nepavyksta sustabdyti tinklainės ganglinių ląstelių žuvimo), yra kontraindikacijų  $\beta$  adrenoblokatoriams, gydymas keičiamas kita monoterapija –viena iš šių grupių:

17.1. vietiniais karboanhidrazės inhibitoriais;

17.2. prostaglandinų analogais;

17.3.  $\alpha$  adrenomimetikais\* arba cholinomimetikais.

Pastaba. \*Neskiriami esant uždaro kampo glaukomai.

18. Jei gydymas  $\beta$  adrenoblokatorių lašais yra efektyvus, bet nepakankamai, t. y.:  
nepavyksta akispūdžio sumažinti iki siektino lygio;

nepavyksta stabilizuoti regos nervo disko pakitimų progresavimo;

nepavyksta stabilizuoti akipločio pakitimų progresavimo,

gydymas tęsiamas papildomais antiglaukominiais medikamentais, taikant įvairias vaistų kombinacijas, medikamentų mišinius bei derinius (skirtingų grupių):

18.1.  $\beta$  adrenoblokatorius ir vietinius karboanhidrazės inhibitorius;

18.2.  $\beta$  adrenoblokatorius ir prostaglandinų analogus;

18.3. vietinius karboanhidrazės inhibitorius ir prostaglandinų analogus;

18.4.  $\beta$  adrenoblokatorius ir cholinomimetikus (uždaro kampo glaukomai gydyti);

18.5.  $\alpha$  adrenomimetikus ir karboanhidrazės inhibitorius;

18.6.  $\alpha$  adrenomimetikus ir prostaglandinų analogus.

19. Jei kombinuotas gydymas dviem medikamentais neefektyvus, skiriamas trečias medikamentas:

19.1.  $\beta$  adrenoblokatoriai, vietiniai karboanhidrazės inhibitoriai ir prostaglandinų analogai;

19.2.  $\beta$  adrenoblokatoriai, vietiniai karboanhidrazės inhibitoriai ir cholinomimetikai;

19.3.  $\beta$  adrenoblokatoriai, vietinių karboanhidrazės inhibitoriai ir  $\alpha$  adrenomimetikai.

Pastaba. Neskiriami keli tos pačios farmakologinės grupės medikamentai.

## VI. UŽDARO KAMPO GLAUKOMOS PRIEPUOLIO KOMPLEKSINIS GYDYMAS

20. *Per os* arba *i/v* osmosiniais preparatais arba sisteminiais karboanhidrazės inhibitoriais.

21. Miotikų lašais (*Sol. Pilocarpini* 1-2%).

22.  $\beta$  adrenoblokatoriais (*Sol. Timololi maleatis* 0.5%).

23. Jei skausmas nepraeina, skiriami sisteminiai analgetikai. Jei nenustoja pykinti – sisteminiai antiemetikai.

24. Vidutinis lašų skaičius 1 ml ir vaistų poreikis

| Eil. Nr. | Vaistai                   | Vartojimo dažnis (kartai per dieną) | Lašo dydis (μl.) | Lašų skaičius |                                         |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
|          |                           |                                     |                  | 1 ml          | reikalingas gydyti abi akis vieną dieną |
| 1.       | <i>Timololio maleatas</i> | 2                                   | ~30              | 31,4          | 4                                       |

|    |                    |   |     |      |   |
|----|--------------------|---|-----|------|---|
| 2. | <i>Timoptic XE</i> | 1 | ~42 | 22,4 | 2 |
| 3. | <i>Trusopt</i>     | 3 | ~30 | 31,4 | 6 |
| 4. | <i>Azopt</i>       | 2 | ~32 | 29,6 | 4 |
| 5. | <i>Betoptic</i>    | 2 | ~32 | 29,6 | 4 |
| 6. | <i>Betoptic S</i>  | 2 | ~47 | 20   | 4 |
| 7. | <i>Xalatan</i>     | 1 | ~30 | 31   | 2 |
| 8. | <i>Cosopt</i>      | 2 | ~34 | 27,8 | 4 |

Pastaba. Atidarius buteliuką, vaistus galima vartoti ne ilgiau kaip 28 dienas.

## VII. MEDIKAMENTINIO GYDYMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

25. Pirminis monoterapijos poveikis vertinamas praėjus ne mažiau kaip 1 savaitei nuo vaisto skyrimo.

26. Jei poveikis teigiamas, gydymas tęsiamas.

27. Jei poveikis neigiamas, vaistas keičiamas kitu ir poveikis vertinamas po 3 savaitių.

28. Jei poveikis neaiškus, papildomai skiriamas kitos grupės vaistas ir derinio efektyvumas vertinamas ne anksčiau kaip po 1 savaitės.

## VIII. GYDYMO EFEKTYVUMO VERTINIMO KRITERIJAI

29. Gyvenimo kokybė.

30. Stabilus akiplotis.

31. Stabilūs regos nervo disko pakitimai.

32. Stabilus „tikslinis“ akispūdis.

## IX. BPG IR OFTALMOLOGŲ DARBO ALGORITMAI

33. BPG tikrina visų besikreipiančių 19–40 metų asmenų akispūdį ir akių dugną 1 kartą per 2 metus, vyresnių kaip 40 metų amžiaus pacientų akispūdį ir akių dugną – 1 kartą per metus.

33.1. Esant glaukomos anamnezei šeimoje, akispūdis ir akių dugnas tiriami pirmojo apsilankymo metu nepriklausomai nuo amžiaus.

33.2. Įtarus pataloginį akispūdį ir/ar pakitimų regos nervo diske, pacientas siunčiamas pas gydytoją oftalmologą.

34. Diagnozę nustato ir medikamentinį gydymą skiria bei stebi jo eigą iki proceso kompensacijos gydytojas oftalmologas.

35. Paciento stebėjimas iki glaukominio proceso kompensacijos

|                           | Tonometrija              | Stebėjimas                                       |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Pradėjus gydymą           | Ne mažiau kaip po 1 sav. | Ne dažniau kaip kas 2 savaitės iki kompensacijos |
| Keičiant monoterapiją     | Po 3 sav.                | Ne dažniau kaip kas 2 savaitės iki kompensacijos |
| Skiriant papildomą vaistą | Po 2 sav.                | Ne dažniau kaip kas 2 savaitės iki kompensacijos |

36. Paciento tolesnis stebėjimas

| Glaukomos progresavimo rizika ** | Tonometrija | Oftalmoskopija | Perimetrija |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Žema                             | Kas 3 mėn.  | Kas 3 mėn.     | Kas 6 mėn.  |
| Vidutinė                         | Kas 2 mėn.  | Kas 2 mėn.     | Kas 4 mėn.  |
| Didelė                           | Kas 1 mėn.  | Kas 1 mėn.     | Kas 3 mėn.  |

\*\*Glaukomos progresavimo rizika tuo didesnė, kuomet:

aukštesnis pradinis akispūdis;

pirminės apžiūros metu labiau pažeistas regos nervas;

pirminės apžiūros metu nustatoma didesnių pakitimų akiplotyje;

didesnė gyvenimo trukmės tikimybė.

Jeigu ligos eiga stabili, vaistus išrašo BPG, jei ne – konsultuoja gydytojas oftalmologas.

37. Nesustabdžius ligos progresavimo vaistais, rekomenduojamas lazerinis arba chirurginis gydymas.

---

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro  
2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr.  
V-348

**ARTERINĖS HIPERTENZIJOS, HIPERTENZINĖS ŠIRDIES IR INKSTŲ LIGOS (TLK-10  
KODAI I 10–I 13, I 15) DIAGNOSTIKOS BEI AMBULATORINIO GYDYMO,  
KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
LĖŠŲ, METODIKA**

**I. DIAGNOSTIKOS KRITERIJAI**

1. Arterinės hipertenzijos diagnozė – tai ne vien arterinio kraujospūdžio padidėjimas, bet sindromas, susidedantis iš:

- 1.1. padidėjusio arterinio kraujo spaudimo (toliau – AKS);
- 1.2. hipertenzinės kardiopatijos (hipertenzinės širdies ligos);
- 1.3. hipertenzinės nefropatijos (hipertenzinės inkstų ligos);
- 1.4. hipertenzinės arteriopatijos (hipertenzinės arterijų ligos);
- 1.5. hipertenzinės smegenų ligos (praeinančio smegenų išemijos priepuolio; insulto; ūminės hipertenzinės encefalopatijos ir/arba lėtinės smegenų išemijos);
- 1.6. hipertenzinio-metabolinio sindromo ar atskirų kardiovaskulinių rizikos veiksnių.

**Pastaba.** Formuluoiant arterinės hipertenzijos diagnozę, joje privalo atsispindėti AKS padidėjimo laipsnis, visos nustatytos arterinės hipertenzijos sindromo sudedamos dalys ir rizikos grupė.

**II. PADIDĖJĘS ARTERINIS KRAUJO SPAUDIMAS**

2. AKS padidėjimas vertinamas laipsniais pagal kraujospūdžio dydį (1 lentelė).

*1 lentelė. Arterinio kraujospūdžio lygių klasifikacija (Jungtinis nacionalinis komitetas JNC 7, 2003)*

| Kategorija                        | Sistolinis AKS (mm Hg) | Diastolinis AKS (mm Hg) |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Normalus                          | <120                   | <80                     |
| Aukštas normalus                  | 120–139                | 80–89                   |
| I laipsnio padidėjimas            | 140–159                | 90–99                   |
| II laipsnio padidėjimas           | ≥160                   | ≥100                    |
| Izoliuota sistolinė hipertenzija* | ≥140                   | <90                     |

\* kai pulsinis spaudimas >50 mm Hg

**Pastabos:**

- AKS klasifikuojamas prieš paskiriant gydymą.
- Kai ligonio sistolinis ir diastolinis kraujospūdis patenka į skirtingas kategorijas, taikyti aukštesniąją.
- AKS padidėjimo laipsnis dinamikoje diagnozėje gali būti keičiamas:
  - jei AKS padidėjimas progresuoja, ekskludavus laikiną ligos paūmėjimą, laipsnis keičiamas iš mažesnio į didesnį;
  - jei skiriant vaistus AKS sumažėja, laipsnis nekeičiamas.

### III. ARTERINĖS HIPERTENZIJOS KOMPLIKACIJŲ RIZIKOS VEIKSNIAI

3. Antro tipo cukrinis diabetas, gliukozės tolerancijos sutrikimas arba rezistencija insulinui.
4. Dislipidemija: bendras cholesterolis  $> 5$  mmol/l, mažo tankio lipoproteinų (toliau – MTL)-cholesterolis  $> 3$  mmol/l, ir/arba trigliceridai  $> 1,7$  mmol/l, ir/arba didelio tankio lipoproteinų (toliau – DTL)-cholesterolis  $< 1$  mmol/l.
5. Pilvinio (visceralinio) tipo nutukimas.
6. Mikroalbuminurija.
7. Rūkymas.
8. Nepakankamas fizinis aktyvumas.
9. Teigiama širdies ir kraujagyslių ligos ar ankstyvos mirties šeimos anamnezė.

**Pastaba.** Šiuo metu didžiulis dėmesys kreipiamas į hipertenzijos ir metabolinio sindromo derinį, jungiantį keletą (Nr. 3–6) rizikos veiksnių ir ženkliai padidinantį kardiovaskulinę riziką.

### IV. ARTERINĖS HIPERTENZIJOS SĄLYGOJAMAS „ORGANŲ–TAIKINIŲ“ PAŽEIDIMAS

10. **Širdyje:** kairiojo skilvelio hipertrofija; miokardo išemijos klinikinės išraiškos (žr. 22.1.3); progresuojanti koronarinė širdies liga; sistolinis, diastolinis ar mišrus širdies nepakankamumas; kairiojo prieširdžio didėjimas; širdies ritmo sutrikimai.
11. **Inkstuose:** kamuolėlių ir/arba stromos sklerozė; inkstų arterijų liga; lėtinis inkstų nepakankamumas.
12. **Arterijose:** endotelio disfunkcija; arterijų sienelės standumo padidėjimas; miego ir/arba šlaunies arterijos intimos-medijos sustorėjimas, plokštelės arba stenozės; hipertenzinė angiotenopatija ir jos komplikacijos – tinklainės venų trombozė arba tinklainės arterijų embolija, okliuzija; aortos aneurizma arba sluoksniuojanti aortos aneurizma.
13. **Smegenyse:** smegenų kraujosrūva; smegenų infarktas; praeinantis smegenų išemijos priepuolis; kraujagyslinė demencija; lėtinė smegenų išemija.

### V. ARTERINĘ HIPERTENZIJĄ LYDINČIOS KLINIKINĖS BŪKLĖS, APSUNKINANČIOS JOS EIGĄ IR GYDYMĄ

14. **Širdies ir kraujagyslių:** koronarinė širdies liga; sklerodegeneraciniai vožtuvų pakenkimai; smegenų arterijų aterosklerozė; periferinių arterijų liga.
  15. **Cukrinis diabetas.**
  16. **Kitos (ne hipertenzinė nefropatija) inkstų ligos,** pasireiškiančios proteinurija ir/arba lydimos inkstų funkcijos nepakankamumo.
  17. **Plaučių ligos,** lydimos bronchų obstrukcijos.
  18. **Sąnarių ligos,** kuomet taikomi nesteroidiniai priešuždegiminiai medikamentai.
- Pastaba.** Lydinčios plaučių ir sąnarių ligos apsunkina arterinės hipertenzijos (toliau – AH) gydymą.

### VI. ARTERINĘ HIPERTENZIJĄ SERGANČIOJO RIZIKOS NUSTATYMAS PRIEŠ PASIRENKANT GYDYMĄ

19. **Mažos ir vidutinės rizikos grupės:** aukštas-normalus arba pirmo laipsnio AKS padidėjimas kartu su 1–3 rizikos veiksniais (išskyrus rezistenciją insulinui ir/ar diabetą).
20. **Didelės ir labai didelės rizikos grupės:**
  - 20.1. vien antro laipsnio AKS padidėjimas arba
  - 20.2. pirmo arba antro laipsnio AKS padidėjimas ir  $\square \geq 3$  rizikos veiksniai (užtenka vien rezistencijos insulinui, gliukozės netoleravimo arba diabeto) ir/arba arterinės hipertenzijos

sąlygojami „organų–taikinių“ pažeidimai ir/arba lydinčios klinikinės būklės, sunkinančios AH eigą ar komplikuojančios AH gydymą.

## VII. ARTERINĖS HIPERTENZIJOS TLK-10 KODAI

21. **Pirminė hipertenzija (I 10).** Koduojama nesant organų–taikinių pažeidimo.

22. **Hipertenzinė (širdies liga) [kardiopatija] (I 11)** (toliau – hipertenzinė kardiopatija).

22.1. **Hipertenzinė (širdies liga) [kardiopatija] be (stazinio) širdies [kraujotakos] nepakankamumo (I 11.9)** (toliau – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo). Diagnozė nustatoma radus padidėjusį AKS ir vieną šių požymių:

22.1.1. kairiojo skilvelio hipertrofija: masės indeksas vyrams  $> 116 \text{ g/m}^2$ , moterims  $> 104 \text{ g/m}^2$ ; echokardiografiniai ar elektrokardiografiniai kairiojo skilvelio hipertrofijos požymiai;

22.1.2. besimptomė sistolinė (išstūmimo frakcija  $< 40$ ), diastolinė (E/A santykis  $< 1$  – E – angl. early [ankstyvas] ir A – angl. atrial [prieširdinis] prisipildymai) ar mišri kairiojo skilvelio disfunkcija, kai yra koncentrinė kairiojo skilvelio hipertrofija;

22.1.3. angiospastinė (I.20.1), mikrovaskulinė krūtinės angina (I.20.9) ar išeminis krūtinės skausmas (I.20.8);

22.1.4. širdies ritmo ir laidumo sutrikimai (I 44–I 49).

22.2. **Hipertenzinė (širdies liga) [kardiopatija] (I 11.0)** (toliau – hipertenzinė kardiopatija su širdies nepakankamumu). Diagnozė nustatoma radus padidėjusį AKS ir vieną šių požymių:

22.2.1. kairiojo skilvelio hipertrofija;

22.2.2. kairiojo skilvelio dilatacija, kai yra ekcentrinė kairiojo skilvelio hipertrofija;

22.2.3. mitralinio vožtuvo nesandarumas ir/ar kairiojo prieširdžio padidėjimas;

22.2.4. sistolinis, diastolinis ar mišrus širdies nepakankamumas.

23. **Hipertenzinė (inkstų liga) [nefropatija] (I 12)** (toliau – hipertenzinė nefropatija):

23.1. **Hipertenzinė inkstų liga [nefropatija] be inkstų veiklos nepakankamumo (I.12.9)** (toliau – hipertenzinė nefropatija be inkstų nepakankamumo). Nustatoma radus padidėjusį AKS ir šiuos požymius (visi trys būtini):

23.1.1. mikroalbuminurija, arba proteinurija;

23.1.2. nėra kitų inkstų ligų;

23.1.3. kreatininas vyrams  $< 110 \text{ } \mu\text{mol/l}$ , moterims  $< 90 \text{ } \mu\text{mol/l}$  ir/arba šlapalas  $< 8,3 \text{ mmol/l}$ , arba glomerulų filtracijos greitis  $\geq 80 \text{ ml/min}$ .

23.2. **Hipertenzinė (inkstų liga) [nefropatija] su inkstų (veiklos) nepakankamumu (I.12.0)** (toliau – hipertenzinė nefropatija su inkstų nepakankamumu). Nustatoma radus šiuos požymius (visi trys būtini):

23.2.1. mikroalbuminurija, arba proteinurija;

23.2.2. nėra kitų inkstų ligų;

23.2.3. kreatininas vyrams  $\geq 110 \text{ } \mu\text{mol/l}$ , moterims  $\geq 90 \text{ } \mu\text{mol/l}$  ir/ar šlapalas  $\geq 8,3 \text{ mmol/l}$ , arba glomerulų filtracijos greitis  $< 80 \text{ ml/min}$ .

24. **Antrinė hipertenzija (I 15):**

24.1. I 15.0, I 15.1, I 15.2, I 15.8 koduojama atitinkamų sričių specialistams nustačius pagrindinę diagnozę.

24.2. Antrinės hipertenzijos, nepatikslintos (I 15.9).

25. **Arterinės hipertenzijos ligos, kurių tiesiogiai neatspindi kodai (I 10, I 11, I 12, I 15):**

25.1. hipertenzinė arteriopatija (atitinkmuo I 70, I 71, I 67);

25.2. hipertenzinė encefalopatija (I 67.4);

25.3. hipertenzija ir metabolinis sindromas pasirinkti iš kodų: E90<sup>4</sup>, E12, E.66.9, E 78.

25.4. smegenų išemija (lėtinė) (I 67.8).

## VIII. ARTERINĖS HIPERTENZIJOS GYDYMAS

26. Įvertinus rizikos dydį, nusprendžiama, kada pradėti medikamentinį arterinės hipertenzijos gydymą, iki kiek mažinti kraujo spaudimą, kaip greitai turėtų būti pasiekiamas numatytas tikslinis kraujospūdis. Esant vidutinei rizikai, koreguojami rizikos veiksniai, prieš skiriant vaistus, pacientai 2–3 savaites stebimi, bet esant reikalui, vaistai skiriami iš karto, nustačius diagnozę. Didelės ir labai didelės rizikos pacientams taip pat koreguojami rizikos veiksniai ir vaistai skiriami iš karto, nustačius diagnozę.

### 27. Tikslinis kraujospūdis, gydant arterinę hipertenziją:

27.1. Esant mažai ir vidutinei rizikai, tikslinis kraujospūdis <140/90 mm Hg.

27.2. Esant didelei ir labai didelei rizikai, tikslinis kraujospūdis 130/85–125/75 mm Hg.

## IX. BENDRIEJI ARTERINĖS HIPERTENZIJOS GYDYMO PRINCIPAI

28. Esant mažai ir vidutinei rizikai AH gali būti gydoma vienu vaistu (1 schema), pasirenkant kurią nors iš išvardytų priešhipertenzinių vaistų klasių.

29. Esant didelei ir labai didelei rizikai, gydymas pradedamas iškart nuo dviejų priešhipertenzinių vaistų mažesnių dozių derinio (1 schema).


30. Pradedant gydymą, bet kurį priešhipertenzinį vaistą skirti nedidelėmis dozėmis, stengiantis išvengti vaistų šalutinio poveikio.

31. Nepasiekus tikslinio kraujospūdžio pradiniam gydymo etape, vaistų dozės didinamos iki vidutinių terapinių dozių (3 lentelė). Atsparios hipertenzijos gydymui skiriamos maksimalios vaistų dozės.

32. Monoterapija, nesant reikiamo efekto, neturi trukti ilgai (iki 3 mėn.).

33. Gydymas dviejų ar trijų priešhipertenzinių vaistų deriniais taikomas apie 70 proc. sergančiųjų arterine hipertenzija. Vaistų deriniai parenkami individualiai. Prireikus daugiau nei trijų vaistų nuo hipertenzijos, bendrosios praktikos ar vidaus ligų gydytojas siunčia gydytojo specialisto konsultacijai (kardiologo, nefrologo ar kt.), po kurios jis gali išrašyti tris ar daugiau vaistus nuo hipertenzijos ne ilgiau 1 metų. Toliau siunčiama pakartotinai gydytojo specialisto konsultacijai.

1 schema. Arterinės hipertenzijos gydymo etapai



#### Pastabos:

\* Kūno svoris laikomas normaliu, kai kūno masės indeksas [svoris (kg) : ūgis (m)<sup>2</sup>] būna kiek mažesnis arba lygus 25.

\*\* Suvartoti per dieną ne daugiau kaip 6 g druskos (2,4 g arba 100 mmol natrio)

\*\*\*Kalio kiekį dietoje padidinti iki 90 mmol/d.

\*\*\*\* Iki 20–30 g etanolio ar jo ekvivalentų (300 ml vyno ar 700 ml alaus) per dieną (moterims ar mažo svorio vyrams – ne daugiau kaip 15 ml etanolio ar jo ekvivalentų).

\*\*\*\*\* Nepertraukiama fizinė veikla, trunkanti 30–45 min. kasdien.

\*\*\*\*\* Bendro cholesterolio siekti < 5,0 mmol/l, mažo tankio lipoproteinų < 3,0 mmol/l, trigliceridų < 1,7 mmol/l.

3 lentelė. *Įprastinės priešhipertenzinių vaistų paros dozės*

| Eil. Nr. | VAISTAS                             | PAROS DOZĖS (mg) |
|----------|-------------------------------------|------------------|
| 1.       | Amlodipinas                         | 2,5–10           |
| 2.       | Atenololis                          | 12,5–150         |
| 3.       | Betaksololis                        | 5–20             |
| 4.       | Diltiazemas                         | 90–360           |
| 5.       | Diltiazemas (modifikuoto poveikio)  | 90–240           |
| 6.       | Doksazosinas (modifikuoto poveikio) | 1–8              |
| 7.       | Enalaprilis                         | 2,5–40           |
| 8.       | Felodipinas                         | 2,5–5            |
| 9.       | Fosinoprilis                        | 10–40            |
| 10.      | Hidrochlorotiazidas                 | 12,5–25          |
| 11.      | Indapamidas                         | 1,25–2,5         |
| 12.      | Kaptoprilis                         | 12,5–150         |
| 13.      | Klonidinas                          | 0,3–0,6          |
| 14.      | Kvinaprilis                         | 2,5–40           |
| 15.      | Labetololis                         | 200–1200         |
| 16.      | Lacidipinas                         | 2–6              |
| 17.      | Lerkanidipinas                      | 10–20            |
| 18.      | Lisinoprilis                        | 2,5–40           |
| 19.      | Metoprololis                        | 50–200           |
| 20.      | Metoprololis (modifikuoto poveikio) | 25–200           |
| 21.      | Metildopa                           | 500–2000         |
| 22.      | Moksonidinas                        | 0,2–0,4          |
| 23.      | Nebivololis                         | 2,5–10           |
| 24.      | Nifedipinas (modifikuoto poveikio)  | 40–60            |
| 25.      | Nitrendipinas                       | 10–40            |
| 26.      | Prazosinas                          | 1,0–8            |
| 27.      | Perindoprilis                       | 4–8              |
| 28.      | Spironolaktonas                     | 12,5–50          |
| 29.      | Ramiprilis                          | 1,25–10          |
| 30.      | Spiraprilis                         | 3–6              |
| 31.      | Trandolaprilis                      | 0,5–2            |
| 32.      | Verapamilis (modifikuoto poveikio)  | 120–240          |

**Pastaba.** Atsparios gydymui hipertenzijos atvejais gali būti skiriamos maksimalios dozės.

#### **X. PRIEŠHIPERTENZINIAI VAISTAI, KOMPENSUOJAMI IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO**

34. Remiantis šiuo metu kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo medikamentų sąrašu, priešhipertenziniai vaistai suskirstyti į pirmąjį ir antrąjį sąrašus.

35. **Pirmasis vaistų sąrašas** – tai kompensuojami vaistai pradinei arterinio kraujo spaudimo korekcijai, iki bus atlikti tyrimai ir nustatytos klinikinės būklės, būtinos antrojo sąrašo preparatams skirti.

35.1. **Kalcio kanalų blokatorių (toliau – KKB) grupėje:**

35.1.1. Diltiazemas

35.1.2. Nifedipinas (modifikuoto poveikio)

35.2. **AKF inhibitorių (toliau – AKFI) grupėje:**

35.2.1. Enalaprilis

#### 35.2.2. Kaptoprilis

**Pastaba.** AKF inhibitoriai neskiriami esant abipusei inkstų arterijos stenozei.

#### 35.3. Betaadrenoblokatorių (toliau – BAB) grupėje:

##### 35.3.1. Atenololis

##### 35.3.2. Metoprololis

#### 35.4. Kiti:

##### 35.4.1. Hidrochlortiazidas

##### 35.4.2. Klonidinas

##### 35.4.3. Prazosinas

#### 35.5. Fiksuoti deriniai:

##### 35.5.1. Enalaprilis ir hidrochlortiazidas

36. **Antrasis vaistų sąrašas** – tai vaistai, skiriami ilgalaikiam arterinės hipertenzijos gydymui būtinais tyrimais patvirtinus bent vieną klinikinę būklę šio sąrašo vaistui skirti. Sąrašas sudarytas remiantis klinikinių studijų patvirtintomis klinikinėmis būklėmis ir kai yra arterinės hipertenzijos komplikacijos („organų-taikinių“ pažeidimas) ir/arba lydinčios klinikinės būklės ir/arba rizikos veiksniai.

#### 36.1. KKB grupėje:

36.1.1. **Amlodipinas** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo (išimtis – lengvas širdies nepakankamumas NYHA I–II f. kl.); lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija); hipertenzinė arteriopatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.1.2. **Diltiazemas (modifikuoto poveikio)** – hipertenzinė kardiopatija (tachisistoliniai ritmo sutrikimai); lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija); hipertenzinė nefropatija.

36.1.3. **Felodipinas** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo (išimtis – lengvas širdies nepakankamumas NYHA I–II f. kl.); lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija); hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas; vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.1.4. **Lacidipinas** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija); hipertenzinė arteriopatija; hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); kai yra lėtinė smegenų išemija; vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.1.5. **Lerkanidipinas** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; hipertenzinė arteriopatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.1.6. **Nitrendipinas** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.1.7. **Verapamilis (modifikuoto poveikio)** – hipertenzinė kardiopatija (tachisistoliniai ritmo sutrikimai); lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija); hipertenzinė nefropatija.

#### 36.2. AKFI grupėje:

36.2.1. **Fosinoprilis** – hipertenzinė kardiopatija be arba su širdies nepakankamumu; hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.2.2. **Kvinaprilis** – hipertenzinė kardiopatija be arba su širdies nepakankamumu; lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija ir/arba persirgta miokardo infarktas ir/arba po kateterinio/chirurginio gydymo); hipertenzinė arteriopatija; hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.2.3. **Lisinoprilis** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas.

36.2.4. **Perindoprilis** – hipertenzinė kardiopatija be arba su širdies nepakankamumu; lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija ir/arba persirgtas miokardo infarktas ir/arba po kateterinio/chirurginio gydymo); po persirgto insulto ir/arba praeinančio smegenų išemijos priepuolio (PSIP); hipertenzinė arteriopatija; hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.2.5. **Ramiprilis** – hipertenzinė kardiopatija be arba su širdies nepakankamumu; lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija ir/arba persirgtas miokardo infarktas ir/arba po kateterinio/chirurginio gydymo); hipertenzinė arteriopatija; hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.2.6. **Spiraprilis** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas.

36.2.7. **Trandolaprilis** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; lydinti koronarinė širdies liga (persirgtas miokardo infarktas); hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas).

**Pastaba.** AKF inhibitoriai neskiriami esant abipusei inkstų arterijos stenozai.

### 36.3. BAB grupėje:

36.3.1. **Betaksololis** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba nebyli miokardo išemija).

36.3.2. **Metoprololis (modifikuoto poveikio)** – hipertenzinė kardiopatija be arba su širdies nepakankamumu; lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija ir/arba persirgtas miokardo infarktas ir/arba po kateterinio/chirurginio gydymo); lydinčios tachiaritmijos; lydintis cukrinis diabetas; hipertenzinė arteriopatija.

36.3.3. **Nebivololis** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija); kai reikia skirti BAB ir yra lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas).

**Pastaba.** Vaistą saugu vartoti, esant lydinčiai periferinių arterijų ligai.

### 36.4. Kiti:

36.4.1. **Doksazosinas (modifikuoto poveikio)** – AH, lydima gėrybinės prostatos hiperplazijos; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas).

**Pastaba.** Neskirti, esant III–IV NYHA funkcinės klasės širdies nepakankamumui.

36.4.2. **Indapamidas** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; hipertenzinė nefropatija.

36.4.3. **Indapamidas (modifikuoto poveikio)** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; hipertenzinė nefropatija; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

36.4.4. **Klonidinas** – AH gydymui trečiame nėštumo trimestre.

36.4.5. **Labetalolis, metildopa** – arterinė hipertenzija ir nėštumas (skiriant labetalolį pirmuosius tris nėštumo mėnesius įvertinti naudos ir rizikos santykį).

36.4.6. **Rilmenidinas, Moksonidinas** – hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo; lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas); vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija ( $\geq 65$  metų).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-716](#), 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 119-5452 (2003-12-18), i. k. 1032250ISAK000V-716

36.4.7. **Spirolaktonas** – AH su širdies nepakankamumu gydymui.

## XI. ANTROJO SĄRAŠO VAISTŲ SKYRIMAS PAGAL KLINIKINES BŪKLES

### 37. Hipertenzinė kardiopatija be širdies nepakankamumo:

- AKF inhibitorių grupėje: fosinoprilis; kvinaprilis; lisinoprilis; perindoprilis; ramiprilis; spiraprilis; trandolaprilis;

- KKB grupėje: amlodipinas; felodipinas; lacidipinas; lerkandipinas; nitrendipinas;
- BAB grupėje: betaksololis; metoprololis (modifikuoto poveikio); nebivololis;
- kitų vaistų grupėje: indapamidas; indapamidas (modifikuoto poveikio); moksonidinas.

### **38. Hipertenzinė kardiopatija su širdies nepakankamumu:**

- AKF inhibitorių grupėje: fosinoprilis; kvinaprilis; perindoprilis; ramiprilis;
- BAB grupėje: metoprololis (modifikuoto poveikio);
- KKB grupėje: amlodipinas ir felodipinas skiriami tik esant lengvam širdies nepakankamumui I–II NYHA f. kl.

### **39. Hipertenzinė kardiopatija (tachisistoliniai ritmo sutrikimai):**

- KKB grupėje: diltiazemas (modifikuoto poveikio); verapamilis (modifikuoto poveikio);
- BAB grupėje: metoprololis (modifikuoto poveikio).

### **40. Lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija):**

- KKB grupėje: amlodipinas; diltiazemas (modifikuoto poveikio); felodipinas; lacidipinas; verapamilis (modifikuoto poveikio);
- BAB grupėje: betaksololis; nebivololis.

### **41. Lydinti koronarinė širdies liga (krūtinės angina ir/arba miokardo išemija ir/arba persirgta miokardo infarktas ir/arba po kateterinio/chirurginio gydymo):**

- AKF inhibitorių grupėje: kvinaprilis; perindoprilis; ramiprilis;
- BAB grupėje: metoprololis (modifikuoto poveikio).

### **42. Lydinti koronarinė širdies liga (persirgta miokardo infarktas):**

- AKF inhibitorių grupėje: trandolaprilis.

### **43. Po persirgto insulto arba praeinančio smegenų išemijos priepuolio:**

- AKF inhibitorių grupėje: perindoprilis.

### **44. Lėtinė smegenų išemija:**

- KKB grupėje: lacidipinas.

### **45. Hipertenzinė arteriopatija:**

- KKB grupėje: amlodipinas; lacidipinas; lerkandipinas;
- AKF inhibitorių grupėje: kvinaprilis; perindoprilis; ramiprilis;
- BAB grupėje: nebivololis; metoprololis (modifikuoto poveikio).

### **46. Hipertenzinė nefropatija:**

- KKB grupėje: diltiazemas (modifikuoto poveikio); felodipinas; lacidipinas; verapamilis (modifikuoto poveikio);
- AKF inhibitorių grupėje: fosinoprilis; kvinaprilis; lisinoprilis; perindoprilis; ramiprilis; spiraprilis; trandolaprilis;

- kitų vaistų grupėje: indapamidas; indapamidas (modifikuoto poveikio).

### **47. Lydintis cukrinis diabetas (ir/arba metabolinis sindromas):**

- KKB grupėje: amlodipinas; felodipinas; lacidipinas; lerkandipinas;
- AKF inhibitorių grupėje: fosinoprilis; kvinaprilis; lisinoprilis; perindoprilis; ramiprilis; spiraprilis; trandolaprilis;
- BAB grupėje: nebivololis; metoprololis (modifikuoto poveikio);
- kitų vaistų grupėje: doksazosinas (modifikuoto poveikio); moksonidinas; indapamidas (modifikuoto poveikio).

### **48. Lydintis cukrinis diabetas:**

- KKB: felodipinas.

### **49. Vyresnio amžiaus žmonių hipertenzija (≥ 65 metų):**

- KKB grupėje: amlodipinas; felodipinas; lacidipinas; lerkandipinas; nitrendipinas;
- AKF inhibitorių grupėje: fosinoprilis; kvinaprilis; perindoprilis; ramiprilis;
- kitų vaistų grupėje: indapamidas (modifikuoto poveikio); moksonidinas.

### **50. Arterinė hipertenzija ir nėštumas:**

- kitų vaistų grupėje: klonidinas tik trečiame nėštumo trimestre; labetalolis (skiriant pirmuosius tris nėštumo mėnesius įvertinti naudos ir rizikos santykį); metildopa.

### **51. Arterinė hipertenzija, lydimą gėrybinės prostatos hiperplazijos:**

- kitų vaistų grupėje: doksazosinas (modifikuoto poveikio).

52. Skiriant vaistą iš antrojo vaistų sąrašo, būtina tyrimais patvirtinti bent vieną klinikinę būklę (tyrimų apimtis įvairių lygių gydymo įstaigose gali skirtis):

### 52.1. Hipertenzinė kardiopatija:

- kairiojo skilvelio hipertrofija, nustatyta EKG ir/arba echokardiografiškai;
- kairiojo skilvelio disfunkcija arba širdies nepakankamumas, patvirtinamas NYHA funkcinė klase ir/arba echokardiografiškai;
- miokardo išemija, patvirtinta EKG ir/arba ambulatorinio EKG monitoravimo metu;
- koronarinė širdies liga, patvirtinta EKG ir/arba krūvio EKG ir/arba echokardiografiškai ir/arba koronarografijos metu;
- kairiojo prieširdžio padidėjimas, nustatytas EKG ir/arba echokardiografiškai;
- aritmijos, nustatytos EKG ir/arba krūvio EKG ir/arba ambulatorinio EKG monitoravimo ir/arba stemplinio arba intrakardinio elektrofiziologinio tyrimo metu.

### 52.2. Hipertenzinė arteriopatija:

- endotelio disfunkcija, nustatyta ultragarsiniu žasto arterijos tyrimu;
- arterijų sienelės standumo padidėjimas, nustatytas pulsinės bangos greičio padidėjimu ar kitais arterijų standumo indeksais;
- miego ar šlaunies arterijos intimos-medijos sustorėjimas, arterijų plokštelės ar stenozės, nustatytos ultragarsiniu tyrimu;
- hipertenzinė angioretinopatija ir/arba jos komplikacijos – tinklainės venų trombozė ar tinklainės arterijų embolija, okliuzija, nustatytos oftalmoskopijos metu;
- periferinių arterijų liga, nustatyta kliniškai ir/arba matuojant žasto-kulkšnelių spaudimų indeksą ir/arba ultragarsinio ar angiografinio tyrimo metu;
- aortos aneurizma ar sluoksniuojanti aortos aneurizma, nustatyta rentgenologinio, ultragarsinio, kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso tyrimais.

### 52.3. Hipertenzinė nefropatija:

- kreatinino ir/arba glomerulų filtracijos greičio, nustatyto pagal Cockroft-Gault formulę, pakitimai;
- mikroalbuminurijos ir/arba baltymo šlapime ir/arba glomerulų filtracijos greičio pakitimai, tiriant šlapimą.

### Pastabos:

1. Mikroalbuminurija gali būti nustatoma vienu iš šių trijų metodų (visi trys metodai lygiaverčiai):

- nefelometriniu būdu ar kitais imunocheminiais metodais: paros šlapime (mikroalbuminurija konstatuojama, kai su šlapimu išsiskiria 30–300 mg albumino per 24 val.), arba
- nefelometriniu būdu ar kitais imunocheminiais metodais vienkartiname rytiniame šlapime nustatant albumino ir kreatinino kiekį ir jų santykį (albumino/kreatinino santykis vyrams 2,5–25 mg/mmol, moterims 3,5–35 mg/mmol rodo, kad yra mikroalbuminurija), arba
- pusiau kiekybiniais metodais (mėginio juostelėmis). Mikroalbuminurija konstatuojama pagal mėginio juostelių spalvos pokyčius.

2. Glomerulų filtracijos greitis (GFG) skaičiuojamas pagal Cockroft-Gault formulę (kur,  $S_K$  – kreatinino koncentracija serume):

### Cockroft-Gault formulė:

$$GFG_{moterims} (ml / min) = \frac{(140 - amžiaus) \times svoris (kg)}{S_K (\mu mol / l) \times 0,814} \times 0,85$$

$$GFG_{vyrams} (ml / min) = \frac{(140 - amžiaus) \times svoris (kg)}{S_K (\mu mol / l) \times 0,814}$$

3. Inkstų veiklos nepakankamumas konstatuojamas, kai kreatininas vyrams  $\geq 110 \mu\text{mol/l}$ , moterims  $\geq 90 \mu\text{mol/l}$  ir/arba šlapalas  $\geq 8,3 \text{ mmol/L}$ , arba pagal Cockcroft-Gault formulę apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis  $< 80 \text{ ml/min}$ .

4. Nesant podagros, inkstų pažeidimui būdinga hiperurikemija: vyrams  $> 520 \mu\text{mol/l}$ , moterims  $> 410 \mu\text{mol/l}$ .

**52.4. Hipertenzija ir metabolinis sindromas (būtina sąlyga: rezistencijos insulinui ir/arba gliukozės netoleravimas ir/arba antro tipo cukrinio diabetas plius trys iš keturių išvardytų komponentų):**

52.4.1. pilvinis nutukimas:

- juosmens apimtis vyrams  $> 102 \text{ cm}$  ir moterims  $> 88 \text{ cm}$ , kai kūno masės indeksas (KMI)  $> 25$  ir  $< 30$  arba

- $\text{KMI} \geq 30$ ;

52.4.2. hipercholesterolemija:

- bendras cholesterolis  $> 5 \text{ mmol/L}$  ir/ar

- MTL – cholesterolis  $> 3 \text{ mmol/L}$ ;

52.4.3. hipertrigliceridemija: trigliceridai  $> 1,7 \text{ mmol/L}$ ;

52.4.4. DTL-cholesterolio sumažėjimas  $< 1 \text{ mmol/L}$ .

## **XII. PIRMINĖS ARTERINĖS HIPERTENZIJOS DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS IKI NĖSTUMO, NĖSTUMO METU IR LAKTACIJOS PERIODE**

**53. Diagnostiniai kriterijai.** (Pasaulio sveikatos organizacija, 2000 m.) Nėštumo metu AH diagnozuojama:

53.1. pagal absoliutų AKS dydį ( $140/90 \text{ mm Hg}$  ar daugiau) arba

53.2. pagal reliatyvų jo padidėjimą, lyginant su ikinėštuminiu laikotarpiu (t. y. sistolinio AKS padidėjimas  $\geq 25\%$  ir/ar diastolinio AKS padidėjimas  $\geq 15\%$ ).

**54. Rizikos laipsniai nėštumo metu** (Europos kardiologų draugija, 2003):

54.1. Maža rizika: AKS  $140\text{--}160/90\text{--}110$ , normalūs medicininio tyrimo duomenys, normalūs EKG ir EchoKG duomenys, nėra proteinurijos.

54.2. Didelė rizika: II AKS padidėjimas, vidaus organų (širdies ar/ir inkstų) pažeidimo požymiai, apsunkinta akušerinė anamnezė, lydinčios jungiamojo audinio ar inkstų ligos, cukraligė.

**Pastaba.** Paprastai AKS matuojamas moteriai sėdint. Antroje nėštumo pusėje AKS matuojamas nėsčiajai gulint ant šono, pakėlus galvūgalį  $15\text{--}30^\circ$ .

**55. Stebėjimas ir gydymas iki nėštumo.** Reikia atminti, kad nėštumo metu, kai yra I laipsnio AKS padidėjimas, AH gali progresuoti iki didelės ir sukelti sunkias komplikacijas, tarp jų ir eklampsiją. Planuojant nėštumą, rekomenduojama įvertinti rizikos veiksnius, akcentuoti nemedikamentinio gydymo svarbą ir peržiūrėti AKS mažinančių vaistų skyrimą: neskirti AKF inhibitorių, AT1 receptorių blokatorių, diuretikų ir kalcio kanalų blokatorių.

**56. Stebėjimas ir gydymas nėštumo metu.** Dažnai matuoti AKS (pirmus du nėštumo trimestrus – bent kartą per mėnesį, trečią trimestrą – vieną ar du kartus per savaitę) ir koreguoti hipertenziją. Nėštumo metu, sunormalizavus AKS, sergančiųjų nei trumpalaikė nei ilgalaikė prognozė nepablogėja.

| <b>Nemedikamentinio gydymo ypatumai:</b>                                                                                                                                                      | <b>Medikamentinis gydymas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tausojantis režimas</li><li>• Natris fiziologinės normos ribose</li><li>• <b>Nereikia</b> mažinti kūno svorio</li><li>• Nevartoti alkoholio</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jei nėštumo pradžioje AKS savaime tampa normalus, pirmąsias 12 savaičių galima visai neskirti vaistų</li><li>• metildopa (pradinė dozė <math>125\text{--}250 \text{ mg} \times 2\text{--}4</math>, didžiausia <math>4,0 \text{ g/d.}</math>)</li><li>Jei efektas nepakankamas, skirti:<ul style="list-style-type: none"><li>• labetalolio (pradinė dozė <math>100 \text{ mg} \times 2</math>, daugiausia 1200</li></ul></li></ul> |

mg/d.) arba

- antroje nėštumo pusėje – atenololio 25–100 mg/d., metoprololio 25–100 mg/d. Juos skirti galima trumpiau (<4–6 sav.), stebėti vaisiaus augimą ir jo širdies veiklą.
- trečiame nėštumo trimestre galima skirti klonidiną 0,1–0,3 mg/d., daugiausia 1,2 mg/d.

---

**Pastabos:**

- Visų vaistų dozes didinti palaipsniui, stengiantis nesumažinti vaisiaus kraujotakos.
- Kontraindikuotini: AKF inhibitoriai, AT1 receptorių blokatoriai.
- Diuretikų reikėtų vengti, nes plazmos tūrį nėščiosioms mažinti netikslinga (mažina placentos kraujotaką, neapsaugo nuo toksemijos). Išsivysčius preeklampsijai ar sulėtėjus vaisiaus augimui diuretikai kontraindikuotini. Įprastai gydymui skiriama hidrochlorotiazido, (furozemidas skiriamas esant širdies ar inkstų nepakankamumui).
- Jei didelės AH gydymas minėtais optimaliais vaistais neefektyvus, išimtiniais atvejais gali būti skiriamas įprastinis hipertenzijos gydymas (išskyrus AKF inhibitorius, AT1 receptorių blokatorius).
- Pirmame nėštumo trimestre neskirti kalcio kanalų blokatorių (dėl teratogeniškumo). Esant reikalui skirti magnio sulfatą.

- Visų naujausių vaistų nuo hipertenzijos saugumas nėštumo metu neištirtas.

**57. Gydymas laktacijos periodu:**

- Laktacijos periodu neskirti □-metildopos (motinai gali išsivystyti silpnumas, depresija).
- Laktacijos pradžioje vengti diuretikų (jie mažina pieno kiekį).
- Dėl nedidelės atenololio ir metoprololio koncentracijos motinos piene juos galima skirti, stebint, ar neatsiranda kūdikio □-receptorių blokavimo požymių (bradikardijos, hipotenzijos). Ilgalaikio vaikų stebėjimo dėl šių vaistų skyrimo duomenų nėra.
- AKF inhibitoriai gali būti skiriami.

Pastaba. Dauguma antihipertenzinių vaistų išskiriami su motinos pienu, todėl dažnai tenka spręsti, ar nutraukti kūdikio žindymą (jei vaisto skyrimas būtinas motinai), ar nevartoti vaistų. Šiuo metu duomenys, apie naujausių vaistų koncentraciją motinos piene nepakankami, taip pat nėra ilgalaikio žindyto vaikų, kurių motinos vartojo antihipertenzinius vaistus, stebėjimo duomenų.

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-348](#), 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 58-2624 (2003-06-18), i. k. 1032250ISAK000V-348

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d.  
įsakymu Nr. 422

## **KRŪTIES PIKTYBINIŲ NAVIKŲ (C50) DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDymo METODIKA**

1. Gydytojas, įtaręs krūties vėžio diagnozę ir atlikęs tyrimus savo kompetencijos ribose, siunčia pacientą krūties vėžio diagnozės nustatymui į gydymo įstaigą, teikiančią onkologinę pagalbą ir turinčią sąlygas pilnam krūties vėžio ir jo išplitimo ištyrimui pagal diagnostikos metodiką (4 priedas) bei kompleksiniam gydymui.
2. Sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose reikalingas tarnybas ir specialistus, užtikrinamas pilnas paciento ištyrimas ir nustatoma gydymo taktika.
3. Nustatomas naviko išplitimas pagal TNM klasifikaciją ir stadijas (1 priedas).
4. Naviko diagnozė patvirtinama citologiškai ir/ar morfologiškai (2 priedas).
5. Prieš skiriant kompleksinį gydymą įvertinami prognostiniai veiksniai (3 priedas).
6. Krūties vėžys gali būti gydomas tik tose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose yra kompleksinio gydymo galimybės (įskaitant chemoterapiją, krūties chirurgiją ir spindulinę terapiją).
7. Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, krūties piktybinių navikų gydymo schema (5 priedas).

## KLINIKINĖ TNM KLASIFIKACIJA

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T Pirminis navikas</b> |                                                                                                                                    |
| x                         | T Pirminio naviko neįmanoma įvertinti                                                                                              |
| 0                         | T Pirminio naviko nėra                                                                                                             |
| is                        | T <i>Carcinoma in situ</i> : intraduktalinė karcinoma ar lobulinė karcinoma <i>in situ</i> , ar spenelio Pageto liga nesant naviko |
|                           | <i>Pastaba</i> : Pageto liga, susijusi su naviku, klasifikuojama atsižvelgiant į naviko dydį.                                      |
|                           | T1 Navikas, kurio didžiausias matmuo yra ne didesnis kaip 2 cm                                                                     |
| mic                       | T1 Mikroinvazija, kurios didžiausias matmuo ne didesnis kaip 0,1 cm <sup>1</sup>                                                   |
|                           | T1a Didžiausias matmuo nuo 0,1 iki 0,5 cm                                                                                          |
|                           | T1 Didžiausias matmuo nuo 0,5 iki 1,0 cm                                                                                           |
| b                         | T1c Didžiausias matmuo nuo 1 iki 2 cm                                                                                              |
|                           | T2 Navikas, kurio didžiausias matmuo nuo 2 iki 5 cm                                                                                |
|                           | T3 Navikas, kurio didžiausias matmuo yra didesnis kaip 5 cm                                                                        |
|                           | T4 Bet kokio dydžio navikas, tiesiogiai infiltravęs krūtinės ląstos sieną ar odą                                                   |

*Pastaba*. Krūtinės siena apima šonkaulius, tarpšonkaulinius raumenis ir priekinį dantytąjį raumenį, tačiau ne krūtinės raumenį.

|     |                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T4a | Krūtinės sienos infiltracija                                                                                                       |
| T4b | Krūtinės odos edema (taip pat ir „apelsino žievelės“ simptomas) ar išopėjimas, ar satelitiniai odos mazgeliai toje pačioje krūtyje |
| T4c | 4a ir 4b kartu                                                                                                                     |
| T4d | Uždegiminė karcinoma <sup>2</sup>                                                                                                  |

*Pastabos*: 1. Mikroinvazija yra naviko ląstelių išplitimas už bazalinės membranos ribų į gretimus audinius, kai nėra židinių, kurių didžiausias matmuo viršytų 0,1 cm. Tais atvejais, kai yra daugybinių mikroinvazijos židinių, klasifikuojamas didžiausias iš jų. Daugybiniai mikroinvazijos židiniai turi būti aprašyti, kaip ir didesni invazyvios karcinomos židiniai.

2. Krūties uždegiminė karcinoma pasižymi difuzine rusva odos induracija, kurios ribos panašios į rožės; papildomų masių neaptinkama. Jei odos biopsija neigiama ir nėra lokalizuoto išmatuojamo naviko, T4d karcinoma patomorfologiškai klasifikuojama kaip pTX. Odos gruoblėtumas, spenelio įsitraukimas ir kiti odos pakitimai, išskyrus klasifikuojamus kaip T4b ir T4d, gali būti ir esant T1, T2 ar T3 navikams ir nedaro įtakos išplitimo įvertinimui.

|                                               |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N Metastazės sritiniuose limfmazgiuose</b> |                                                                                                           |
| Nx                                            | Metastazių sritiniuose limfmazgiuose neįmanoma įvertinti                                                  |
| N0                                            | Metastazių sritiniuose limfmazgiuose nėra                                                                 |
| N1                                            | Yra paslankių metastazių tos pačios pusės pažasties limfmazgyje (-iuose)                                  |
| N2                                            | Yra metastazių tos pačios pusės pažasties limfmazgiuose, suaugusių tarpusavyje ir su kitomis struktūromis |
| N3                                            | Yra metastazių tos pačios pusės vidiniuose krūties limfmazgiuose                                          |

**M Tolimosios metastazės**

MX Tolimųjų metastazių neįmanoma įvertinti  
M0 Tolimųjų metastazių nėra  
M1 Yra tolimųjų metastazių  
**Patologinė pTNM klasifikacija**

pT Pirminis navikas

Kad būtų galima klasifikuoti naviką patomorfologiškai, pašalinus jį, pjūvio kraštuose neturi būti mikroskopinių naviko invazijos požymių.

pT kategorijos atitinka T kategorijas.

*Pastaba.* Nustatant patomorfologinį naviko išplitimą pT, matuojamas invazyvusis naviko komponentas. Jei yra didelis in situ komponentas (pvz., 4 cm) ir mažas invazyvusis komponentas (pvz., 0,5 cm), naviko išplitimas įvertinamas kaip pT1a.

pN Metastazės sritiniuose limfmazgiuose

Kad būtų galima klasifikuoti metastazes sritiniuose limfmazgiuose patomorfologiškai, reikia ištirti apatinius pažasties limfmazgius (I lygis). Todėl reikia pašalinti ne mažiau kaip 6 limfmazgius

pNX Metastazių sritiniuose limfmazgiuose neįmanoma įvertinti (limfmazgiai nepašalinti arba pašalinti anksčiau)

pN0 Metastazių sritiniuose limfmazgiuose nėra

pN1 Yra paslankių metastazių tos pačios pusės pažasties limfmazgiuose

pN1a Yra tik mikrometastazių (ne didesnių kaip 0,2 cm)

pN1b Yra metastazių limfmazgiuose, bet kuri didesnė nei 0,2 cm

pN1bi Yra metastazių 1–3 sritiniuose limfmazgiuose, bet kuri ne mažesnė kaip 0,2 cm, bet ne didesnė kaip 2,0 cm

pN1bii Yra metastazių 4 ar daugiau limfmazgių, bet kuri ne mažesnė kaip 0,2, bet ne didesnė kaip 2,0 cm

pN1biii Navikas išplitęs už limfmazgio kapsulės ribų, esant mažesnei kaip 2 cm dydžio metastazei

pN1biv Yra metastazė limfmazgyje, didesnė kaip 2 cm

pN2 Yra suaugusių tarpusavyje ir su kitomis struktūromis metastazių tos pačios pusės pažasties limfmazgiuose

pN3 Yra metastazių tos pačios pusės vidiniuose krūties limfmazgiuose (-yje)

pM Tolimosios metastazės: kategorijos pM atitinka M kategorijas

G – naviko diferenciacijos laipsnis

GX - naviko diferenciacijos laipsnio įvertinti neįmanoma

G1 - gerai diferencijuotas navikas

G2 - vidutiniškai diferencijuotas navikas

G3 - blogiau diferencijuotas

G4 - nediferencijuotas navikas

Grupavimas pagal stadijas

|              |                 |                 |    |
|--------------|-----------------|-----------------|----|
| 0 stadija    | Tis             | N0              | M0 |
| I stadija    | T1 <sup>1</sup> | N0              | M0 |
| II A stadija | T0              | N1              | M0 |
|              | T1 <sup>1</sup> | N1 <sup>1</sup> | M0 |
|              | T2              | N0              | M0 |
| II B stadija | T2              | N1              | M0 |

|               |                 |                   |    |
|---------------|-----------------|-------------------|----|
|               | T3              | N0                | M0 |
| III A stadija | T0              | N2                | M0 |
|               | T1 <sup>1</sup> | N2                | M0 |
|               | T2              | N2                | M0 |
|               | T3              | N1, N2            | M0 |
| III B stadija | T4              | Bet kuris N<br>N3 | M0 |
|               | Bet kuris T     |                   | M0 |
| IV stadija    | Bet kuris T     | Bet kuris N       | M1 |

*Pastabos:*

1. T1 apima ir T1mic.
2. Esant pN1, ligos prognozė yra tokia pati kaip ir esant pN0.

---

**Histologinė klasifikacija**

Nepatikslinto tipo karcinoma  
Duktalinė karcinoma  
Intraduktalinė (in situ)  
Invazyvi su dominuojančiu intraduktaliniu komponentu  
Nepatikslinto tipo invazyvi  
Komedokarcinoma  
Uždegiminė  
Medulinė su limfocitine infiltracija  
Mucininė (koloidinė)  
Papilinė  
Scirozinė  
Tubulinė  
Kitokia patikslinta  
Lobulinė karcinoma  
In situ  
Invazyvi su dominuojančiu in situ komponentu  
Invazyvi  
Spenelio karcinoma  
Nepatikslinta Pageto liga  
Pageto liga su intraduktaline karcinoma  
Pageto liga su invazyvia duktaline karcinoma  
Kitokio tipo karcinoma  
Nediferencijuota karcinoma

## Anatominės sritys:

C 50.0 – spenelis ir apyspenis  
C 50.1 – krūties centrinė dalis  
C 50.2 – krūties viršutinis ir vidinis kvadratas  
C 50.3 – krūties apatinis ir vidinis kvadratas  
C 50.4 – krūties viršutinis ir išorinis kvadratas  
C 50.5 – krūties apatinis ir išorinis kvadratas  
C 50.6 – krūties pažastinis kraštas  
C 50.8 – krūties išplitęs pažeidimas  
C 50.9 – krūtis, nepatikslinta

---

**Prognostiniai veiksniai****1. Navikiniai:**


- ☐ Ligos stadija
- ☐ Limfmazgių būklė
- ☐ Naviko dydis
- ☐ Naviko diferenciacijos laipsnis /proliferacijos greitis
- ☐ Invazija į kraujagysles ir limfagysles
- ☐ Estrogeno / progesterono receptorių būklė (ER/PR)\*
- ☐ HER-2/neu lygis, p53 mutacija ir kt.\*
- ☐ Navikinių ląstelių radimas kaulų čiulpuose\*

**2. Organizmo:**

- ☐ Amžius
  - ☐ Menopauzė / menstruacinė būklė
  - ☐ Šeimos anamnezė
  - ☐ Funkcinė būklė
- ☐ *Pastaba:* papildomi tyrimai atliekami esant galimybėms.

**NEPALANKŪS PROGNOTINIAI VEIKSNIAI**

- ☐ Ligos stadija >I
  - ☐ Metastazės regioniniuose limfmazgiuose
  - ☐ Naviko dydis  $\geq 2$  cm
  - ☐ Naviko diferenciacija  $G \geq 2$
  - ☐ Yra invazija į limfagysles ir kraujagysles
  - ☐ Neigiami estrogeno/progesterono receptoriai
  - ☐ Teigiamas HER-2/neu, yra p53 mutacija
  - ☐ Randamos navikinės ląstelės kaulų čiulpuose
  - ☐ Amžius <35 m.
  - ☐ Premenopauzė
-

**DIAGNOSTIKA****Objektyvus paciento ištyrimas:**

- ☐ Krūčių apžiūra
- ☐ Krūčių palpacija
- ☐ Limfmazgių palpacija

**Mamografija:**

- ☐ Bazinė mamograma – 40–45m.
- ☐ Kontrolinė mamografija nuo 50 m. atliekama kas 2 metus, įvertinus rizikos faktorius.
- ☐ Rizikos grupėms: jei yra pirmos eilės giminaičių, sergančių krūties vėžiu, mamograma atliekama nuo 35 m.

**Krūčių echoskopija**

- ☐ Esant neaiškiai diagnozei echoskopijos duomenys derinami su mamografijos duomenimis.
- ☐ Kuomet vyrauja liaukinis audinys, echoskopija informatyvesnė už mamografiją.

**Citologija/histologija (aspiracinė punkcija ir/ar stulpelinė biopsija)**

- ☐ Atliekama apčiuopus arba vizualizacijos metodais nustatčius mazgą krūtyje.
- ☐ Esant neaiškiems ar nepalpuojamiems pakitimams, aspiracinė punkcija ir/ar stulpelinė biopsija atliekama echoskopo ir/ar rentgeno kontrolėje.

**Imunohistocheminė hormonų receptorių diagnostika** (papildomas tyrimas, esant galimybėms)

**Naviko išplitimo diagnostika:**

- ☐ Krūtinės ląstos rentgenograma
  - ☐ Viršutinio pilvo aukšto ir dubens organų echoskopija
  - ☐ Skeleto scintigrafija (kliniškai įtariant metastazes kauluose)
  - ☐ Ginekologo konsultacija
-

**Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, krūties  
piktybinių navikų gydymo schema**

**ADJUVANTINĖ (4–6 kursai) IR NEOADJUVANTINĖ CHEMOTERAPIJA  
(2–6 kursai)**

Chemoterapijos schemas:

|                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC               | Doxorubicini 60 mg/m <sup>2</sup> 1d.<br>Cyclophosphamidi 600 mg/m <sup>2</sup> 1d.<br>kas 3 sav.                                                               |
| arba             |                                                                                                                                                                 |
| CMF*             | Metotrexati 40 mg/m <sup>2</sup> 1d. + 8d.<br>Cyclophosphamidi 600 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>Fluorouracili 600 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>kas 4 sav.           |
| arba             |                                                                                                                                                                 |
| CMF*(klasikinis) | Cyclophosphamidi 100 mg/m <sup>2</sup> per os 1-14d.<br>Metotrexati 40 mg/m <sup>2</sup> 1d. + 8d.<br>Fluorouracili 600 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>kas 4 sav.   |
| arba             |                                                                                                                                                                 |
| FAC**            | Fluorouracili 500 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>Doxorubicini 50 mg/m <sup>2</sup> 1d.<br>Cyclophosphamidi 500 mg/m <sup>2</sup><br>kas 3 sav.                      |
| arba             |                                                                                                                                                                 |
| CAF**            | Cyclophosphamidi 100 mg/m <sup>2</sup> per os 1-14d.<br>Doxorubicini 25 – 30 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>Fluorouracili 500 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>kas 4 sav. |

\*Skiriama tik esant palankiems prognostiniams veiksniams (3 priedas)

\* Kuomet nepageidautinas kardiotoksiškumas

\*\*Skiriama didelės rizikos grupės pacientams pagal prognostinius veiksniai (3 priedas)

**Pastabos:**

- ☐ Rizika metastazuoti nustatoma pagal prognostinius faktorius (3 priedas)
- ☐ Planuojant skirti chemoterapiją su antraciklinais būtina atlikti echokardioskopiją, įvertinant kairiojo skilvelio funkciją
- ☐ Galima dozių redukcija pacientams vyresniems nei 60 m



**Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, krūties  
piktybinių navikų gydymo schema**

**METASTAZAVUSIO KRŪTIES VĖŽIO CHEMOTERAPIJA**

|     |                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC  | Doxorubicini 60 mg/m <sup>2</sup> 1d.<br>Cyclophosphamidi 600 mg/m <sup>2</sup> 1d.<br>kas 3 sav.                                                               |
| CMF | Metotrexati 40 mg/m <sup>2</sup> 1d. + 8d.<br>Cyclophosphamidi 600 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>Fluorouracili 600 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>kas 4 sav.           |
| FAC | Fluorouracili 500 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>Doxorubicini 50 mg/m <sup>2</sup> 1d.<br>Cyclophosphamidi 500 mg/m <sup>2</sup><br>kas 3 sav                       |
| CAF | Cyclophosphamidi 100 mg/m <sup>2</sup> per os 1-14d.<br>Doxorubicini 25 – 30 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>Fluorouracili 500 mg/m <sup>2</sup> 1+8d.<br>kas 4 sav. |

Nustačius agresyvią ligos eigą ir nepalankius prognostinius faktorius (žr. 3 priedą), konsiliumo nutarimu skiriama:

\*\*\*Docetaxeli 75 mg/m<sup>2</sup>  
Doxorubicini 50 mg/m<sup>2</sup>

Po neveiksmingos I eilės chemoterapijos, progresuojant ligai, konsiliumo nutarimu skiriama:

•Paclitaxeli 175 mg/m<sup>2</sup> 1d.  
Doxorubicini 50 mg/m<sup>2</sup> 1d.  
Paclitaxeli 175 mg/m<sup>2</sup> 1d.  
kas 3 sav.  
Docetaxeli 100 mg/m<sup>2</sup> 1d.  
kas 3 sav.  
Docetaxeli 75 mg/m<sup>2</sup> 1 d

Papildyta pastraipa:

Nr. [V-556](#), 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3181 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-556

*Capecitabini 2500 mg/m<sup>2</sup> 1 – 14 d*

Papildyta pastraipa:

Nr. [V-556](#), 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3181 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-556

kas 3 sav. \*\*\*\*

Papildyta pastraipa:

Nr. [V-556](#), 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3181 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-556

*Paclitaxeli 175 mg/m<sup>2</sup> 1 d*

Papildyta pastraipa:

Nr. [V-181](#), 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 50-1652 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-181

*Pastraipos pakeitimai:*

Nr. [V-556](#), 2005-07-07, *Žin.*, 2005, Nr. 85-3181 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-556

**Gemcitabini 1250 mg/m<sup>2</sup> 1 d. ir 8 d**

*Papildyta pastraipa:*

Nr. [V-181](#), 2004-03-31, *Žin.*, 2004, Nr. 50-1652 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-181

*Pastraipos pakeitimai:*

Nr. [V-556](#), 2005-07-07, *Žin.*, 2005, Nr. 85-3181 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-556

**kas 3 sav.\*\*\*\*\***

*Papildyta pastraipa:*

Nr. [V-181](#), 2004-03-31, *Žin.*, 2004, Nr. 50-1652 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-181

*Pastraipos pakeitimai:*

Nr. [V-556](#), 2005-07-07, *Žin.*, 2005, Nr. 85-3181 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-556

### **PASTABOS:**

☐ Chemoterapijos schemos pasirenkamos atsižvelgiant į tai, pagal kokias schemas pacientė buvo gydyta anksčiau, kaip gydymą toleravo, kiek laiko truko remisija.

☐ \*\*\*Skiriama kaip I eilės gydymas, aptarus konsiliumu, rekomenduojant bei kontroliuojant universitetų ligoninėms.

☐ Skiriama (●) pažymėta schema, kai nėra viršyta Doxorubicini suminė 550 mg/m<sup>2</sup> dozė.

☐ Vyresnėms nei 60 m. moterims galima dozių redukcija.

☐ Kompensuojamų priešnavikinių vaistų skyrimas vykdomas kontroliuojant universitetų ligoninėms.

\*\*\*\*\* Pirmumo tvarka taikoma ta gydymo schema, kurios vaistų įsigijimo išlaidoms kompensuoti yra išleidžiama mažiau Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pasirinkus schemą, kurios vaistų įsigijimo išlaidoms kompensuoti yra išleidžiama daugiau Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos turi būti pateikta tokį pasirinkimą pagrindžianti dokumentacija.

---

*Skirsnio pakeitimai:*

Nr. [V-556](#), 2005-07-07, *Žin.*, 2005, Nr. 85-3181 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-556

## Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, krūties piktybinių navikų gydymo schema

### HORMONOTERAPIJA

#### Adjuvantinė

Tamoksifenas 20 mg/d. iki ligos progresavimo, bet ne ilgiau nei 5 metus

*Exemestanum* 25 mg/d., pomenopauzinės būklės moterims, kai aptinkama estrogenų receptorių ir pradinis adjuvantinis gydymas tamoksifenu truko ilgiau nei 2 metus. Vartojamas ne ilgiau kaip 5 metus.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. [V-596](#), 2006-07-10, Žin., 2006, Nr. 77-3021 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-596

Anastrozolum – 1 mg/d moterims po menopauzės, jei negalima skirti Tamoksifenum (gresiant tromboembolinėms komplikacijoms, esant proliferaciniam gimdos pakitimams), iki ligos progresavimo, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Gresiant tromboembolinėms komplikacijoms, Anastrozolum skiriamas po kraujagyslių chirurgo konsultacijos

Papildyta pastraipa:

Nr. [V-825](#), 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4643 (2005-10-29); Žin., 2005, Nr. 139-0 (2005-11-26), i. k. 1052250ISAK000V-825

#### I eilės hormonoterapija:

Jeigu navikas metastazavęs, skiriamas tamoksifenas arba selektyvūs aromatazės inhibitoriai:

Tamoksifenas 20 mg/d. iki ligos progresavimo

Letrozolis 2,5 mg/d. iki ligos progresavimo\*

Anastrozolis 1 mg/d. iki ligos progresavimo\*

\*Selektyvūs aromatazės inhibitoriai skiriami, jeigu pacientė netoleruoja Tamoxifeno.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. [497](#), 2002-10-10, Žin., 2002, Nr. 101-4534 (2002-10-23), i. k. 1022250ISAK00000497

#### II eilės hormonoterapija (po tamoksifeno skyrimo, progresuojant ligai):

Anastrozolis 1 mg/d. iki ligos progresavimo;

Letrozolis 2,5 mg/d. iki ligos progresavimo;

#### II ir III eilės hormonoterapija:

Megestrolis acetatas 160 mg/d.

*Exemestanum* – 25 mg/d. moterims po menopauzės iki ligos progresavimo

**LHRH agonistai** – premenopauzėje nustačius teigiamus estrogenų receptorių (ar jų neištyrus) moterims, sergančioms pažengusiu krūties vėžiu:

Goserelinas 3,6 mg kas 4 sav. ne ilgiau 2,5 metų.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. [V-900](#), 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 140-5050 (2005-11-29), i. k. 1052250ISAK000V-900

#### PASTABA.

Hormonoterapija neskiriama, nustačius neigiamus estrogenų, progesteronų receptorių.

### ANTIEMETIKAI

Ondansetronas\* 8-32 mg/p i/v ar per os

Tropisetronas\* 5 mg/p i/v ar per os

Granisetronas\* 1-3 mg/p i/v

\* – dozės yra individualios, keičiamos priklausomai nuo to, kaip pacientas toleruoja chemoterapiją.

---

**Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, krūties piktybinių navikų gydymo schema****BIFOSFONATAI**

Bifosfonatai skiriami:

☐ Osteoklastinio–osteolizinio pobūdžio kaulų metastazėms gydyti, esant neefektyviai spindulinei terapijai.

Pamidronatas (Aredia) 90 mg į/v infuzija kas 4 sav. arba 60 mg į/v infuzija kas 3 sav. Vartojimo trukmė – 1 metai.

Klodronatas (Bonefos) 300 mg/d.1-5d. į/v, kol normalizuosis kalcio kiekis kraujyje, po to 1600 mg/p per os (dozė gali būti koreguojama priklausomai nuo inkstų funkcijos). Vartojimo trukmė – 1 metai.

Epoetinas alfa skiriamas kartu su chemoterapija, kai hemoglobino (Hb) koncentracija plazmoje maža (pradinis  $Hb \leq 100$  g/l).

**BENDROS NUORODOS****CHEMOTERAPIJOS KURSŲ SKAIČIUS**

☐ Adjuvantinis gydymas:

6 CMF

ar

4 AC

ar

6 CAF

☐ Neoadjuvantinis gydymas

2–6 AC

2–6 FAC

☐ Metastazavęs krūties vėžys

Iki 6 kursų

**GYDYMO EFEKTYVUMO VERTINIMO METODIKA**

☐ Adjuvantiniam gydymui – nėra.

☐ Neoadjuvantiniam gydymui – 2 ar 4 kursai nusprendžiama, atlikus krūtų echoskopiją ir/ar mamografiją. Esant uždegiminei krūties vėžio formai (T4) – iki 6 kursų.

☐ Metastazavusiam krūties vėžiui monitoruojamas taikiny (metastazė):

1. Tyrimo metodai priklauso nuo metastazės lokalizacijos.

2. Kontrolė yra atliekama po 2 chemoterapijos kursų.

3. Esant ligos progresavimui, keičiama į antros eilės chemoterapiją.

4. Esant stabiliai būklei, – dar 2 chemoterapijos kursai, po ko vertinama dinamika.

**CHEMOTERAPIJOS SCHEMOS NEEFEKTYVUMO IR KEITIMO KITA KRITERIJAI**

☐ Monitoruojamos metastazės didėjimas

☐ Ligos progresavimas

☐ Diseminacija

☐ Pavienēs metastazēs ītarīmas, esant stabīlīai līgos eīgai, turī būti patvīrtīnamas citologiškai ir/ar histologiškai.

**CHEMOTERAPIJOS NUTRAUKIMO KRITERIJAI**

- ☐ Bīoga tolerancīja dēl toksīškuma.
  - ☐ Pacīento funkcinē būklē >2 pagal PSO funkcinēs būklēs skalē.
-

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d.  
įsakymu Nr. 422

**Plaučių piktybinių navikų (C34) diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodika**

1. Gydytojas, įtaręs plaučių vėžio diagnozę ir atlikęs tyrimus savo kompetencijos ribose, siunčia pacientą plaučių vėžio diagnozės nustatymui pulmonologo arba onkologo chemoterapeuto, arba onkologo radioterapeuto konsultacijai į gydymo įstaigą, turinčią sąlygas pilnam plaučių vėžio ir jo išplitimo ištyrimui pagal diagnostikos metodiką (1, 2 priedas) bei kompleksiniam gydymui.
  2. Gydytojas pulmonologas arba onkologas chemoterapeutas, arba onkologas radioterapeutas organizuoja paciento ištyrimą, nustato naviko išplitimą pagal TNM klasifikaciją ir stadijas.
  3. Naviko diagnozę patvirtinama morfologiškai.
  4. Gydytojas pulmonologas arba gydytojas onkologas chemoterapeutas, arba gydytojas onkologas radioterapeutas organizuoja paciento gydymą.
  5. Gydymas priklauso nuo naviko morfologijos, išplitimo laipsnio bei paciento funkcinės būklės.
  6. Plaučių vėžys gali būti gydomas tik tose asmens sveikatos įstaigose, kuriose yra kompleksinio gydymo galimybės (įskaitant chemoterapiją, krūtinės ląstos chirurgiją ir spindulinę terapiją).
  7. Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, plaučių vėžio gydymo schema (3, 4 priedai).
-

## Plaučių piktybinių navikų diagnostikos metodika

Tikslai:

1. Patvirtinti plaučių vėžio diagnozę morfologiškai.

2. Nustatyti plaučių vėžio išplitimą.

I. Tyrimai plaučių vėžiui diagnozuoti:

1. Klinikinis tyrimas.

2. Krūtinės ląstos rentgenograma (priekinė ir šoninė).

3. Skreplių citologinis tyrimas (esant sekretui).

4. Bronchoskopija su medžiagos paėmimu citologiniam ir histologiniam tyrimui.

5. Transtorakalinė plaučių audinio biopsija (jei neinformatyvi ir/ar negalima transbronchinė biopsija).

6. Plaučių audinio biopsija (video) torakoskopijos ar torakotomijos metu (jei aukščiau minėtais tyrimo metodais nepavyksta nustatyti diagnozės).

II. Tyrimai plaučių vėžio išplitimui įvertinti:\*

1. Intratorakalinis išplitimas:

1.1. Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija (KT).

1.2. Krūtinės ląstos branduolių magneto rezonanso tyrimas (BMR) (*Pankosto* navikas).

1.3. Mediastinoskopija ar mediastinotomija ar transbronchinė tarpuplaučio limfmazgių adatinė aspiracinė biopsija (jei padidėję tarpuplaučio limfmazgiai).

1.4. Pleurocentezė (punktato citologinis ištyrimas)  $\pm$  pleuros biopsija (esant pleuritui).

1.5. (Video) torakoskopija (jei pakartotina pleurocentezė nepatvirtina pleurito kilmės bei neaiški diagnozė ir/ar išplitimas).

2. Toliausių metastazių nustatymas:

1.6. Galvos KT ir/ar BMR (įtariant metastazes).

1.7. Kaulų scintigrafija ir rentgenogramos (įtariant metastazes; smulkialąstelinio plaučių vėžio atveju – visiems).

1.8. Viršutinio pilvo aukšto echoskopija (VPAE).

1.9. Pilvo KT (neaiškiais atvejais).

1.10. Padidėjusių limfmazgių punkcinė biopsija.

1.11. Kaulų čiulpų punkcija ar trepanobiopsija (smulkialąstelinio plaučių vėžio atveju, jei yra pakitimai kraujo tyrime).

III. Bendrieji tyrimai:

1. Bendras kraujo tyrimas.

2. Šlapimo tyrimas.

3. Biocheminiai tyrimai.

IV. Tyrimai paciento būklei įvertinti:

1. Spirograma.

2. Dvimatė širdies echoskopija (numatant operacinį gydymą ir skiriant chemoterapiją kardiotoksiniais vaistais ar cisplatina\*\*).

\* – verifikavus IV stadiją, tolesni plaučių vėžio išplitimo įvertinimo tyrimai neatliekami

\*\* – nebūtinai

**Smulkialąstelinio plaučių vėžio atveju atliekamų tyrimų seka\***

- 1) Anamnezė, klinikinis tyrimas, laboratoriniai tyrimai
- 2) VPAE
- 3) Pilvo KT (neaiškiais atvejais)
- 4) Kaulų scintigramos
- 5) Kaulų rentgenogramos (neaiškiais atvejais)
- 6) Galvos smegenų KT\*\*
- 7) Kaulų čiulpų punkcija ar trepanobiopsija

\* – nustačius išplitusią formą, tolesni tyrimai neatliekami

\*\* - nebūtinai

---

**Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,  
nesmulkialąstelinio plaučių vėžio gydymo schema**

**Lokaliai išplitusio ar metastazavusio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio chemoterapija**

**I eilės chemoterapija** vykdoma pasirenkant vieną iš pateiktų schemų

Cisplatina 60-120 mg/m<sup>2</sup> 1d. (dozę galima išdalinti per 3 dienas)

Etopozidas 100-120 mg/m<sup>2</sup> 1-3d.

kas 3–4 sav. – iki 6 kursų

ARBA

Cisplatinum 60–120 mg/m<sup>2</sup> 1 d. (dozę galima išdalyti per 3 dienas)

Vinorelbinum 25–30 mg/m<sup>2</sup> 1 d. ir 8 d., kas 3 sav. – iki 6 kursų

*Papildyta pastraipa:*

Nr. [V-916](#), 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5148 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-916

**II eilės chemoterapija**

\*Cisplatina 75–100 mg/m<sup>2</sup> 1d.

Gemcitabinas 1250 mg/m<sup>2</sup> 1, 8 d. kas 3 sav. arba 1, 8, 15 d. kas 4 sav. – iki 6 kursų

ARBA

\*Cisplatina 75 mg/m<sup>2</sup> 1d.

Docetakselis 75 mg/m<sup>2</sup> 1d.

kas 3 sav. – iki 6 kursų

ARBA

\*Cisplatina 80 mg/m<sup>2</sup> 1d.

Paklitakselis 175 mg/m<sup>2</sup> 1d.

kas 3 sav. – iki 6 kursų

ARBA

\*Docetakselis 75–100 mg/m<sup>2</sup> 1 d. kas 3 sav. – iki 6 kursų

ARBA

\*Gemcitabinas 1000 mg/m<sup>2</sup> 1, 8, 15 d. kas 4 sav. – iki 6 kursų

\* – Kaip I eilės gydymas gali būti skiriamas pagal universitetų ligoninių paskyrimus (rekomendacijas).

**Pastabos:**

1. Kartu su chemoterapija cisplatinos pagrindu turi būti skiriami antiemetikai:

ondansetronas\*\* 8–32 mg/p į veną ar per os

granisetronas\*\* 1–3 mg/p į veną ar 1–2 mg/p per os

tropisetronas\*\* 5 mg/p į veną ar per os

\*\* dozės yra individualios, keičiamos priklausomai nuo to, kaip pacientas toleruoja chemoterapiją.

2. Kartu su cisplatina būtina užtikrinti hidrataciją.

3. Alfa epoetinas skiriamas taikant chemoterapiją. Gydymo tikslas – palaikyti vidutinę hemoglobino (Hb) koncentraciją – 120 g/l viso chemoterapijos kurso metu. Gydymas pradedamas,

kai Hb  $\leq$  100 g/l ir kraujo serume yra normalus geležies kiekis. Jei geležies kiekis yra sumažėjęs, jį reikia koreguoti skiriant geležies preparatus. Pradinė dozė – po 150 TV/kg į poodį 3 kartus per savaitę. Jei po 4 savaičių retikuliocitų skaičius padidėja  $\geq 40 \times 10^9/l$  arba Hb didėja  $\geq 10$  g/l, toliau tęsiamas gydymas taikant tokią pačią dozę. Jei po 4 savaičių retikuliocitų skaičius padidėja  $< 40 \times 10^9/l$  arba Hb padidėja  $< 10$  g/l nuo pradinio lygio, gydymą reikia nutraukti. Hb pakilus daugiau kaip 130 g/l, gydymą reikia nutraukti, sumažėjus Hb  $< 120$  g/l, vėl gydyti alfa epoetinu, tik skiriant mažesnę dozę, t. y. 150 TV/kg į poodį 2 kartus per savaitę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-665](#), 2004-09-24, Žin., 2004, Nr. 145-5285 (2004-09-30), i. k. 1042250ISAK000V-665

4. Beta epoetinas skiriamas taikant chemoterapiją platinos preparatais (cisplatina po 75 mg/m<sup>2</sup> viso gydymo kurso metu arba karboplatina po 350 mg/m<sup>2</sup> viso gydymo kurso metu). Gydymo tikslas – palaikyti vidutinę Hb koncentraciją – 120 g/l viso chemoterapijos kurso metu. Gydymas pradedamas, kai Hb  $\leq$  100 g/l ir kraujo serume yra normalus geležies kiekis. Jei geležies kiekis yra sumažėjęs, jį reikia koreguoti skiriant geležies preparatus. Pradinė dozė – 450 TV/kg į poodį per savaitę. Jei po 4 savaičių retikuliocitų skaičius padidėja  $\geq 40 \times 10^9/l$  arba Hb didėja  $\geq 10$  g/l, toliau tęsiamas gydymas taikant tokią pačią dozę. Jei po 4 savaičių retikuliocitų skaičius padidėja  $< 40 \times 10^9/l$  arba Hb didėja  $< 10$  g/l nuo pradinio lygio, gydymą reikia nutraukti. Hb pakilus daugiau kaip 130 g/l, gydymą reikia nutraukti, sumažėjus Hb  $< 120$  g/l, vėl gydyti beta epoetinu, tik mažesne doze, t. y. 50 proc. buvusios dozės.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-665](#), 2004-09-24, Žin., 2004, Nr. 145-5285 (2004-09-30), i. k. 1042250ISAK000V-665

**Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,  
smulkialąstelinio plaučių vėžio gydymo schema**

**SMULKIALĄSTELINIO PLAUČIŲ VĖŽIO CHEMOTERAPIJA**

Cisplatina 60-100 mg/m<sup>2</sup> 1 d. (dozę galima išdalyti per tris dienas)  
Etopozidas 100-120 mg/m<sup>2</sup> 1–3 d.  
kas 3 sav. – iki 6 kursų

ARBA  
Ciklofosfamidą 1000 mg/m<sup>2</sup> 1d.  
Doksorubicinas 40–50 mg/m<sup>2</sup> 1d.  
Vinkristinas 2,0 mg 1d.  
kas 3 sav. – iki 6 kursų

ARBA  
Etopozidas 50 mg/m<sup>2</sup> p/o iki 21 dienos  
kas 4 sav. – iki 6 kursų

ARBA  
Vinkristinas 1 mg/m<sup>2</sup> 1 d.\*  
Etopozidas 100-120 mg/m<sup>2</sup> 1–3 d.  
kas 3 sav. – iki 6 kursų  
\* – kai paciento funkcinė būklė > 2 pagal PSO funkcinės būklės skalę

ARBA  
Ciklofosfamidą 1000 mg/m<sup>2</sup> 1 d.  
Doksorubicinas 45–50 mg/m<sup>2</sup> 1 d.  
Etopozidas 80 mg/m<sup>2</sup> 1–3 d. arba 100 mg/m<sup>2</sup> 1, 3, 5 d.  
kas 3 sav. – iki 6 kursų

**Pastabos:**

1. Kartu su chemoterapija cisplatinos pagrindu turi būti skiriami antiemetikai:  
ondansetronas\* 8–32 mg/p į veną ar per os  
granisetronas\* 1–3 mg/p į veną ar 1-2 mg/p per os  
tropisetronas\* 5 mg/p į veną ar per os

\* dozės yra individualios, keičiamos priklausomai nuo to, kaip pacientas toleruoja chemoterapiją.

2. Kartu su cisplatina būtina užtikrinti hidrataciją.

3. Alfa epoetinas skiriamas taikant chemoterapiją. Gydymo tikslas – palaikyti vidutinę hemoglobino (Hb) koncentraciją – 120 g/l viso chemoterapijos kurso metu. Gydymas pradedamas, kai Hb  $\geq$  100 g/l ir kraujo serume yra normalus geležies kiekis. Jei geležies kiekis yra sumažėjęs, jį reikia koreguoti skiriant geležies preparatus. Pradinė dozė – po 150 TV/kg į poodį 3 kartus per savaitę. Jei po 4 savaičių retikulocitų skaičius padidėja  $\geq 40 \times 10^9/l$  arba Hb didėja  $\geq 10 g/l$ , toliau tęsiamas gydymas taikant tokią pačią dozę. Jei po 4 savaičių retikulocitų skaičius padidėja  $< 40 \times 10^9/l$  arba Hb padidėja  $< 10 g/l$  nuo pradinio lygio, gydymą reikia nutraukti. Hb pakilus daugiau kaip 130 g/l, gydymą reikia nutraukti, sumažėjus Hb  $< 120 g/l$ , vėl gydyti alfa epoetinu, tik skiriant mažesnę dozę, t. y. 150 TV/kg į poodį 2 kartus per savaitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-665](#), 2004-09-24, Žin., 2004, Nr. 145-5285 (2004-09-30), i. k. 1042250ISAK000V-665

4. Beta epoetinas skiriamas taikant chemoterapiją platinos preparatais (cisplatina po 75 mg/m<sup>2</sup> viso gydymo kurso metu arba karboplatina po 350 mg/m<sup>2</sup> viso gydymo kurso metu). Gydymo tikslas – palaikyti vidutinę Hb koncentraciją – 120 g/l viso chemoterapijos kurso metu. Gydymas pradedamas, kai Hb  $\geq$  100 g/l ir kraujo serume yra normalus geležies kiekis. Jei geležies kiekis yra sumažėjęs, jį reikia koreguoti skiriant geležies preparatus. Pradinė dozė – 450 TV/kg į poodį per savaitę. Jei po 4 savaičių retikuliocitų skaičius padidėja  $\geq 40 \times 10^9/l$  arba Hb didėja  $\geq 10 g/l$ , toliau tęsiamas gydymas taikant tokią pačią dozę. Jei po 4 savaičių retikuliocitų skaičius padidėja  $< 40 \times 10^9/l$  arba Hb didėja  $< 10 g/l$  nuo pradinio lygio, gydymą reikia nutraukti. Hb pakilus daugiau kaip 130 g/l, gydymą reikia nutraukti, sumažėjus Hb  $< 120 g/l$ , vėl gydyti beta epoetinu, tik mažesne doze, t. y. 50 proc. buvusios dozės.

Papildyta punktu:

Nr. [V-665](#), 2004-09-24, Žin., 2004, Nr. 145-5285 (2004-09-30), i. k. 1042250ISAK000V-665

## **Bendros nuorodos**

### **Chemoterapijos kursų skaičius**

- ☐ 4–6 chemoterapijos kursai
- ☐ 2–4 chemoterapijos kursai prieš spindulinį gydymą ar operacinį gydymą lokaliai išplitusio nesmulkialąstelinio plaučių vėžio atveju

### **Gydymo efektyvumo vertinimo metodika**

- ☐ Kursų skaičius nustatomas įvertinus efektą po 2 chemoterapijos kursų
- ☐ Jei yra regresija ar stabili liga ir gera tolerancija – 6 kursai
- ☐ Jei yra regresija ar stabili liga, bet bloga tolerancija dėl toksiškumo – 4 kursai
- ☐ Jei yra progresija, keičiama į antros eilės chemoterapiją arba chemoterapija nutraukiama
- ☐ Gydant lokaliai išplitusį nesmulkialąstelinį plaučių vėžį, prieš spindulinį gydymą arba operacinį gydymą skiriami:
  - 2 chemoterapijos kursai, jei progresija ar stabili liga ar bloga tolerancija dėl toksiškumo
  - iki 4 chemoterapijos kursų, jei regresija ir gera tolerancija
- ☐ Gydymo efektyvumo vertinimas:
  - plaučių naviko dinamikos įvertinimui atliekama krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija arba krūtinės ląstos rentgenograma
  - metastazių dinamikos įvertinimui tyrimo metodai parenkami pagal metastazių lokalizaciją

### **Chemoterapijos schemos neefektyvumo ir keitimo kita kriterijai**

- ☐ Ligos progresavimas

### **Chemoterapijos nutraukimo kriterijai**

- ☐ Bloga tolerancija dėl toksiškumo
  - ☐ Paciento funkcinė būklė  $> 2$  pagal PSO funkcinės būklės skalę
-

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d.  
įsakymu Nr. 422

## **PROSTATOS PIKTYBINIŲ NAVIKŲ (C61) DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO METODIKA**

1. Gydytojas, įtaręs priešinės liaukos vėžio diagnozę ir atlikęs tyrimus savo kompetencijos ribose, siunčia pacientą priešinės liaukos vėžio diagnozės nustatymui į gydymo įstaigą, teikiančią onkologinę pagalbą ir turinčią sąlygas pilnam priešinės liaukos vėžio ir jo išplitimo ištyrimui pagal diagnostikos metodiką (4 priedas).
  2. Sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose reikalingas tarnybas ir specialistus, užtikrinamas pilnas paciento ištyrimas ir nustatoma gydymo taktika.
  3. Nustatomas naviko išplitimas pagal TNM klasifikaciją ir stadijas (1 priedas).
  4. Naviko diagnozė patvirtinama morfologiškai (2 priedas).
  5. Prieš skiriant kompleksinį gydymą įvertinami prognostiniai veiksniai (3 priedas).
  6. Priešinės liaukos vėžys gydomas tik tose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose yra kompleksinio gydymo galimybės (įskaitant priešinės liaukos vėžio chirurgiją, spindulinę terapiją, chemoterapiją).
  7. Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, prostatos piktybinių navikų gydymo schema (5 priedas).
-

## TNM klasifikacija

Klasifikuojama tik adenokarcinoma. Sarkomos ar pereinamųjų ląstelių karcinomos neklasifikuojamos. Priešinės liaukos pereinamųjų ląstelių karcinoma klasifikuojama kaip šlaplės navikas.

### Klinikinė TNM klasifikacija

|          |                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> | <b>Pirminis navikas</b>                                                                                                                                                                        |
| TX:      | Pirminio naviko neįmanoma įvertinti                                                                                                                                                            |
| T0:      | Nėra pirminio naviko požymių                                                                                                                                                                   |
| T1:      | Kliniškai nepasireiškiantis, nepalpaujamas, vizualizacijos metodais nepastebimas navikas                                                                                                       |
| T1a:     | Navikas atsitiktinai histologiškai rastas mažiau kaip 5 proc. rezekuoto audinio                                                                                                                |
| T1b:     | Navikas atsitiktinai histologiškai rastas daugiau kaip 5 proc. rezekuoto audinio                                                                                                               |
| T1c:     | Navikas aptiktas ištyrus punkcinės biopsijos medžiagą (atliktos dėl padidėjusio PSA)                                                                                                           |
| T2:      | Navikas, apribotas priešinės liaukos*                                                                                                                                                          |
| T2a:     | Navikas apėmęs vieną skiltį                                                                                                                                                                    |
| T2b:     | Navikas apėmęs abi skiltis                                                                                                                                                                     |
| T3:      | Navikas infiltravęs priešinės liaukos kapsulę**                                                                                                                                                |
| T3a:     | Ekstrakapsulinis išplitimas (vienpusis ar abipusis)                                                                                                                                            |
| T3b:     | Navikas infiltravęs sėklinės pūsleles, nefiksuotas                                                                                                                                             |
| T4:      | Navikas nejudrus arba infiltravęs gretimas struktūras: sėklinės pūsleles, šlapimo pūslės kaklelį, išorinį sfinkterį, tiesiąją žarną, keliamuosius išangės raumenis ir/arba mažojo dubens sieną |

*Pastabos:*

\*Navikas, aptinkamas tiriant punkcinės biopsijos medžiagą, bet nepalpaujamas ir nepastebimas vizualizacijos metodais, klasifikuojamas kaip T1.

\*\*Išplitimas į priešinės liaukos viršūnę ir į kapsulę (jos neperaugant) klasifikuojamas ne kaip T3, o kaip T2.

Priešinės liaukos sritiniai limfmazgiai (N) yra dubenyje, išsidėstę žemiau bendrųjų klubinių arterijų bifurkacijos. Lateraliskumas neturi įtakos N klasifikacijai.

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| <b>N</b> | <b>Sritiniai limfmazgiai</b>                             |
| NX:      | Metastazių sritiniuose limfmazgiuose neįmanoma įvertinti |
| N0:      | Metastazių sritiniuose limfmazgiuose nėra                |
| N1:      | Metastazės sritiniuose limfmazgiuose ar limfmazgyje      |

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| <b>M</b> | <b>Tolimosios metastazės***</b>              |
| MX:      | Tolimųjų metastazių neįmanoma įvertinti      |
| M0:      | Tolimųjų metastazių nėra                     |
| M1:      | Yra tolimųjų metastazių                      |
| M1a:     | Yra metastazių neregioniniuose limfmazgiuose |
| M1b:     | Yra metastazių kauluose                      |
| M1c:     | Yra kitokių tolimųjų metastazių              |

*Pastaba:*

\*\*\* kai randama daugiau kaip vienos lokalizacijos metastazių, klasifikuojama labiau išplitusi lokalizacija

### Patologinė pTNM klasifikacija:

Kategorijos pT, pN ir pM atitinka kategorijas T, N, ir M.

Kategorijos pT1 nėra, kadangi šiuo atveju būna per mažai medžiagos įvertinti didžiausią pT kategoriją.

### Grupavimas pagal stadijas

|             |            |            |    |            |
|-------------|------------|------------|----|------------|
| I stadija   | T1a        | N0         | M0 | G1         |
| II stadija  | T1a        | N0         | M0 | G2,3–4     |
|             | T1b        | N0         | M0 | bet koks G |
|             | T1c        | N0         | M0 | bet koks G |
|             | T2         | N0         | M0 | bet koks G |
| III stadija | T3         | N0         | M0 | bet koks G |
| IV stadija  | T4         | N0         | M0 | bet koks G |
|             | Bet koks T | N1         | M0 | bet koks G |
|             | Bet koks T | N2         | M0 | bet koks G |
|             | Bet koks T | N3         | M0 | bet koks G |
|             | Bet koks T | bet koks N | M1 | bet koks G |

**Histologinė klasifikacija****Epiteliniai navikai:**

☐ Adenokarcinoma

-Nustatoma tik kanalėliuose

-Mucinozinė

☐ Smulkių ląstelių karcinoma

☐ Tarpinių ląstelių karcinoma

☐ Karcinoma *in situ* (intraepitelinė neoplazija) ir neoplazijos pirmtakai

**Karcinosarkoma****Neepiteliniai navikai**

☐ Mezenchiminė-gerybinė ir piktybinė

☐ Limfoma

**Germinaciniai navikai****Grupavimas pagal Gleason sumą:**

| <b>Gleason suma</b> |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 2–4                 | gerai diferencijuotas vėžys               |
| 5–6                 | vidutiniškai diferencijuotas vėžys        |
| 7                   | vidutiniškai blogai diferencijuotas vėžys |
| 8–10                | blogai diferencijuotas vėžys              |

**Naviko diferenciacijos laipsnis:**

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| GX   | diferenciacijos laipsnio neįmanoma įvertinti   |
| G1   | gerai diferencijuotas vėžys                    |
| G2   | vidutiniškai diferencijuotas vėžys             |
| G3–4 | blogai diferencijuotas/nediferencijuotas vėžys |

### **Prognostiniai veiksniai**

1. Naviko išplitimas (T kategorija)
2. Histologinė diferenciacija (Gleasono laipsnis)
3. Serumo PSA lygis
4. Amžius
5. Bendra funkcinė ligo būklė, įvertinant gretutines lėtines ligas
6. Serumo testosterono ir šarminės fosfatazės lygis\*
7. Skeleto scintigrafijos duomenys\*\*

\*Papildomas tyrimas, esant galimybėms

\*\*Būtina atlikti, kai PSA lygis >10ng/ml

---

## Diagnostikos metodika

**Diagnostikos pagrindai:** priešinės liaukos vėžio diagnostikai būtini tyrimai yra PSA nustatymas, priešinės liaukos palpacija per tiesiąją žarną – rektalinis tyrimas, echoskopija (tiksliausia–transrektalinė) ir adatinė punkcinė biopsija (6 gabalėliai).

Kraują PSA nustatymui būtina paimti prieš minėtas manipuliacijas.

PSA nustatymas yra jautriausias ir specifiskiausias markeris ankstyvai diagnostikai ir ligos eigos kontrolei. Nustatytas lygis serume priklauso nuo paciento amžiaus, priešinės liaukos tūrio (organui specifinis markeris).

### Tyrimai, atliekami T, N ir M kategorijų įvertinimui:

**T kategorija** Digitalinis rektalinis ištyrimas, vizualizacija atliekant transrektinę echoskopiją, kompiuterinę tomografiją, biopsinės medžiagos ištyrimas\*

**N kategorija** Vizualizacijos metodai (echoskopija ir/ar kompiuterinė tomografija) ir/arba pooperacinis limfmazgių ištyrimas (abipusė klubinė limfadenektomija – atvira arba laparoskopinė)

Sritinis naviko išplitimas vertinamas planuojant radikalią priešinės liaukos vėžio gydymą. Jis svarbus, kai nustatomas aukštas PSA lygis ( $>20$  ng/ml), blogos diferenciacijos, didelis pirminis navikas ( $>T2b$ ) ir perineurinė naviko invazija

**M kategorija** Skeleto scintigrafija\*\* ir/ar rentgenologinis tyrimas, krūtinės ląstos rentgenograma, pilvo echoskopija.

### \*Punkcinė biopsija ir histologinė naviko diagnostika:

Indikacija punkcinei biopsijai yra PSA lygis serume  $> 4$  ng/ml ir/arba apčiuopiami induraciniai pokyčiai arba mazgas priešinėje liaukoje.

Jei paciento funkcinė būklė patenkinama (galimas radikalus gydymas), nustatomas PSA lygis 4–10 ng/ml, o digitaliai ir echoskopijos metu priešinė liauka atrodo nepakitusi, tikslinga atlikti sekstantinę (6 gabalėliai) liaukos biopsiją.

Jeigu, atlikus pirminę priešinės liaukos biopsiją, nustatoma intraepitelinė priešinės liaukos neoplazija, būtina kartoti biopsiją.

### \*\*Skeleto scintigrafija:

Skeleto scintigrafiją būtina atlikti, jei:

- ☐ PSA lygis serume  $> 10$  ng/ml
- ☐ Pirminis navikas – T1, T2 su Gleason laipsniu  $\geq 8$
- ☐ Diagnozavus T3, T4 pirminį naviką ir nustačius klinikinius metastazinio proceso kauluose simptomus
- ☐ Jei PSA lygis serume  $< 10$  ng/ml, šis metodas nerekomenduojamas dėl mažos metastazių tikimybės
- ☐ Kaulų destrukcijos lokalizacija gali būti patikslinama tikslinė rentgenografija ar kompiuterine tomografija

### Kompiuterinė tomografija:

Atliekama planuojant radikalią ( $\geq 70$  Gy) pritaikomąją spindulinę terapiją arba radikalią prostatektomiją. Šis metodas reikalingas priešinės liaukos ir dubens limfmazgių būklei įvertinti.

**Magnetinio rezonanso tomografija:**

Šis metodas klinikinėje praktikoje taikomas dubens ir pilvo limfmazgių bei stuburo slankstelių metastazių patikslinimui, jei nurodytais metodais nepavyksta to įvertinti.

---

**Ambulatorinio, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, prostatos piktybinių navikų gydymo schema**

| Stadija                  | Gydymas                                                                                       | Komentarai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1a</b>               | Stebėjimo ir laukimo taktika                                                                  | Standartinė taktika, esant gerai ar vidutiniškai diferencijuotam navikui ir laukiamam išgyvenamumui < 10 metų. Pacientams su laukiamu išgyvenamumu > 10 metų patariama kartoti prostatos biopsijas.                                                                                                                                                                        |
|                          | Radikali prostatektomija<br>Spindulinė terapija                                               | Renkamasi jaunesniems pacientams su laukiamu ilgu išgyvenamumu, nustčius blogai diferencijuotą naviką. Hormonoterapija neskiriama.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T1b – T2b</b>         | Stebėjimo ir laukimo taktika                                                                  | Simptomų neturintiems pacientams, esant gerai ar vidutiniškai diferencijuotam navikui ir laukiamam išgyvenamumui < 10 metų. Pacientams, kurie nenori patirti su gydymu susijusių galimų komplikacijų.                                                                                                                                                                      |
|                          | Radikali prostatektomija                                                                      | Pacientai su laukiamu išgyvenamumu > 10 metų, ypač nustčius blogai diferencijuotą naviką. Skirti 2-3 mėnesių trukmės neoadjuvantinę hormonų terapiją.                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | Spindulinė terapija                                                                           | Pacientai su laukiamu išgyvenamumu > 10 metų. Pacientai, kuriems kontraindikuotina radikali prostatektomija. Netinkami operacijai pacientai su laukiamu išgyvenamumu 5 – 10 metų ir blogai diferencijuotu naviku. Dozė ≥70 Gy. Skirti 2-3 mėnesių trukmės neoadjuvantinę hormonoterapiją, spindulinio gydymo metu ir po jo. Viso hormoninio gydymo trukmė neviršija 6 mėn. |
|                          | Hormonoterapija (antiandrogenų monoterapija arba farmakologinė ar chirurginė kastracija)      | Simptomų turintys pacientai, netinkantys radikaliai gydymui. Jų netinkamumas radikaliai gydymui įvertinamas onkologo-radioterapeuto, urologo ir onkologo-chemoterapeuto konsiliumu.                                                                                                                                                                                        |
| <b>T3 – T4<br/>N0 M0</b> | Stebėjimo ir laukimo taktika                                                                  | Pasirinkimo galimybė pacientams su T3, esant gerai ir vidutiniškai diferencijuotiems navikams ir laukiamu išgyvenamumu < 10 metų. Hormonoterapija netaikoma.                                                                                                                                                                                                               |
|                          | Radikali prostatektomija                                                                      | Pasirinkimo galimybė, kai PSA < 20 ng/ml, T3, Gleason laipsnis < 8 ir laukiamu išgyvenamumu > 10 metų.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | Spindulinė terapija                                                                           | T3 pacientai su laukiamu išgyvenamumu > 5 – 10 metų. Dozė ≥ 70 Gy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Hormonoterapija<br>1. farmakologinė ar chirurginė kastracija<br>2. antiandrogenų monoterapija | Simptomus turintys pacientai su T3 – T4 išplitimu, netinkami kitam gydymui. Jų netinkamumas radikaliai gydymui įvertinamas onkologo-radioterapeuto, urologo ir onkologo-chemoterapeuto konsiliumu.                                                                                                                                                                         |
|                          | Kombinuotas gydymas                                                                           | Spindulinė terapija + hormonų terapija (prieš spindulinę terapiją, laike jos ir po jos – iš viso 6 mėnesius). Radikali prostatektomija+ 2 mėnesių trukmės neoadjuvantinė hormonoterapija (kai PSA < 20 ng/ml, T3, Gleason laipsnis < 8 ir laukiamas išgyvenamumas >10 metų).                                                                                               |

|               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N+, M0</b> | Stebėjimo ir laukimo taktika | Simptomų neturintys pacientai.<br>Paciento pasirinkimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | Radikali prostatektomija     | Paciento pasirinkimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Spindulinė terapija          | Paciento pasirinkimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Hormonoterapija              | Farmakologinė (iki 3 nuoseklių PSA padidėjimų) ar chirurginė kastracija.<br>Antiandrogenų monoterapija.<br>Intermituojanti hormonoterapija.                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Kombinuotas gydymas          | Paciento pasirinkimas: spindulinė terapija arba radikali prostatektomija + 2 mėn. trukmės neoadjuvantinė hormonoterapija, kaip prie T3 stadijos gydymo.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>M+</b>     | Hormonoterapija              | Farmakologinė (iki 3 nuoseklių PSA padidėjimų) ar chirurginė kastracija.<br>Antiandrogenų monoterapija. Atsiradus rezistentiškumui hormonoterapijai, rekomenduojama:<br><input type="checkbox"/> kastracija<br><input type="checkbox"/> estrogenai<br><input type="checkbox"/> chemoterapija.<br>Sekant PSA, nesant jo mažėjimo, hormoninis gydymas nutraukiamas. |

#### Bendros nuorodos

##### 1. Farmakologinė kastracija:

LHRH agonistai:

Goserelinas 3,6mg kas 4 sav. arba 10,8mg kas 12 sav.

Triptorelinas 3,75 mg kas 4 sav.

Leuprorelinas 3,75mg kas 4 sav.

**2 sav. prieš LHRH agonistų pirmą injekciją ir 2 savaites po jos skirti bicalutamido po 50mg arba cyproterono acetato 100 mg parai**

2. Chirurginė kastracija: sėklidžių enukleacija arba sėklidžių pašalinimas (orchektomija)

##### 3. Antiandrogenų monoterapija:

bicalutamidas 150mg parai;

cyproterono acetatas 200-300mg parai

4. Neoadjuvantinė hormonoterapija

Antiandrogenų monoterapijos variantas

Farmakologinės kastracijos variantas

##### 5. Bifosfonatai

☐ Skiriami tik osteoklastinėms-osteolizinėms kaulų metastazėms gydyti po neefektyvios spindulinės terapijos

☐ Naudojimo trukmė neviršija 1 metų

Pamidronatas (Aredia) 90mg i/v kas 4 sav. arba 60mg i/v kas 3 sav.

Klodronatas (Bonefos) 300mg/d i/v 1-5 d., kol normalizuosis kalcio kiekis kraujyje, po to 1600mg/p per os (dozė koreguojama priklausomai nuo inkstų funkcijos)

##### 6. Chemoterapija:

Docetaxeli 75 mg/m<sup>2</sup> kas 3 sav., 2–6 kursai

##### 7. Pastaba

Hormoninių vaistų ligoniams, sergantiems metastazavusiu priešinės liaukos vėžiu (stadijos N+, M0 ir M+), negalintiems atvykti į konsultacijas universitetų ligoninėse dėl sveikatos būklės, gali išrašyti bendrosios praktikos gydytojas pagal gyvenamąją vietą, pateikęs urologui išsamų išrašą iš medicininių dokumentų Forma Nr. 027/a bei kraujo PSA tyrimo, ne senesnio kaip 3 mėn., duomenis ir gavęs raštišką urologo išvadą. Urologo konsultacija apmokama bendra tvarka.

*Lentelės pakeitimai:*

Nr. [V-253](#), 2003-05-02, *Žin.*, 2003, Nr. 47-2088 (2003-05-14), i. k. 1032250ISAK000V-253  
Nr. [V-756](#), 2005-10-10, *Žin.*, 2005, Nr. 124-4427 (2005-10-18), i. k. 1052250ISAK000V-756

---


## PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d.  
įsakymu Nr. 422


### ŠIRDIES VEIKLOS NEPAKANKAMUMO (TLK kodas I 50.) AMBULATORINĖS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO METODIKA (vadovaujantis kompensuojamų iš PSDF vaistų sąrašu, SAM įsakymas Nr. 84 2002 02 14)

## LĖTINIO ŠIRDIES NEPAKANKAMUMO (ŠN) AMBULATORINĖ DIAGNOSTIKA

Lėtinio ŠN paplitimas populiacijoje – 2%, virš 65 m. > 10%,  
kairiojo skilvelio besimptomė disfunkcija – 2,9 %



ŪMI – ūmus miokardo infarktas,  
EKG – elektrokardiografinis tyrimas,  
CRB – C reaktyvinis baltymas,  
TTH – tireotropinis hormonas



### Širdies ir kraujagyslių Niujorko širdies asociacijos (NYHA) funkcinio pajėgumo klasės

| Funkcinė klasė             | Požymiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> (kompensuotas ŠN) | Ligoniai, kuriems yra minimalių širdies sutrikimų.<br>Jie gerai toleruoja fizinį krūvį ir jo metu bei ramybėje jokio diskomforto nejaučia.<br>Tiriant nustatoma širdies patologija.                                                                                                                                                                                             |
| <b>II</b>                  | Ligoniai patiria nemalonių jautimų (širdies plakimą, dusulį, greitą nuovargį) tik <u>sunkaus</u> fizinio krūvio metu.<br>Gerai jaučiasi ramybėje bei dirbdami vidutinio sunkumo fizinį darbą.<br>Dėl kompensacinių-adaptacinių rezervų minutinis širdies tūris būna normalus, bet padidėja galinis diastolinis, sisteminis veninis spaudimas bei spaudimas plautiniame kamieno. |
| <b>III</b>                 | <u>Vidutinio</u> fizinio krūvio metu ligoniai patiria diskomfortą – padažnėjusį širdies plakimą, dusulį, greitą nuovargį, bet gerai jaučiasi ramybės būsenoje bei nedidelio įprastinio fizinio krūvio metu.<br>Hemodinamika būna ryškiai sutrikusi.                                                                                                                             |
| <b>IV</b>                  | Ligoniai, kuriems <u>bet koks fizinis aktyvumas</u> sukelia nemalonius jautimus.<br>Diskomforto reiškiniai – dusulys, tachikardija, krūtinės angina ir kt. yra ramybės būsenoje ir gali kartotis arba išlikti.                                                                                                                                                                  |

#### ŠN vystymosi stadijos\*:

(\*Amerikos Kardiologų kolegijos ir Amerikos Širdies asociacijos Širdies nepakankamumo įvertinimo ir gydymo 2001 m. gairės)

**A stadija:** Yra didelė ŠN išsivystymo rizika, bet dar nėra nustatyta širdies liga

**B stadija:** Jau yra struktūrinė širdies liga, bet dar nėra klinikinių ŠN simptomų

**C stadija:** Yra ir širdies liga, ir ŠN simptomai bei požymiai

**D stadija:** Refrakterinis gydymui ŠN, kai reikalingos specialiosios intervencijos

#### Gydymo principai atsižvelgiant į ŠN stadijas:

**A stadijoje** – ŠN rizikos veiksnių korekcija ir AKFI\* vartojimas, jei nustatyta kairiojo skilvelio disfunkcija, yra tokie IŠL rizikos veiksniai kaip arterinė hipertenzija ir diabetas.

**B stadijoje** – Gydymo priemonės kaip ir A stadijoje. AKFI, jei yra kairiojo skilvelio sistolinė disfunkcija.

BAB\*\*, jei persirgo ŪMI, neatsižvelgiant į kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos dydį.

**C stadijoje** – Gydymo priemonės kaip ir A stadijoje ir kasdieninis valgomosios druskos apribojimas bei nuolatinis šių vaistų vartojimas: AKFI\*, BAB\*\*, diuretikų ir ŠVG\*\*\*.

**D stadijoje** – Gydymo priemonės kaip ir A, B, C stadijose bei inotropinę širdies funkciją palaikančių vaistų nuolatinis vartojimas ir mechaninės gydymo priemonės (kairįjį skilvelį pavaiduojantys prietaisai, širdies transplantacija), o jei prognozė bloga – pacientų nuolatinis gydymas slaugos ligoninėje.

\*AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai,

\*\*BAB – beta-adrenoblokatoriai,

\*\*\*ŠVG- širdį veikiantys glikozidai

## AMBULATORINIS LĖTINIO ŠIRDIES NEPAKANKAMUMO GYDYMAS

Gydymo programą sudaro:

1. Nemedikamentinės priemonės ir ambulatorinės reabilitacijos programos
2. Medikamentinis gydymas
3. Savalaikis nukreipimas chirurginiam gydymui

Sveikatos priežiūrą užtikrina šie specialistai:

1. Kompensuotus ŠN sergančius pacientus gydo bendros praktikos gydytojai (BPG), konsultuojant kardiologui, kaip reglamentuota pagrindiniam širdies susirgimui.
2. Esant dekompensuotam ŠN (II – III – IV NYHA f. kl.), kardiologas konsultuoja kas 3 mėn, o IV NYHA f. kl. pacientus kardiologas/kardiochirurgas konsultuoja pagal poreikį.
3. Reabilitologas įsijungia į gydymo programą pagal poreikį.

### Nemedikamentinės gydymo priemonės.

#### Bendros nuorodos gydant ŠN

| Širdies pažeidimo rizikos mažinimas                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                          | nutraukti rūkymą<br>hipertenzijos, hiperlipidemijos, cukraligės gydymas ir kontrolė<br>alkoholio vartojimo žymus apribojimas<br>(nutraukimas dekomensacijos stadijoje)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                |
| Skysčių balanso reguliavimas ir korekcija                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                |
| arba                                                     | NaCl < 3g/d<br>svorio stebėjimas 2 kartus per savaitę (svyravimai ≤ 1 kg)<br>skysčių balanso reguliavimas tuomet, kai yra pabrinkimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                |
| Fizinio krūvio korekcija                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                |
| →                                                        | Apribojimas paūmėjus ŠN.<br>Reabilitologų paskirtos fizinio treniravimo programos priklausomai nuo funkcinės klasės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                |
| Priemonės specialiems ligonių kontingentams              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                |
|                                                          | Prieširdžių virpamoji aritmija/supraventrikulinė tachikardija<br>↓<br>kontroliuoti širdies susitraukimų dažnį<br>ŠVG/BAB/Amiodaronas/Elektrinė širdies stimuliacija<br><br>Prieširdžių virpamoji aritmija ir/ar yra didelė tromboembolijų rizika<br>ir/ar buvusios tromboembolijos<br>↓<br>Netiesioginio veikimo antikoagulantai<br><br>Išemija, kai miokardas dar gyvybingas<br>↓<br>Ankstyvas nukreipimas miokardo revaskuliarizacijai |                                                                        |                                |
| Sergant ŠN vengti šių medikamentų kitų susirgimų gydymui |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                |
| ↓<br>Antiaritmikų, jei aritmijos <u>besimptomės</u>      | ↓<br>Kalcio kanalų blokatorių (išskyrus amlodipiną ir felodipiną, kurie sąlyginai saugūs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ↓<br>Nesteroidinių vaistų antidepresantus (terfenadiną su astemizoliu) | ↓<br>Triciklinius nuo uždegimo |

### Kitos rekomenduojamos priemonės

↓  
Priešgripinė ir  
priešpneumokokinė  
imunizacija

↓  
Gydymo monitoravimas  
2 kartus per mėnesį  
ankstyvam klinikinės būklės pablogėjimo nustatymui,  
esant III-IV NYHA f. kl. ŠN

### 1. Medikamentinis ambulatorinis lėtinio ŠN gydymas (TLK kodas I50.)

(vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2002 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 84 „Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašas (A sąrašas)“)

ŠN gydymui C stadijoje ir jo progresavimo pristabdymui nepertraukiamai ilgą laiką vartojami vaistai ir siekiama šių tikslų:

1. Pagerinti gyvenimo kokybę (diuretikai ir širdį veikiantys glikozidai).
2. Pristabdyti ŠN progresavimą ir prailginti gyvenimą (angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, beta-adrenoreceptorių blokatoriai, aldosterono antagonistai).
3. Perspėti staigios mirties išsivystymą.
4. Teisingai gydant siekiama suretinti gydymo dėl ŠN ligininėje poreikį ir tuo būdu taupyti lėšas.

#### 2.1. Angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai (AKFI)

##### Indikacijos:

- Pradedami skirti ultragarsu nustatčius KS sistolinę disfunkciją visiems persirgusiems MI ligoniams (pagal TLK kodą I 21-23).
- AKFI skiriami kiekvienam pacientui nustatčius ŠN nepriklausomai nuo NYHA funkcinės klasės.

- Skiria kardiologas-specialistas arba bendrosios praktikos gydytojas

##### Dozavimo principai:

- pradedama nuo mažiausios dozės,
- dozė dvigubinama kas 2 savaitės iki maksimalios toleruojamos dozės, kurią pasiekus gydymas tęsiamas nepertraukiamai,
- stebimi biocheminiai tyrimai: kalio bei kreatinino koncentracija kraujyje tiriama praėjus 3 d. po kiekvienos dozės pakeitimo, o esant pastoviam vartojimui – 1 kartą per mėn.

*NB: ambulatorinės palaikomosios dozės visada turi būti didesnės nei pradinės dozės stacionarinio gydymo etape.*

##### AKFI pasirinkimo principai gydant ŠN ir siekiant pristabdyti jo progresavimą:

Pirmo pasirinkimo vaistas – ilgos veikimo trukmės ir veikiantys audinius (organoprotektinis) AKFI: **ramiprilis**.

Pastaba: Lietuvoje ŠN gydymui į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtrauktas vienintelis organoprotektinis AKFI – **ramiprilis**.

2.1. Kompensuojami  
AKF inhibitoriai

Pradinė dozė

Palaikomoji dozė,  
esant normaliai inkstų  
funkcijai,  
mg

**Optimali paros dozė,**  
esant normaliai inkstų funkcijai,  
mg

1.ramiprilis

1,25–2,5 mg → 5 mg x 2

10

#### Antro pasirinkimo vaistai:

- esant sutrikusiai inkstų funkcijai (IV NYHA f. kl., III NYHA f. kl. ir hipertenzinė ar išeminė nefropatija), pirmiausiai pasirenkamas tas vaistas, kuris išsiskiria ir per kepenis ir per inkstus: **ramiprilis ir fozinoprilis** (kai kreatininas padidėja 50% nuo pradinės vertės, bet neviršija 266  $\mu\text{mol/l}$ ) arba **fosinoprilis** (esant kreatininui  $>266 \mu\text{mol/l}$ ) ir dozė pritaikoma pagal inkstų funkcijos rodiklius. AKFI skyrimas nutraukiamas, jeigu kreatininas  $> 350 \mu\text{mol/l}$ .

- jei gydomas ligonis nuolatos vartoja nitratus ir reikalingos didelės jų dozės, gydyti ŠN ir nitratų tolerancijai išvengti pasirenkamas cirkuliacinę renino-angiotenzino-aldosterono sistemą (RAAS) veikiantis trumpo veikimo **kaptoprilis**.

| 2.1. Kompensuojami AKF inhibitoriai | Pradinė dozė |   | Palaikomoji dozė, esant normaliai inkstų funkcijai, mg | Optimali paros dozė, esant normaliai inkstų funkcijai, mg |
|-------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2.Kaptoprilis                       | 6,25 mg x3   | → | 25–50 mg x 3                                           | 150                                                       |
| 3.Fosinoprilis                      | 10 mg x 2    | → | 20 mg x 2                                              | 40                                                        |
| 4. Enalaprilis                      | 2,5 mg x 2   | → | 10 mgx2                                                | 40                                                        |

#### **2.2. Beta-adrenoreceptorių blokatoriai (BAB)\***

*\*Lietuvoje ŠN gydymui registruotas tik karvedilolis.*

##### Indikacijos ir skyrimo principai:

□ ŠN B stadijoje karvedilolis skiriamas ŠN prevencijai, esant besimptomei kairiojo skilvelio disfunkcijai po persirgto MI. Indikacijas karvedilolio vartojimui nustato kardiologai.

□ Karvedilolis ŠN C stadijoje pradedamas skirti ŠN gydymui ir tęsiamas progresavimo pristabdymui visiems ligoniams nepriklausomai nuo NYHA f. kl.:

□ II NYHA. f. kl. pradeda skirti BP gydytojas,

□ III NYHA f. kl. pradeda skirti BP gydytojas tik po kardiologo konsultacijos,

□ IV NYHA. f. kl. skiriamas tik kardiologo priežiūroje (kardiologo konsultacija kas 2 sav. pirmaisiais 3 mėn., vėliau – kas 3 mėn.).

| 2.2. Kompensuojami beta-adrenoblokatoriai (BAB) | Pradinė (mg) |   | Optimali dozė (mg)               |
|-------------------------------------------------|--------------|---|----------------------------------|
| Karvedilolis                                    | 3,125 x2     | → | 25 x2 (<85 kg)<br>50 x2 (>85 kg) |

#### **2.3. Diuretikai**

Pradedami skirti C stadijoje, nustačius skysčių susilaikymą ir tęsiami, jei reikia, kai ŠN iš dalies kompensuotas.

Skiria BP gydytojas, o esant rezistentiškam gydymui ŠN – konsultuoja kardiologas.

##### Pirmo pasirinkimo diuretikai:

kilpinis diuretikas – furosemidas

tiazidinis diuretikas – hidrochlortiazidas

kalį tausojantis diuretikas – spironolaktonas

##### Antro pasirinkimo diuretikai:

kilpinis diuretikas – torasemidas, pasirenkamas vienas ar kombinacijose su kitais diuretikais,

kai

ŠN III-IV f. kl., rezistentiškas gydymui ar lydimas skysčio kaupimosi ertmėse ir/ar hipoalbuminemijos (albuminas plazmoje < 36 g /l).

Pasirinkimas ir dozė priklauso nuo NYHA f. kl.:

□ Esant IV NYHA f. kl. ar rezistentiškam gydymui ŠN po stacionarinio gydymo etapo skiriami diuretikų deriniai, bet visada pasirenkamas kilpinis diuretikas. Ambulatoriniam gydymui daliai ligonių **tęsti** dideles palaikomąsias dozes torasemido 100–200 mg, furosemido 120–800 mg derinyje su hidrochlortiazidu – HCTZ (25–50 mg) ir mažomis spironolaktono dozėmis (25–50 mg).

□ Esant III NYHA f. kl., skiriami diuretikų deriniai ir visada pasirenkamas kilpinis diuretikas, skiriant jų dozę pagal skysčių balanso sutrikimą. Skiriamas furosemidas 40–400 mg arba torasemidas 10–100 mg derinyje su HCTZ (25–50 mg) ar/ir spironolaktonu 25–50 mg.

□ Gydymo metu pasiekus II NYHA f. kl., **tęsiamas** furosemidas arba torasemidas (dozė priklauso nuo skysčių balanso ir hemodinamikos įvertinimo rodiklių) be spironolaktono/HCTZ.

Pastabos:

1. Jei naujai nustatoma ŠN II NYHA f. kl. be skysčių susilaikymo klinikinių požymių, diuretikai neskiriami.

2. *Monoterapijai diuretikai neskiriami.*

| 2.3. Kompensuojami diuretikai  | Pradinė dozė<br>mg |   | Maksimali paros dozė<br>mg |
|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------|
| <u>Kilpiniai diuretikai:</u>   |                    |   |                            |
| Furosemidas                    | 20–40              | → | 1000 ir deriniai           |
| Torasemidas                    | 5–10               | → | 200 ir deriniai            |
| <u>Tiazidiniai diuretikai:</u> |                    |   |                            |
| 1. Hidrochlortiazidas*         | 25                 | → | 50–75                      |

*\*Neskirti, jei glomerų filtracijos greitis  $\leq 30$  ml/min., išskyrus atvejus, kai jie skiriami kartu su kilpiniais diuretikais.*

| <u>Kalį tausojantys diuretikai/ aldosterono antagonistai:</u> |      | Kartu su AKFI | Be AKFI |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|
| Spironolaktonas**                                             | 12,5 | → 25          | 50 –150 |

*\*\* Ištirti kalio ir kreatinino koncentraciją iki paskyrimo; kontroliuoti kalio ir kreatinino koncentraciją praėjus 5–7 d. Po naujo paskyrimo ar dozės pakeitimo ir 1 kartą savaitėje, kai dozė pastovi.*

**2.4. Digoksinas**

Skiriamas, kai yra simptominis ŠN ir tęsiamas tik tol, kol simptomai išlieka. Ištirti kalio, magnio koncentraciją ir inkstų funkciją (kreatinino koncentraciją) prieš pradedant gydymą.

Dozavimas:

□ 0,25–0,375 mg dienai, jei yra sinusinis ritmas. Pradėjus standartinį gydymą digoksinu, dvi dienas galima skirti po 0,25 du kartus per dieną

□ 0,0625–0,125 mg, jei vyresnis amžius, jei sutrikusi inkstų funkcija

□ 0,5–0,75 mg, jei yra prieširdžių virpėjimo tachisistolinė forma, o kreatinino koncentracija yra normali.

Pastaba.

Rekomenduojama tirti digoksino koncentraciją nuolatos vartojant digoksiną vyresniame amžiuje, jei kartu vartojamas amiodaronas, verapamilis ar chinidinas ir esant intoksikacijos

simptomams/požymiams. Terapinė digoksino koncentracija kraujo plazmoje – 1,03–2,6 nmol/l, (toksinė digoksino koncentracija kraujo plazmoje, kai  $> 3,2$  nmol/l).

### **3. Kiti rekomenduojami vaistai ambulatoriniam ŠN gydymui**

#### **Antikoagulantai (TLK I 50.)**

Skiriami tik esant tromboembolinei komplikacijai arba didelei jos išsivystymo rizikai (kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija  $<30\%$ ).


Pirmo pasirinkimo vaistas yra varfarinas.

Antro pasirinkimo vaistas yra acenokumarolis, jei netoleruojamas varfarinas.

Dozavimas pagal SPA ir IN rodiklius, kurie, titruojant antikoagulianto dozę arba keičiant širdies nepakankamumo gydymą, kontroliuojami ne rečiau negu 1 kartą per savaitę, o likusį laiką – ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį.

---

## **ŠIZOFRENIJOS IR ŠIZOFRENINIŲ SUTRIKIMŲ GYDYMO METODIKA (F20-F29)**



---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-273](#), 2003-05-13, *Žin.*, 2003, Nr. 50-2242 (2003-05-23), i. k. 1032250ISAK000V-273

Nr. [V-293](#), 2004-04-29, *Žin.*, 2004, Nr. 70-2468 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-293

Nr. [V-570](#), 2004-08-11, *Žin.*, 2004, Nr. 128-4617 (2004-08-17), i. k. 1042250ISAK000V-570

Nr. [V-851](#), 2004-12-01, *Žin.*, 2004, Nr. 177-6580 (2004-12-09), i. k. 1042250ISAK000V-851

## NEUROLEPTIKŲ PARINKIMO EILIŠKUMAS

### PIRMASIS PARINKIMAS

#### KLASIKINIAI NEUROLEPTIKAI

Haloperidolis  
Trifluoperazinas  
Flufenazinas  
Zuklopentiksolis  
Flupentiksolis

#### arba ATIPINIAI NEUROLEPTIKAI

(išskyrus modifikuoto veikimo formas)

Amisulpridas \* +  
Risperidonas \* +  
Olanzapinas \* ++  
Quetiapinas \* ++  
Ziprazidonas \* ++

### ANTRASIS PARINKIMAS

Amisulpridas +  
Risperidonas \*\* ir +  
Olanzapinas ++  
Quetiapinas ++  
Ziprazidonas ++

### TREČIASIS PARINKIMAS (REZISTENTIŠKOM FORMOM GYDYTI)

Klozapinas

---

\* Pirmu psichozės epizodu tik dirbantiems, besimokantiems ar socialiai adaptuotiems pacientams (galintiems savarankiškai gyventi).

**\*\* Risperidonum injekcinė modifikuotojo veikimo forma skiriama tik dirbantiems, besimokantiems ar socialiai adaptuotiems pacientams (galintiems savarankiškai gyventi), kurie 18 mėnesių laikotarpyje buvo gydyti psichiatrijos stacionare ar dienos stacionare dėl psichikos būklės pablogėjimo sukkelto medikamento nevartojimo ar nereguliaraus vartojimo. Gydymą minėtu preparatu skiria ir receptus išrašo psichiatrijos stacionaro, dienos stacionaro ar pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai psichiatrai. Minėtų gydymo įstaigų specialistai, skiriantys Risperidonum injekcinę modifikuotojo veikimo formą, privalo užtikrinti reikiamą pacientų priežiūrą. Gydytojai konsultantai, paskyrę šią vaisto formą apie tai informuoja Psichikos sveikatos centrą, kuriame lankosi pacientas dėl reikiamos priežiūros užtikrinimo.**

+ pacientams nuo 15 metų.


++ pacientams nuo 18 metų.

---

*Papildyta skirsnio:*

Nr. [V-851](#), 2004-12-01, Žin., 2004, Nr. 177-6580 (2004-12-09), i. k. 1042250ISAK000V-851

## MANIJOS GYDYMO METODIKA (F30.2)




\* atipiniai NL manijos gydymui (F30.2) iš PSDF lėšų šiuo metu nekompensuojami;  
+ palaikomajam manijos gydymui kaip nuotaikos stabilizatorius, pagal VVKT patvirtintas indikacijas, iš atipinių NL šiuo metu gali būti skiriamas tik Olanzapinas

Papildyta skirsnio:

Nr. [V-851](#), 2004-12-01, Žin., 2004, Nr. 177-6580 (2004-12-09), i. k. 1042250ISAK000V-851

## DEPRESIJOS GYDYMO METODIKA (F32.1, F32.2, F32.3, F33.1, F33.2, F33.3)



Papildyta skirsniu:

Nr. [V-851](#), 2004-12-01, Žin., 2004, Nr. 177-6580 (2004-12-09), i. k. 1042250ISAK000V-851

### Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [497](#), 2002-10-10, Žin., 2002, Nr. 101-4534 (2002-10-23), i. k. 1022250ISAK00000497

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-253](#), 2003-05-02, Žin., 2003, Nr. 47-2088 (2003-05-14), i. k. 1032250ISAK000V-253

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-273](#), 2003-05-13, Žin., 2003, Nr. 50-2242 (2003-05-23), i. k. 1032250ISAK000V-273

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-348](#), 2003-06-11, Žin., 2003, Nr. 58-2624 (2003-06-18), i. k. 1032250ISAK000V-348

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-716](#), 2003-12-09, Žin., 2003, Nr. 119-5452 (2003-12-18), i. k. 1032250ISAK000V-716

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" papildymo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-181](#), 2004-03-31, Žin., 2004, Nr. 50-1652 (2004-04-06), i. k. 1042250ISAK000V-181

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-293](#), 2004-04-29, Žin., 2004, Nr. 70-2468 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-293

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-570](#), 2004-08-11, Žin., 2004, Nr. 128-4617 (2004-08-17), i. k. 1042250ISAK000V-570

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-665](#), 2004-09-24, Žin., 2004, Nr. 145-5285 (2004-09-30), i. k. 1042250ISAK000V-665

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-851](#), 2004-12-01, Žin., 2004, Nr. 177-6580 (2004-12-09), i. k. 1042250ISAK000V-851

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl Ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų" pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-152](#), 2005-03-04, Žin., 2005, Nr. 33-1074 (2005-03-10), i. k. 1052250ISAK000V-152

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-205](#), 2005-03-25, Žin., 2005, Nr. 45-1470 (2005-04-07), i. k. 1052250ISAK000V-205

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-556](#), 2005-07-07, Žin., 2005, Nr. 85-3181 (2005-07-14), i. k. 1052250ISAK000V-556

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl Ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-756](#), 2005-10-10, Žin., 2005, Nr. 124-4427 (2005-10-18), i. k. 1052250ISAK000V-756

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-825](#), 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4643 (2005-10-29); Žin., 2005, Nr. 139-0 (2005-11-26), i. k. 1052250ISAK000V-825

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-900](#), 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 140-5050 (2005-11-29), i. k. 1052250ISAK000V-900

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-916](#), 2005-11-25, Žin., 2005, Nr. 142-5148 (2005-12-03), i. k. 1052250ISAK000V-916

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-350](#), 2006-04-28, Žin., 2006, Nr. 51-1901 (2006-05-11), i. k. 1062250ISAK000V-350

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-596](#), 2006-07-10, Žin., 2006, Nr. 77-3021 (2006-07-14), i. k. 1062250ISAK000V-596

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 "Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo" pakeitimo