

Nenumatytų atvejų dėl *Dendrolimus sibiricus* patekimo ir išplitimo Lietuvos Respublikoje suvaldymo plano
2 priedas

INFORMACIJA APIE KENKĖJO *DENDROLIMUS SIBIRICUS* BIOLOGIJĄ IR POŽYMIUS

I SKYRIUS KENKĖJAS *DENDROLIMUS SIBIRICUS*



1 pav. *Dendrolimus sibiricus* patelė ir patinėlis. Nuotraukos šaltinis
<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1779>



2 pav. *Dendrolimus sibiricus* kiaušinėliai. Nuotraukos šaltinis <https://gd.eppo.int/taxon/DENSI/photos>










3 pav. *Dendrolimus sibiricus* lerva. Nuotraukos šaltinis <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1779>



4 pav. *Dendrolimus sibiricus* kokonai ant medžio. Nuotraukos šaltinis <https://gd.eppo.int/taxon/DENSI/photos>

II SKYRIUS
KENKĖJO *DENDROLIMUS SIBIRICUS* VYSTYMOŠI CIKLAS

Dviejų kalendorinių metų <i>D. sibiricus</i> gyvenimo ciklas						
Metai	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Žiema
Pirmi metai		Kiaušinėliai lapijoje 	I 	Lervų augimas II 	III 	Lervos žiemoja po miško paklote
Antri metai	IV 	Lėliukių kokonai medžio lajoje V 	Suaugę drugeliai lapijoje VI 			

5 pav. *Dendrolimus sibiricus* gyvenimo ciklas. Nuotraukos šaltinis <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1779>

III SKYRIUS KENKĖJO *DENDROLIMUS SIBIRICUS* POŽYMIAI

1. Pagrindiniai kenkėjo *Dendrolimus sibiricus* požymiai yra šie:
 - 1.1. Kiaušinėliai ovalūs, ant šakelių ir spyglių išsidėsto santalkomis po 3–100 (2 pav.).
 - 1.2. Lervos yra 5–8 cm, padengtos plaukeliais, tamsiai rudos arba juodos spalvos su šviesiomis dėmėmis ant kūno (3 pav.).
 - 1.3. Lėliukės vystosi pilkos arba rudos spalvos kokonuose (4 pav.).
 - 1.4. Suaugėliai – 3–4 cm ilgio drugiai, kurių išskleistų sparnų plotis gali būti nuo 4 iki 8 cm. Kūno spalva varijuoja nuo šviesiai rudos iki juodos. Charakteringas šio kenkėjo bruožas – viršutinės sparnų poros viduryje esanti balta dėmė (1 pav.).