

**PAKARTOTINIO SVEIKATOS PATIKRINIMO METU ATLIEKAMI
TYRIMAI IR KONSULTACIJOS**

SP ir CCA MP	1 klasė	2 klasė / CCA MP	LAPL	3 klasė
Galiojimo trukmė	SP galioja 12 mėnesių; SP galiojimo laikotarpis sutrumpinamas iki 6 mėnesių: 1) vienpiločių komercinių orlaivių pilotams, kuriems yra suėję 40 metų; 2) pilotams, kuriems yra suėję 60 metų.	SP ir CCA MP galioja: 1) 60 mėnesių iki aviacijos specialistui sueina 40 metų; 2) 24 mėnesius aviacijos specialistui nuo 40 iki 50 metų; 3) 12 mėnesių, jeigu aviacijos specialistui daugiau kaip 50 metų.	SP galioja : 1) 60 mėnesių iki aviacijos specialistui sueina 40 metų; 2) 24 mėnesius, jeigu aviacijos specialistui daugiau kaip 40 metų	SP galioja: 1) 24 mėnesius iki aviacijos specialistui sueina 40 metų; 2) 12 mėnesių, kai aviacijos specialistui yra suėję 40 metų
Bendras kraujo, bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje	Kiekvieną kartą	Kiekvieną kartą	Kiekvieną kartą	Kiekvieną kartą
EKG	Pradinio tyrimo metu ir vėliau: 1) iki 30 metų – kas 5 metai; 2) nuo 30 iki 39 metų – kas 2 metai; 3) nuo 40 iki 49 metų – kasmet; 4) sulaukus 50 metų – kiekvieno tyrimo metu.	Pradinio tyrimo metu ir vėliau: 1) iki 40 metų – kas 5 metai; 2) nuo 40 iki 49 metų – kas 2 metai; 3) virš 50 metų – kasmet.	Pradinio tyrimo metu ir vėliau: 1) iki 40 metų – kas 5 metai; 2) nuo 40 metų – kas 2 metai.	Pradinio tyrimo metu ir vėliau: 1) iki 30 metų – kas 4 metai; 2) virš 30 metų – kas 2 metai.
Audiograma	Pradinio tyrimo metu ir vėliau: 1) iki 40 metų – kas 5 metai; 2) virš 40 metų – kas 2 metai.	Pradinio tyrimo metu ar turint skrydžio pagal prietaisus kvalifikaciją (turi atitikti 1-os klasės reikalavimus) ir vėliau: 1) iki 40 metų – kas 5 metai; 2) virš 40 metų – kas 2 metai.	Pradinio tyrimo metu ar turint skrydžio pagal prietaisus kvalifikaciją (turi atitikti 1-os klasės reikalavimus) ir vėliau: 1) iki 40 metų – kas 5 metai; 2) virš 40 metų – kas 2 metai.	Pradinio tyrimo metu ir vėliau: 1) iki 40 metų – kas 4 metai; 2) virš 40 metų – kas 2 metai.
Išsamus otorinolaringologinis tyrimas	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms
Išsamus oftalmologinis tyrimas	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms. Pakartotinė patikra, kai refrakcinė paklaida: 1) nuo +3 iki +5D arba nuo -3 iki -6D, nustatytas astigmatizmas arba anizometropija, viršijanti 2D, tačiau nesiekianti 3D – kas 5 metai; 2) daugiau nei +/-6D, nustatytas daugiau nei 3D astigmatizmas arba anizometropija viršija 3D – kas 2 metai.	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms. Pakartotinė patikra, kai refrakcinė paklaida: 1) nuo +3 iki +5D ar nuo -3 iki -6D, nustatytas astigmatizmas ar anizometropija, viršijanti 2D, tačiau nesiekianti 3D – kas 5 metai; 2) daugiau nei +/-6D, nustatytas daugiau nei 3D astigmatizmas arba anizometropija viršija 3D – kas 2 metai.	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms. Pakartotinė patikra, kai refrakcinė paklaida: 1) nuo +3 iki +5D ar nuo -3 iki -6D, nustatytas astigmatizmas ar anizometropija, viršijanti 2D, tačiau nesiekianti 3D – kas 5 metai; 2) daugiau nei +/-6 D, nustatytas daugiau nei 3D astigmatizmas ar anizometropija viršija 3D – kas 2 metai.	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms. Pakartotinė patikra, kai refrakcinė paklaida: 1) iki +5/-6 D – kas 4 metai; 2) virš +5/-6 D – kas 2 metai. .
Tonometrija	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms	Pradinio tyrimo metu ir esant klinikinėms indikacijoms.

	indikacijoms. Virš 40 metų – kas 2 metai	indikacijoms. Virš 40 metų – kas 2 metai	indikacijoms. Virš 40 metų – kas 2 metai	Virš 40 metų – kas 2 metai
Lipidų tyrimas	Pradinio tyrimo metu, sulaukus 40 metų ir esant klinikinėms indikacijoms	Pradinio tyrimo metu, sulaukus 40 metų ir esant klinikinėms indikacijoms	Pradinio tyrimo metu, sulaukus 40 metų ir esant klinikinėms indikacijoms	Pradinio tyrimo metu, sulaukus 40 metų ir esant klinikinėms indikacijoms