

**GIMDYMO PRO MAKŠTĮ IR CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOS KLINIKINĖS  
NAUDOS IR RIZIKOS PALYGINIMO LENTELĖ**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Nauda / rizika</b>	<b>Gimdymas pro makštį</b>	<b>Cezario pjūvio operacija</b>
<b>I. Naujagimiui</b>			
1.	Įpjovimas atveriant gimdą	Nepasitaiko	1–2 proc.
2.	Gimdymo trauma	Pečių įstrigimas 0,2–2 proc.	Nepasitaiko
		Peties rezginio pažeidimas 2–5 / 1000 atv.	Peties rezginio pažeidimas 2,1 / 1000 atv.
		Lūžimai 1–2 proc.	Lūžimai 1–2 proc.
3.	Fiziologinė adaptacija	Normali	Sutrikusi
		Kvėpavimo nepakankamumas (išnešiotas naujagimis) iki 1 proc.	Kvėpavimo nepakankamumas (išnešiotas naujagimis) 1–4 proc.
4.	Kita	-	Didesnė rizika: 1) bronchinės astmos tikimybė padidėja 1,2–1,9 karto, lyginant su gimdymu pro makštį 2) alergijos / atopijos tikimybė padidėja 1,2 karto, lyginant su gimdymu pro makštį 3) kvėpavimo ir žarnyno infekcijų 4) hospitalizacijos ir gydymo intensyviosios terapijos padalinyje 5) antsvorio vaikystėje ir užaugus 6) kraujodaros sistemos pokyčių
5.	Žindymas	-	Dažnesni žindymo sutrikimai
<b>II. Motinai</b>			
6.	Chirurginės komplikacijos (trumpalaikės)	Sunkios komplikacijos 0,9 proc.	Sunkios komplikacijos 2,7 proc.
		Kraujavimas po gimdymo 1–5 proc.	Kraujavimas po gimdymo 1–8 proc.
		Gimdos pašalinimas 2–5 / 1000 atv.	Gimdos pašalinimas 10–20 kartų dažnesnis, lyginant su gimdymu pro makštį
		Embolija vaisiaus vandenimis 3,3–7,7 / 100 000 atv.	Embolija vaisiaus vandenimis 15,8 / 100 000 atv.
		Venų tromboembolija daugiau kaip 1 / 1000 atv.	Venų tromboembolija 2,2 karto dažnesnė, lyginant su gimdymu pro makštį
		Moters mirtis 3,6 / 100 000 atv.	Moters mirtis 13,3 / 100 000 atv.
		-	Žarnyno, šlapimo pūslės pažeidimas operacijos metu (1–2 proc.), pooperacinis žarnų nepraeinamumas

7.	Anestezijos komplikacijos	Sritinės anestezijos 0,06 / 1000 procedūrų Bendroji anestezija netaikoma	Sritinės anestezijos 0,13–0,29 / 1000 procedūrų Mirtis dėl bendrosios anestezijos komplikacijų labai reta, bet 2 kartus dažnesnė, lyginant su gimdymu pro makštį
8.	Komplikacijos, susijusios su tarpvietės / dubens dugno pažeidimu	3–4 laipsnio tarpvietės plyšimas 2–5 proc.	Nepasitaiko
		Šlapimo nelaikymas (trumpai po gimdymo) 21–32 proc., vėlesniu laikotarpiu 2 kartus dažnesnis, lyginant su cezario pjūvio operacija	Šlapimo nelaikymas 0–10 proc.
		Išmatų nelaikymas (trumpai po gimdymo) 10–20 proc., vėlesniu laikotarpiu nesiskiria	Išmatų nelaikymas 3 proc., vėlesniu laikotarpiu nesiskiria
9.	Infekcija	Karščiavimas 1–2 proc.	Karščiavimas 2,5 proc.
		Žaizdos infekcija 0,05 proc.	Žaizdos infekcija 3 proc.
		-	Bakteriurija 11 proc.
10.	Laikas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje	Trumpesnis	Ilgesnis, didesnė pakartotinės operacijos rizika
11.	Kito nėštumo komplikacijos, kurias lemia buvusi cezario pjūvio operacija	Nepasitaiko	Gimdos plyšimas daugiau kaip 1 proc.
		Placentos atšoka 0,74 proc.	Placentos atšoka 0,95 proc.
		Placentos pirmeiga, įaugimas 0,38 proc.	Placentos pirmeiga, įaugimas – 3 kartus didesnė rizika, lyginant su gimdymu pro makštį
		-	Didesnė nevaisingumo, persileidimo, negimdinio nėštumo, priešlaikinio gimdymo ir negyvagimio rizika