

PACIENTO, KURIAM KOLONOSKOPINIO TYRIMO METU PAŠALINTAS (-I) POLIPAS (-AI), SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMO REKOMENDACIJOS

Eil. Nr.	Kolonoskopinio tyrimo metu pašalinti polipai	Kito kolonoskopinio tyrimo atlikimo laikas	Pastabos
1.	1.1. Bent viena didesnė nei 10 mm adenoma arba aukšto laipsnio displazija 1.2. 5 arba daugiau adenomų 1.3. tradicinė dantytoji adenoma, bet koks 10 mm ar didesnis dantytasis polipas arba dantytasis polipas su displazija	po 3 metų	-
2.	2.1. bent viena didesnė nei 10 mm adenoma arba aukšto laipsnio displazija 2.2. 5 arba daugiau adenomų 2.2. tradicinė dantytoji adenoma, bet koks 10 mm ar didesnis dantytasis polipas arba dantytasis polipas su displazija	po 5 metų	Antra kolonoskopija, kai pirmosios kolonoskopijos metu nešalinti polipai
3.	3.1. <i>piecemeal</i> būdu pašalintas 20 mm arba didesnis polipas	po 3–6 mėnesių	Pakartotinė kolonoskopija ankstyvam ligos recidyvui įvertinti
4.	4.1. <i>piecemeal</i> būdu pašalintas 20 mm arba didesnis polipas	po 12 mėnesių	Kolonoskopija praėjus 12 mėnesių nuo antros kolonoskopijos, kai pirmosios kolonoskopijos metu <i>piece-meale</i> pašalintas polipas ≥ 20 mm vėlyvam ligos recidyvui įvertinti
5.	5.1. 1–4 adenomos su žemo laipsnio displazija, nepriklausomai nuo viliozinio komponento 5.2. bet koks mažesnis nei 10 mm dantytasis polipas be displazijos požymių	po 10 metų	-
6.	6.1. kolonoskopijos metu pašalinama 10 arba daugiau adenomų	-	Turi būti siunčiama genetiko konsultacijos dėl piktybinį naviką predisponuojančių genetinių sindromų