

Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo  
2 priedas

### CUKRINIO DIABETO IR TARPINĖS HIPERGLIKEMIJOS DIAGNOSTINIAI KRITERIJAI

Eil. Nr.	Gliukozės apykaitos sutrikimas	Nustatymo sąlygos	Glikemija (mmol/l)
1.	Cukrinis diabetas	Glikemija nevalgius ir (arba) 2 val. po 75 g gliukozės krūvio*	$\geq 7,0$ $\geq 11,1$
2.	Glikemijos sutrikimas nevalgius	Glikemija nevalgius ir 2 val. po 75 g gliukozės krūvio*	$\geq 6,1$ ir $< 7,0$ $< 7,8$
3.	Sutrikęs gliukozės toleravimas	Glikemija nevalgius ir 2 val. po 75 g gliukozės krūvio*	$< 7,0$ $\geq 7,8$ ir $< 11,1$

\* Gliukozės tolerancijos mėginio metu suaugusiesiems skiriama 75 g gliukozės, vaikams – 1,75 g gliukozės/1 kg kūno masės, bet ne daugiau kaip 75 g gliukozės.

---