

Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo 5 priedas

**ANTROJO TIPO CUKRINIAM DIABETUI GYDYTI SKIRIAMŲ VAISTŲ GRUPĖS, ESANT GRETUTINĖMS LIGOMS AR SVEIKATOS SUTRIKIMAMS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Liga ar sveikatos sutrikimas</b>	<b>Patvirtinantys duomenys</b>	<b>Vaistų grupės</b>
1.	Kraujotakos sistemos (širdies ir (ar) kraujagyslių) liga (toliau – ŠKL)	Nustatyta: persirgta miokardo infarktas, insultas, praeinantis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, vainikinių arterijų liga, atliktas vainikinių arterijų plėtimas, trombolizė, stentavimas ar šuntavimas (-ai), periferinių kraujagyslių liga, nestabili krūtinės angina, esant pakitimams elektrokardiogramoje, miokardo išemija krūvio mėginio metu.	GLP-1 SGLT-2 inhibitoriai
2.	ŠKL rizikos veiksniai	Amžius $\geq 55$ metų ir kairiojo skilvelio hipertrofija arba vainikinių, miego ar kojų arterijų stenozė $> 50\%$ , aGFG $< 60$ ml min./1,73 m <sup>2</sup> , arba albuminurija.	GLP-1 SGLT-2 inhibitoriai
3.	Širdies nepakankamumas (toliau – ŠN)	Nustatytas ŠN su sumažėjusia išstūmio frakcija (IF $< 45$ proc.).	SGLT-2 inhibitoriai
4.	Lėtinė inkstų liga (toliau – LIL)	LIL kai aGFG $< 60$ ml min./1.73 m <sup>2</sup> arba albuminurija $> 30$ mg/24 val., arba albumino ir kreatinino santykis $> 3$ mg/mmol.	SGLT-2 inhibitoriai GLP-1