


ANTROJO TIPO CUKRINIO DIABETO GYDYSKO SCHEMA

**Pirmasis vaistas – metforminas ir gyvensenos mokymas
(kūno masės valdymas ir fizinis aktyvumas)**




Nėra ŠKL, LIL, ŠN ar ŠKL rizikos veiksnių

Jei HbA1c didesnis nei tikslinis – pridedamas SK

Esant hipoglikemijai – SK
nutraukiami, gydymas keičiamas į:

Jei nepasiekta tikslinis HbA1c,
gydymas papildomas



Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo 6 priedas



PASTABOS:

- Nurodytų kompensuojamujų vaistų, kurių metinė paciento gydymo kaina mažiausia, pavadinimai skelbiami pažymose apie vaistų, jrašytų į kompensuojamujų vaistinių preparatų kainyną, mažiausią gydymo kainą VLK interneto svetainėje.
- SGLT-2i indikacijos esant inkstų funkcijos sutrikimui bei aGFG rodiklis, kada pradedami ir tėsiams vaistai, skiriasi.

ŠKL – Kraujotakos sistemos (širdies ir (ar) kraujagyslių) liga, KSH – kairio skilvelio hipertrofija, ŠN – širdies nepakankumas, LIL – lėtinė inkstų liga, KS IF – kairiojo skilvelio ištūmio frakcija, aGFG – apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis.