

Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo 9 priedas

SUAUGUSIŲJŲ (IŠSKYRUS NĖŠČIAŠIAS), SERGANČIŲ PIRMOJO TIPO CUKRINIŲ DIABETU ARBA ANTOJO TIPO CUKRINIŲ DIABETU, STEBĖSENOS RODIKLIŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS

Eil. Nr.	Suaugusiųjų (išskyrus nėščiąsias), sergančių pirmojo tipo cukriniu diabetu arba antrojo tipo cukriniu diabetu, stebėsenos rodikliai (toliau – rodiklis)	Rodiklių siektinos reikšmės
1.	Savikontrolės būdu nustatomas gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje Glikemijos tyrimo rezultatai: 1.1. prieš valgį; 1.2. po valgio (2 val. nuo valgio pradžios); 1.3. sunki (kurią reikėtų gydyti) ir (ar) naktinė hipoglikemija	4,4–7,0 mmol/l 4,4–8,5 mmol/l Nėra.
2.	HbA1c	Atsižvelgiant į Aprašo 1 priede nurodytus kriterijus, nustatoma individualizuota tikslinė HbA1c reikšmė.
3.	Arterinis kraujo spaudimas	Iki 130/80 mm Hg arba individualus.
4.	Lipidograma: 4.1. didelio tankio lipoproteinai; 4.2. trigliceridų kiekis; 4.3. mažo tankio lipoproteinai	> 1,0 mmol/l (vyrams); > 1,3 mmol/l (moterims); < 1,7 mmol/l; < 2,6 mmol/l (esant vidutinei kraujotakos sistemos (širdies ir kraujagyslių) ligų (toliau – ŠKL) rizikai); < 1,8 mmol/l (esant didelei ŠKL rizikai); < 1,4 mmol/l (esant labai didelei ŠKL rizikai).