

Cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo
11 priedas

VAIKŲ, SERGANČIŲ PIRMOJO ARBA ANTROJO TIPO CUKRINIŲ DIABETU, STEBĖSENOS RODIKLIŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS

Eil. Nr.	Vaikų, sergančių pirmojo arba antrojo tipo cukriniu diabetu, stebėsenos rodikliai (toliau – rodiklis)	Rodiklių siektinos reikšmės
1.	Savikontrolės būdu nustatomas gliukozės kiekis kapiliariniame kraujyje ir (ar) matuojant nuolatinį gliukozės jutikliu: 1.1. prieš valgį; 1.2. po valgio (2 valandos nuo valgio pradžios); 1.3. prieš miegą; 1.4. sunki (kurią reikėtų gydyti) ir (ar) naktinė hipoglikemija; 1.5. lengva / vidutinė hipoglikemija	4–7 mmol/l; 5–10 mmol/l; 4,4–7,8 mmol/l; nėra; nėra arba per savaitę pasireiškė lengva ar vidutinė hipoglikemija ne daugiau kaip 2 kartus (fiksuota glikemija mažesnė negu 3,9 mmol/l).
2.	2.1. HbA1c reikšmė 2.2. gliukozės kiekio kraujyje svyravimai, naudojant nuolatinį gliukozės jutiklius	< 7,0 proc. (53 mmol/mol) be sunkių hipoglikemijos epizodų; tikslinėse gliukozės kiekio kraujyje ribose > 70 proc. laiko; laikas esant hipoglikemijai < 4 proc.
3.	Arterinis kraujo spaudimas	< 90 procentilių pagal amžių, lytį ir ūgį.
4.	Fizinės būklės vertinimas pagal augimo kreives (svorio ir ūgio priklausomybė, kūno masės indeksas)	< 90 procentilių pagal amžių ir lytį.
5.	Lipidograma: 5.1. MTL cholesterolis; 5.2. DTL cholesterolis; 5.3. trigliceridai	< 2,6 mmol/l; > 0,91 mmol/l; < 1,7 mmol/l.