

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS ASMENIMS GYDYTI REIKALINGA
HEMODIALIZĖ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

2000 m. gegužės 2 d. Nr. 236
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. [32-890](#)) 5 straipsnio pirma dalimi,

1. T v i r t i n u:

1.1. Ligų, kuriomis sergantiems asmenims gydyti reikalinga hemodializė, sąrašą (1 priedas).

1.2. Programinio gydymo hemodializėmis parodymus (2 priedas).

2. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrei R. Vaitkienei.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMUNDAS ALEKNA

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro
2000 05 02 įsakymu Nr. 236
1 priedas

**LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS ASMENIMS GYDYTI
REIKALINGA HEMODIALIZĖ, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	TLK-10 kodas	Ligos pavadinimas
1.	N01	Greitai progresuojantis nefritinis sindromas
2.	N03	Lėtinis nefritinis sindromas
3.	N04	Nefrozinis sindromas
4.	N05	Nefritinis sindromas, nepatikslintas
5.	N07	Paveldėta nefropatija:
5.1.	Q87.7	Alporto sindromas
5.2.	E85.0	Paveldėta amiloidinė nefropatija
6.	N08	Glomerulų pažeidimas, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur:
6.1.	C90.0	Daugybinė mieloma
6.2.	C88.0	Wanderstrom'o makroglobulinemija
6.3.	E10-E14	Cukrinis diabetas
6.4.	E85	Amiloidozė
6.5.	M05-M06	Reumatoidinis artritas
6.6.	D47.2	Monokloninė gamapatija
7.	N11	Lėtinis (kanalėlių) tubulointerstinis nefritas
8.	N16	Inkstų tubulointerstiniai (kanalėlių) pakitimai, sergant kitų organų ligomis
9.	N17.0	Ūminis inkstų nepakankamumas su tubuline (kanalėlių) nekroze
10.	N18	Lėtinis inkstų nepakankamumas
11.	N18.0	Inkstų ligų baigtys
12.	N19	Nepatikslintas inkstų nepakankamumas
13.	N20	Inkstų ir šlapimtakių akmenys
14.	I12-I13	Hipertenzinė nefropatija
15.	Q61	Cistinė inkstų liga
16.	M31.0	Gudpaščerio sindromas
17.	M31.3	Wegener'io granuliomatozė
18.	M31.8	Kitos patikslintos nekrozuojančios vaskulopatijos
19.	M32	Sisteminė raudonoji vilkligė

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro
2000 05 02 įsakymu Nr. 236
2 priedas

PROGRAMINIO GYDYMO HEMODIALIZĖMIS PARODYMAI

1. Kreatinino klirensas 10–15 ml/val.
 2. Kreatinino kiekis kraujo serume daugiau kaip 600–700 $\mu\text{mol/l}$.
 3. Šlapalo kiekis kraujo serume daugiau kaip 35–40 mmol/l.
 4. Aiškūs uremijos simptomai (ureminis gastritas, pasireiškiantis anoreksija, pykinimu, vėmimu, kraujavimu iš skrandžio erozijų; CNS veiklos sutrikimai: dėmesio susilpnėjimas, depresija ar euforija, darbingumo sumažėjimas; sunki anemija, reikalaujanti eritropoetino terapijos, varginantis odos niežėjimas, „neramių kojų“ sindromas).
-